


Відкрита рана живота

ВАЖЛИВО. Розмір рани НЕ дає належної оцінки тяжкості.



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.




01 РОЗМІЩІТЬ пораненого в положення лежачи із зігнутими колінами.



02 ВИКРИТИ травму та знайти джерело кровотечі.

ПЕРЕВІРТЕ на наявність деформації, синців, садна, проколотого предмета, опіків, рваних ран. **ВАЖЛИВО**, перевірте жорсткість, розтягнення або пульсуючу масу.



03a ПРОМИЙТЕ місце рани чистою (якщо можливо **ТЕПЛОЮ**) водою, щоб зменшити забруднення.



03b **ЗАСТОСУЙТЕ** чисту марлю, гемостатичну пов'язку та кровоспинний засіб до будь-якої неконтрольованої кровотечі.



04 Якщо НЕМАЄ доказів витоку кишечника та кровотечі, можна зробити швидку (до 60 секунд) спробу зменшити кількість кишечника за межами тіла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕ ЗАМІНЮЙТЕ, якщо є будь-які ознаки витоку кишечника або активної кровотечі.

УВАГА. НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ СИЛУ, щоб замінити вміст черевної порожнини. Не використовуйте силу для видалення сторонніх предметів.



05 Якщо заміна кишечника пройшла успішно, закрийте шкіру в місці розриву. Зробіть це за допомогою клейкої пов'язки. Може включати стрічку, клейку грудну клітку, затискачі для закриття рани.

06 СТАБІЛІЗУЙТЕ будь-які виступаючі предмети **ДИВИТИСЯ КАРТКУ 44 - Об'єкт Пірсинг тіла**

продовження на наступній сторінці...

Відкрита рана живота

Продовження зі сторінки 1



07 НАКРИТИ відкриту кишку ВОЛОГОЮ та СТЕРИЛЬНОЮ черевною пов'язкою.

КРОК 7 ВАЖЛИВО. Будь-яка відкрита кишка повинна бути ВОЛОГОЮ, щоб тканина не висхла.

- 1 - Переконайтеся, що пов'язка достатньо велика, щоб покрити всю відкриту кишку та область рани.
2. Використовуючи СТЕРИЛЬНУ СТОРОНУ бинта або іншу чисту тканину, зберіть весь вільний кишечник і закрийте всю рану.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕ ТОРКАЙТЕСЯ відкритих органів голими руками.

- 3 - Якщо ви використовуєте пов'язку з хвостиками, зав'яжіть її вільно, не зав'язуйте поверх рани.



08 НАКРИТИ бинт водонепроникним шаром. Намагайтеся використовувати прозорий матеріал, щоб можна було спостерігати ознаки кровотечі.

Приклади включають стерильну сторону пластикової обгортки, пакет для внутрішньовенної рідини, пластикову харчову плівку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕ ТИСУЙТЕ на органи або рану.



09 Використовуйте широку медичну стрічку, щоб прикріпити водонепроникну пов'язку до пораненого. Якщо стрічки немає, скористайтесь чистим бинтом або тканиною і нещільно зав'яжіть її.

ПРИМІТКА. Для дуже великих ран використовуйте кілька пов'язок, якщо необхідно. Стежте, щоб хвостики верхніх бинтів не закривали один одного.




10 Часто **МОНІТОРУЙТЕ** пораненого на ознаки шоку.

ВАЖЛИВО. Шок є основним симптомом, який необхідно лікувати під час початкової обробки ран живота.

ВАЖЛИВО. Шок може бути присутнім спочатку або розвинутися пізніше.



11 Тримайте пораненого в ТЕПЛІ. Відкриті рани живота загрожують переохолодженням.



12 **ДОКУМЕНТУЙТЕ** травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.