



Кровотеча з внутрішньої сторони гомілки, паху - імпровізований апарат для тиску



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

01

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



02

ЗАСТОСОВУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на пахову борозенку. Покладіть кулак у паховий жолоб на стороні пошкодження.


НАЙВАЖЛИВІШИЙ

Тут розташована стегнова артерія. На півдорозі між лобковою кісткою та передньою клубовою остю.

03

ЗНЯТИ марлеву пов'язку зі стерильного пакета.

ВАЖЛИВО - Якщо є кровоспинний засіб, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО.



04

Видаліть кулак, якщо він використовується для зупинки кровотечі. НЕГАЙНО заповніть порожнину рани кровоспинним засобом, застосовуючи ТИСКУ. Завершіть упакування менш ніж за 90 секунд.

ПРИМІТКА. Використовуйте стільки марлі або кровоспинного засобу, скільки потрібно.

ВАЖЛИВО - якщо проникаючий предмет застряг у тілі пораненого, НЕ ВИНЯТИ, забинтуйте.

05

ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, щоб бинт або марля з гемостатичним засобом простягалися на 3-5 см над шкірою.

ПРИМІТКА. ДОДАЙТЕ більше марлі, якщо марля не виступає принаймні на 2-3 см над шкірою. Необхідний для тиску.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

Якщо використовується спеціальна пов'язка (гемостатична), зніміть стару і накладіть нову пов'язку всередину рани. Поверніться до кроку 3.

08a

АБО

08b

Якщо упакований з марлею, додайте ще марлі, утримуйте тиск 3 хвилини довше, доки кровотеча не зупиниться.



06

Після заповнення марлею тримайте тиск до зупинки кровотечі - МІНІМУМ 3 хвилини.




07

Подивіться, чи зупинилася кровотеча, тримайте тиск, не відкривайте рану.

КРОК 7 ВАЖЛИВО – ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩОБ КРОВ НЕ ПРОСОКІЛА ЧИ КРІЗЬ ПОВ'ЯЗКИ АБО НАВКОЛО ЇЇ. Якщо кровотеча зупинилася, залиште пов'язку на місці. Тримайте тиск.


продовження на наступній сторінці...

Кровотеча з внутрішньої сторони гомілки, паху - імпровізований апарат для тиску Продовження зі сторінки 1



- 09** ВИБЕРІТЬ відповідний предмет у формі циліндра та ПОМІСТІТЬ його в пахову борозенку. ПІДТРИМУЙТЕ ТИСК ЗАВЖДИ.


ПРИКЛАДИ циліндр - ПОВНА пляшка з водою, жорстка каністра. Повинен залишатися жорстким, щоб підтримувати тиск.




- 12** УСТРАНИТЬ слабіну джгута перед використанням брашпиля або храповика.



- 10** ОБЕРІТЬ джгут достатньої довжини, щоб обернути область талії, або зв'яжіть 2 разом.




- 11** НАКЛАДІТЬ джгут (брашпилом або тріскачкою) безпосередньо над циліндром. Переконайтеся, що брашпиль (або тріскачка) знаходиться поблизу центру.




- 13** ЗАТЯГАЙТЕ джгут, доки не припиниться кровотеча та не буде пульсу під місцем накладання джгута.

КРОК 13 ВАЖЛИВИЙ. Якщо кровотеча не зупиняється, а пульс залишається, **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО джгут не провис.** Усуньте провисання, **ЗАТЯГНІТЬ** далі.



- 14** ПЕРЕВІРТЕ циліндр і джгут. Переконайтеся, що циліндр правильно розташований, а брашпиль знаходиться над циліндром.



- 15** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.