







COMBAT MEDIC/CORPSMAN TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE




Назофарингеальний дихальний шлях



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.


Nasopharyngeal Airway (NPA)



ПОКЛАДІТЬ пораненого на спину з нейтральною позицією шиї.




ПЕРЕВІРТЕ ніс і внутрішні ніздрі на наявність перешкод.




3НАЙДІТЬ і ВІДКРИТЬ дихальну трубку з аптечки.

ПРИМІТКА. Стандартна трубка (32 Fr) у наборах підходить більшості людей.




3МАСТЕ трубку гелем у наборі або водою.

ВІДКРИТИ праву ніздрю, обережно потягнувши кінчик носа вгору.




РОЗТАШУЙТЕ трубку, як показано. Розріз повинен знаходитися по центру.


КРОК 4 ВАЖЛИВО — НЕ використовуйте кров чи слину.



07 ВСТАВТЕ дихальний шланг під кутом 90 градусів до обличчя пораненого.




Плавно КОВЗАЙТЕ трубку, трубка повинна залишатися, як показано. Скос до середини.



Продовжуйте вводити, поки фланець не буде на одному рівні з ніздрею. Продовжуйте вставляти під кутом 90 градусів до голови.


УВАГА. НІКОЛИ не вставляйте трубку в ніздрю постраждалого з силою. Якщо відчувається опір, злегка поверніть. ЯКЩО права ніздря НЕ ВДАЄТЬСЯ, спробуйте ліву ніздрю - трубку потрібно буде повернути, щоб вирівняти її з лівою стороною. Якщо у пораненого кляпи, видаліть трубку на 1-3 см.



ПЕРЕВІРТЕ дихання пораненого, ПОДИВІТЬСЯ, СЛУХАЙТЕ, ПОМАЦАЙТЕ.



ПОМІЩІТЬ пораненого без свідомості в положення ВІДНОВЛЕННЯ на боці. Запобігайте аспірації рідин.



ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.