











КОНВЕРСІЯ ТУРНІКЕТА




РОЗКРИЙТЕ місце поранення, якщо цього не було зроблено раніше.

ПРИМІТКА: За потреби зніміть одяг та спорядження.




Вийміть кровоспинний перев'язувальний матеріал або бинт зі стерильної упаковки.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатична пов'язка або бинт недоступні, використовуйте чисту суху тканину.



ОЗ.1 Щільно затампонуйте рану гемостатичним матеріалом.



ПРИМІТКА ДО КРОКУ 3: Заповніть та туго затампонуйте всю порожнину рани, підтримуючи сильний тиск на рану. Може знадобитися більш, ніж одна гемостатична пов'язка або бинт.




Переконайтеся, що гемостатична пов'язка або бинт виступають на 3-5 см над шкірою.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 4: Якщо гемостатична пов'язка або бинт не виступають на 3-5 см над шкірою, накладіть додаткову кровоспинну пов'язку або бинт.






Після тампонування рани продовжуйте з силою тиснути на рану руками протягом щонайменше 3 хвилин.



Вийміть компресійний бандаж з упаковки.



Помістіть подушечку компресійного бандажа безпосередньо на рану або на попередньо накладену гемостатичну пов'язку, продовжуючи здійснювати прямий тиск на рану.