



Упаковка ран і пов'язка, що тисне



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

01

ВИКРИТИ травму та знайти джерело кровотечі.
ПРИМІТКА. ЗНІМІТЬ або РІЗІТЬ одяг та обладнання за потреби.



02

ЗНАЙДІТЬ джерело найактивнішої кровотечі та тиску.



03

ЗНЯТИ марлеву пов'язку зі стерильного пакета.




04

ЩІЛЬНО ЗАТИСНІТЬ марлю всередині рани в місці найбільш активної кровотечі.

ПРИМІТКА. ЗАПОВНІТЬ І ЩІЛЬНО ПРИТИСНІТЬ всю порожнину рани, тримайте тиск, використовуйте стільки марлі, скільки потрібно.

ВАЖЛИВО - якщо проникаючий предмет застряг у тілі пораненого, НЕ ВИНЯТИ, забинтуйте.




05

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО марля заповнює всю порожнину рани і виступає на 3-5 см над шкірою.



06

Після заповнення марлею тримайте тиск до зупинки кровотечі - МІНІМУМ 3 хвилини.



07

Подивіться, чи зупинилася кровотеча, тримайте тиск, не відкривайте рану.

КРОК 5 ПРИМІТКА. ДОДАТИ ще марлю, якщо марля не висувається над шкірою на 3-5 см. Необхідний для тиску.

ЯКЩО КРОТОТЕЧА НЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

08a

Якщо використовується спеціальна пов'язка (гемостатична), зніміть стару і накладіть нову пов'язку всередину рани. Поверніться до кроку 3.

АБО

08b

Якщо упакований з марлею, додайте більше марлі, тримайте тиск 3 хвилини довше.




09

ЗНЯТИ пов'язку, що тисне, з мішка.



10

НАКЛАДІТЬ пов'язку на рану та марлю, продовжуючи чинити постійний тиск.



11

ЩІЛЬНО ОБМОТАЙТЕ кінцівку, переконавшись, що краї подушечки закриті.

11 ПРИМІТКА. Якщо пов'язка має давить смужку, використовуйте її для посилення тиску.

продовження на наступній сторінці...