










Упаковка ран і пов'язка, що тисне



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

01

ВИКРИТИ травму та знайти джерело кровотечі. ПРИМІТКА. ЗНІМІТЬ або РІЗІТЬ одяг та обладнання за потреби.



3НАЙДІТЬ джерело найактивнішої кровотечі та тиску.




3НЯТИ марлеву пов'язку зі стерильного пакета.



ЩІЛЬНО ЗАТИСНІТЬ марлю всередині рани в місці найбільш активної кровотечі.

ПРИМІТКА. ЗАПОВНІТЬ і ЩІЛЬНО ПРИТИСНІТЬ всю порожнину рани, тримайте тиск, використовуйте стільки марлі, скільки потрібно.

ВАЖЛИВО - якщо проникаючий предмет застряг у тілі пораненого, НЕ ВИНЯТИ, забинтуйте.



05 ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО марля заповнює всю порожнину рани і виступає на 3-5 см над шкірою.

3+)

об Після заповнення марлею тримайте тиск до зупинки кровотечі - МІНІМУМ 3 хвилини.



Подивіться, чи зупинилася кровотеча, тримайте тиск, не відкривайте рану.

КРОК 5 ПРИМІТКА. ДОДАТИ ще марлю, якщо марля не висувається над шкірою на 3-5 см. Необхідний для тиску.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ ПІД КОНТРОЛЕМ 08a

Якщо використовується спеціальна пов'язка (гемостатична), зніміть стару і накладіть нову пов'язку всередину рани. Поверніться до кроку 3.



08b


Якщо упакований з марлею, додайте більше марлі, тримайте тиск 3 хвилини довше.



3НЯТИ пов'язку, що тисне, з мішка.



10 НАКЛАДІТЬ пов'язку на рану та марлю, продовжуючи чинити постійний тиск.



щільно ОБМОТАЙТЕ кінцівку, переконавшись, що краї подушечки закриті.

11 ПРИМІТКА. Якщо пов'язка має давить смужку, використовуйте її для посилення тиску.

















Упаковка ран і пов'язка, що тисне

Продовження зі сторінки 1




ЗАКРІПНІТЬ кінець бинта або закріпіть смужку для тиску.



ПЕРЕВІРТЕ кровообіг, промацавши пульс на кінцівках.

ПРИМІТКА. ВАЖЛИВО: якщо шкіра стає холодною, синього кольору, немає пульсу, можливо, потрібно послабити пов'язку.

ПРИМІТКА. ВАЖЛИВО: якщо кровотеча відновиться, може знадобитися джгут.



ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.