CMC TCCC
РІВЕНЬ 3

Переклад tccc.org.ua

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТУРНІКЕТА

ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

1

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.

2



Перевірте раніше накладений(і) турнікет(и) на предмет ефективності зупинки кровотечі та близькості розташування до її джерела.

3



Перевірте наявність дистального пульсу.

ПРИМІТКА: Якщо є дистальний пульс, спробуйте затягнути турнікет сильніше. Якщо пульс все ще присутній, негайно перейдіть до 4 кроку.

4

Накладіть рекомендований Комітетом з ТССС турнікет безпосередньо на шкіру на 5-8 см вище місця кровотечі, якщо це можливо (див. Інструкція з накладання турнікету).

5



Повільно послаблюйте початковий турнікет упродовж однієї хвилини.

6



Слідкуйте за місцем, де виникла кровотеча, та переконайтеся, що вона не відновилася.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 6: За відновлення кровотечі негайно повторно затягніть накладений початково турнікет, переконавшись, що кровотеча зупинилась, а також сильніше затягніть прицільно накладений турнікет. Повторюйте 5 і 6 кроки, поки кровотеча не буде зупинена прицільним турнікетом.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 8: Переміщені (початкові) турнікети не слід затягувати повністю, але слід усунути всі провисання.

7



Переконайтеся, що дистальний пульс відсутній, а кровотеча не відновилася.

8



Посуньте початково накладений турнікет вниз, проте залиште його, не знімаючи, ближче (проксимальніше) біля прицільного.

9



На новому турнікеті зазначте час його накладання.

10



Задокументуйте всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.