













ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ В ДІЛЯНЦІ ШИЇ



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.


РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі. ПРИМІТКА: Щоб розкрити місце поранення належним чином, може знадобитися зрізати одяг.



3АСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на джерело кровотечі.


ВИТЯГНІТЬ гемостатичну пов'язку з тактичної індивідуальної аптечки (JFAK) пораненого.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатичної пов'язки немає, використовуйте бинт або чисту суху тканину.



Проведіть щільне ТАМПОНУВАННЯ рани гемостатичною пов'язкою до заповнення всієї порожнини рани. Продовжуйте утримувати тиск. Завершіть тампонування в межах 90 сек.


ПРИМІТКА: Для зупинки кровотечі може знадобитися більше однієї пов'язки чи бинта.




ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що гемостатична пов'язка або бинт виступає над шкірою на 3-5 см.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 5: Якщо гемостатична пов'язка або бинт не виступає над шкірою на 3-5 см, накладіть додаткову гемостатичну пов'язку або бинт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Якщо в рані є стороннє тіло, забинтуйте його на місці. Не виймайте предмет.



Після тампонування рани продовжуйте застосовувати прямий тиск руками аж до зупинки кровотечі. УТРИМУЙТЕ тиск мінімум 3 хв.



ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ, чи кровотеча зупинилась, одночасно утримуючи тиск


ПРИМІТКА: Переконайтеся, що кров не просочується через гемостатичну пов'язку або навколо неї. Якщо кровотеча зупинилася, залиште гемостатичну пов'язку на місці, продовжуючи утримувати тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ БУЛА ЗУПИНЕНА:


Якщо використано гемостатичний бинт — вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 3.



Якщо використано звичайний бинт - додайте ще один і утримуйте тиск на рану (впродовж 3 хв), поки кровотеча не зупиниться.



РОЗМІСТІТЬ широкий еластичний бинт (~15 см) поверх гемостатичної пов'язки, залишаючи достатній за довжиною кінець, щоб потім зав'язати вузол.



Продовжуючи утримувати тиск, ЗАБИНТУЙТЕ затампоновану рану (обмотайте бинт не менше, ніж 1,5 рази), повністю її покривши.



БИНТУЙТЕ по діагоналі через грудну клітку, попід протилежною пахвою та по спині в напрямку до рани.

Продовження на наступній сторінці...