

знеболювальні препарати

ВАЖЛИВО - У цьому посібнику з фармакології ТССС надається інформація про використання лікарських засобів виключно на основі Рекомендацій ТССС.

НАЛОКСОН

Антагоніст опіоїдних рецепторів

Використовується бойовими медиками (СМС)

Використовується при передозуванні наркотичними опіоїдними препаратами з метою усунення їх ефектів, до яких належать, зокрема, пригнічення дихання, седативний ефект та гіпотензія.

ДОЗУВАННЯ:

0.4-2 мг ВВ, ІН, або ВМ: повторюйте кожні 2-3 хв до максимальної дози 10 мг, якщо є покази

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

ВВ. ІН. ВМ

ПРОТИПОКАЗИ:

Гіперчутливість до налоксону, застосовувати з обережністю пацієнтам із нейроциркуляторною астенією; вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази.

ПОТЕНЦІЙНІ ПОБІЧНІ ДІЇ:

Усунення знеболювального ефекту, тремор, гіпервентиляція, сонливість, пітливість, підвищення АТ, тахікардія, нудота, блювання.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Кардіотоксичні препарати (можуть спричинити значні ураження серцево судинної системи) - застосовувати разом з обережністю, усуває знеболювальну дію наркотичних (опіоїдних) агоністів.



ПОЧАТОК ДІЇ / ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 1-2 хв/5-15 хв/різна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Передозування налоксону малоімовірно, якщо його застосовувати згідно з інструкцією; налоксон повинен бути під рукою щоразу, коли вводяться наркотичні препарати; титруйте до досягнення ефекту (усунення ознак 1 симптомів передозування наркотичного препарату), але продовжуйте контролювати біль пораненого; дія налоксону може закінчитися раніше за дію наркотиків — уважно спостерігайте за ознаками повторного передозування опіатами.

Переконайтеся, що у поранених вилучено всю зброю, засоби зв'язку та спеціальні засоби.



Ця інформація не повинна використовуватися для введення цих ліків будь-де, крім надання допомоги пораненим у бойових умовах (на полі бою або в бойових/тактичних умовах).

Продовження на наступній сторінці...

#TCCC-CMC-SC-26 13 MAY 2021