COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE












ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ В ПАХВОВІЙ ДІЛЯНЦІ




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

увальник, ПРИМІТКА: Щоб розкрити місце поранення належним чином, може знадобитися зрізати одяг.



01 ПІДНІМІТЬ руку, щоб відкрити рану та оцінити джерело кровотечі.


ПРИМІТКА: Найкраще положення для лікування пораненого — сидяче. Якщо поранений не може перебувати в сидячому положенні, підведіть його якомога вище, щоб накласти еластичний бинт.



3АСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на найбільш активне джерело кровотечі.


Використовуючи тактичну індивідуальну аптечку пораненого (JFAK), витягніть гемостатичну пов'язку з її стерильного упакування.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатичної пов'язки немає, використовуйте бинт або чисту суху тканину.



РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.


РОЗТАШУЙТЕ руку пораненого під кутом 90 градусів, поклавши її собі на плече (щоб підтримувати руку піднятою), та виконайте кроки 5–13.



Проведіть щільне ТАМПОНУВАННЯ рани під рукою за допомогою гемостатичної пов'язки або бинта до заповнення всієї порожнини рани, одночасно застосовуючи прямий тиск на рану (завершуючи в межах 90 сек).


ПРИМІТКА: Для зупинки кровотечі може знадобитися більше однієї пов'язки чи бинта.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Якщо в рані є стороннє тіло, забинтуйте його на місці. НЕ виймайте предмет.



ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що гемостатична пов'язка або бинт виступає над шкірою на 3-5 см.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 5: Якщо гемостатична пов'язка або бинт не виступає над шкірою на 3-5 см, накладіть додаткову гемостатичну пов'язку або бинт.



О7 УТРИМУЙТЕ тиск впродовж мінімум 3 хв.

ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ, чи кровотеча зупинилась, одночасно утримуючи тиск.

просочується через гемостатичну пов'язку або навколо неї. Якщо кровотеча зупинилася, залиште гемостатичну пов'язку на місці, зберігаючи тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ БУЛА ЗУПИНЕНА:



Якщо використано гемостатичний бинт — вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 3.





Якщо використано звичайний бинт або інший перев'язувальний матеріал - додайте ще одинбинт/матеріал і утримуйте тиск на рану (впродовж ще 3 хв), поки кровотеча не зупиниться.