

знеболювальні препарати

ВАЖЛИВО - У цьому посібнику з фармакології TCCC надається інформація про використання лікарських засобів виключно на основі Рекомендацій TCCC.

ОНДАНСЕТРОН

Протиблювотний препарат
(антагоніст 5-HT₃ рецепторів)

Використовується бойовими
медиками (СМС)

Профілактика та лікування нудоти та блювання, пов'язаних із введенням знеболювальних препаратів.

ДОЗУВАННЯ:

4 мг кожні 8 год, повторіть введення через 15 хв, якщо симптоми зберігаються, але не вводьте більш, ніж 8 мг у 8-ГОДИННИЙ проміжок часу.

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

ВВ, ВК, транслінгвально. ВМ

ПРОТИПОКАЗИ:

Підвищена чутливість до ондансетрону, застосовувати з обережністю у пацієнтів з печінковою недостатністю; вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази.

ПОТЕНЦІЙНІ ПОБІЧНІ ДІЇ: ЕФЕКТИ:

Запаморочення, головний біль, седація, діарея, закреп, сухість у роті.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Рифампін може знизити рівень ондансетрону.



ПОЧАТОК ДІЇ / ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ:

20 сек-4 хв (ВВ<ВК<транслінгвальний<ВМ)/ 10-40 хв/4 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Не призначайте пероральні форми — використовуйте транслінгвально таблетку, що розчиняється в ротовій порожнині (ОРТ) (ондансетрон для перорального застосування НЕ є прийнятною альтернативою формі ОРТ); не можна брати ОРТ мокрими руками; якщо вводите препарат ВВ чи ВК, слід робити це повільно струминно.

Ця інформація не повинна використовуватися для введення цих ліків будь-де, крім надання допомоги пораненим у бойових умовах (на полі бою або в бойових/тактичних умовах).