

Лікування шоку/Рідинна ресусцитація

У цій фармакологічній довідці ТССС подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов ТССС. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).

ДИМЕДРОЛ (ДИФЕНГІДРАМІН)

Антигістамінний препарат першого покоління (блокатор Н1-рецепторів)

Використовується бойовими медиками

Для екстреного лікування анафілаксії або алергічних реакцій, а також лікування побічних реакцій на медичні препарати.

ДОЗУВАННЯ:

Початкова доза становить 25 мг, проте можна розглянути введення 50 мг із врахуванням клінічної ситуації; за потреби повторювати кожні 4-6 год. Максимальна добова доза складає 300 мг.

四月X(N) ВВЕДЕННЯ:

BM, BK ta BB.

ПРОТИПОКАЗИ:

Документально підтверджена гіперчутливість до димедролу, грудне годування, вагітність (можна використати за крайньої потреби).

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ Седативний ефект/оглушення/сонливість, в'ялість, порушення рівноваги, запаморочення, головний біль, рідко екстрапірамідні ефекти, тремор або судоми.

ВЗАЄМОДІЯ З

Підсилює дію інших лікарських засобів, що викликають сонливість або пригнічення свідомості (седативні, снодійні препарати).

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 10 c – 20 хв (ВВ < ВК< ВМ)/ від 15 хв до 2 год/ 2-6 год.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Немає жодних доказів щодо використання монотерапії Н1-антигістамінними препаратами при лікуванні анафілактичного стану – димедрол слід використовувати лише як доповнення до адреналіну; повільніший початок та більша тривалість дії димедролу можуть допомогти підтримати лікувальний ефект. Препарат успішно застосовується при лікуванні реакцій, що не загрожують життю. При використанні димедролу у бійців має бути вилучена зброя, засоби зв'язку та інше спеціальне обладнання.

DIPHENHYDRAMINE INJECTION

Продовження на наступній сторінці...