COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE










ПАЛЬЦЕВА ТОРАКОСТОМІЯ


...ПРОДОВЖЕННЯ




Дотримуючись правил асептики, НАБЕРІТЬ у шприц потрібну кількість лідокаїну за допомогою голки 18g та ІНФІЛЬТРУЙТЕ підшкірно-жирову клітковину та глибші шари тканин міжребер'я у місці доступу 1% розчином лідокаїну, використовуючи голку 23g довжиною 4 см.

ПРИМІТКА: Не перевищуйте загальну кількість використаного 1% розчину лідокаїну понад 0,5 мл/кг.


ПРИМІТКА: Якщо пораненому вводили кетамін для седації чи знеболення, лідокаїн може не знадобитися.



(d) Розташуйте затискач Келлі з зімкненими кінцями на ребрі та спрямуйте затискач в бік міжребер'я над ребром.




- (g) Коли палець буде на місці, вийміть затискач.
- (h) Розшитре отвір у плеврі і переконайтесь у відсутності спайок.




- 3РОБІТЬ РОЗРІЗ шкіри паралельно до ребра.
- (а) Розріз має бути довжиною 2-3 см, паралельно до ребра над обраним місцем доступу або безпосередньо над ребром (яке таким чином обмежить собою глибину розрізу), та продовжуватись углиб до міжреберних м'язів.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Дійте обережно, щоб не проколоти легеню. Завжди орієнтуйтесь на верхній край ребра, щоб уникнути травмування міжреберних нервів та судин.




(e) Розкрийте затискач Келлі, максимально розвівши таким чином м'які тканини та розширивши отвір.




- (і) Відчуйте тканину легені.
- (j) Переконайтесь, що всередині є повітря і рожева губчаста поверхня легені (повинна бути одразу видима). Якщо цього немає, ви можете бути всередині черевної порожнини.



- (b) Затискачем Келлі виконайте тупе розведення м'яких тканин, рухаючись над ребром вглиб міжребер'я, та проколіть парієтальну плевру.
- (с) Прислухайтесь та відчуйте гучний звук виходу повітря ("хлопок") у той момент, коли кінчик затискача провалиться у порожнину.



(f) Використовуючи кінці затискача, щоб підтримувати отвір відкритим, обережно вставте палець в рукавичці через розріз у плевральну порожнину, щоб переконатися у правильності місця знаходження.



- (k) Залиште палець на 10-15 секунд для того, щоб повітря могло вийти з грудної клітки.
- (I) Вийміть палець з отвору.