



ТОРАКОСТОМІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ПЛЕВРАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ


...Продовження



(m) Витягуючи палець, вставте кінець дренажної трубки в отвір та продовжуйте вводити трубку в напрямку вниз (до спини) і до голови.




(n) Продовжуйте вводити трубку, поки останній її боковий отвір не опиниться на глибині 2,5-5 см всередині грудної клітки.




ПРИЄДНАЙТЕ проксимальний кінець трубки до одностороннього клапана (наприклад клапан Геймліха) та зніміть затискач Келлі з трубки.


ПРИМІТКА: Продовжуйте введення трубки, допоки не буде досягнуто плевральної порожнини. Дренаж має бути встановлений ближче до верхівки легені при пневмотораксі та ближче до основи легені при гемотораксі (рідині в плевральній порожнині).



3АФІКСУЙТЕ трубку за допомогою шовкового шовного матеріалу №0 використовуючи кисетний шов.



12 НАКЛАДІТЬ оклюзійну наліпку.




ПЕРЕВІРТЕ, чи виділилося щось через дренажну трубку, оцінивши візуально ємність з клапаном типу Геймліха чи систему для дренажу плевральної порожнини (наприклад, Pleurovac).

ПРИМІТКА: Якщо промислово виготовлені оклюзійні наліпки недоступні, використайте марлеву пов'язку, просочену вазеліном, пов'язки 10 х 10 см для дренажів та марлеві серветки. Розмістіть вазелінову пов'язку та дві пов'язки 10 х 10 см для дренажів навколо місця введення трубки: одну згори, одну знизу. Покладіть кілька марлевих серветок 10 х 10 см зверху над пов'язками для дренажів. Закріпіть пов'язки пластиром, повністю закриваючи їх згори, утворивши таким чином оклюзійну наліпку.



14 ПЕРЕОЦІНІТЬ стан постраждалого.

- (а) Перевірте наявність дихальних шумів над обома легенями.
- (b) Запотівання трубки є індикатором того, що дренаж встановлено правильно, а бокові отвори трубки прохідні.
- (с) Перевірте наявність покращення клінічних показників, наприклад зменшення дихальної недостатності та/або зростання сатурації О2 до 90% або вище.
- (d) Ведіть спостереження за станом пораненого та записуйте життєві показники кожні 15 хвилин.



3АДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 ТССС та прикріпіть її до постраждалого.