


Кровотеча з внутрішньої сторони гомілки, паху - імпровізований апарат для тиску Продовження зі сторінки 1




- 09** ВИБЕРІТЬ відповідний предмет у формі циліндра та ПОМІСТІТЬ його в пахову борозенку. ПІДТРИМУЙТЕ ТИСК ЗАВЖДИ.

ПРИКЛАДИ циліндр - ПОВНА пляшка з водою, жорстка каністра. Повинен залишатися жорстким, щоб підтримувати тиск.




- 10** ОБЕРІТЬ джгут достатньої довжини, щоб обернути область талії, або зв'яжіть 2 разом.



- 11** НАКЛАДІТЬ джгут (брашпилом або тріскачкою) безпосередньо над циліндром. Переконайтеся, що брашпиль (або тріскачка) знаходиться поблизу центру.



- 12** УСТРАНИТЬ слабину джгута перед використанням брашпиля або храповика.




- 13** ЗАТЯГАЙТЕ джгут, доки не припиниться кровотеча та не буде пульсу під місцем накладання джгута.

КРОК 13 ВАЖЛИВИЙ. Якщо кровотеча не зупиняється, а пульс залишається, **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО джгут не провис.** Усуньте провисання, **ЗАТЯГНІТЬ** далі.



- 14** ПЕРЕВІРТЕ циліндр і джгут. Переконайтеся, що циліндр правильно розташований, а брашпиль знаходиться над циліндром.



- 15** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.