

ALL SERVICE MEMBERS TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

КУРС ДЛЯ ВСІХ ВІЙСЬКОВИХ - TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE



ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАННЯ НАВИЧОК

04 Продовження...

- (3) Проведіть огляд/пальпацію будь-яких ран, виконуючи ковзні рухи обома руками та кінчиками пальців вздовж грудної клітки, живота та спини. Для огляду спини встаньте на коліна біля пораненого, нахиліться через його тіло та візьміть постраждалого за талію та плечі, перевернувши таким чином його до своїх колін. Після цього змістіть або зніміть одяг і бронежилет, щоб дістатися спини.
- (4) Визначте ознаки та симптоми проникаючого або відкритого поранення грудної клітки:
 - "Смокчучий" або "шиплячий" звук під час вдиху пораненого,
 - Утруднене дихання,
 - Колота(і) рана(и) грудей,
 - Піна або бульбашки навколо травми,
 - Кашель або харкання кров'ю,
 - Біль у плечах або грудній клітці.
- (5) Розмістіть ПРИТОМНОГО постраждалого у положенні СИДЯЧИ або у СТАБІЛЬНІЙ БОКОВІЙ ПОЗИЦІЇ. НЕПРИТОМНОГО постраждалого розміщено у СТАБІЛЬНІЙ БОКОВІЙ ПОЗИЦІЇ.

КРОВООБІГ:

контролюйте кровообіг пораненого, спостерігайте щодо появи ознак і симптомів шоку та/або надайте допомогу при їх розвитку.

ПРИМІТКА: Повторна оцінка наявності кровотечі. Проведіть переоцінку кожного джгута та/або пов'язки, які були накладені раніше. Звільніть доступ до місця поранення та визначте, чи зупинена кровотеча. Визначте та чітко позначте всі місця накладення джгутів, вказавши час їх накладання, якщо цього не було зроблено раніше. Коли дозволяють час і тактична ситуація, перевірте, чи немає подальшої кровотечі та чи відсутній пульс на кінцівці нижче джгута.

Оцінка можливих ознак шоку.

Оцініть появу шоку внаслідок масивної кровотечі (зверніть увагу на прискорене дихання, втрату концентрації та зміну рівня свідомості, спітнілу, холодну, липку шкіру та/або бліду/сіру шкіру). Заходи з попередження шоку є набагато легшими за його лікування, тому ,за можливості, необхідно зупинити будь-яку кровотечу.

ППОТЕРМІЯ:

Запобігайте гіпотермії, яка посилюється через надмірну кровотечу, тримаючи пораненого в сухому та теплому середовищі.

ПРИМІТКА: Запобігання гіпотермії. Спробуйте якнайшвидше перемістити пораненого з сирої землі на ізольовану суху поверхню. Зніміть мокрий одяг, залишивши сухий на місці. Накрийте пораненого будь-чим, що є в наявності (куртками, сухими ковдрами, спальними мішками або тим, що зберігає тепло та зберігає пораненого сухим).

- Оцініть та надайте допомогу при інших пораненнях, таких як травма ока, опіки або переломи (визначте потребу в накладенні щитка для очей, опікової пов'язки або шини). Також перевірте наявність ознак або симптомів травми голови та повідомте про свої спостереження медичному персоналу. Важливо поділитися будь-якою інформацією про те, як і де ви знайшли пораненого, які ознаки травм ви помітили, або про які симптоми повідомив вас постраждалий. Наприклад, чи був поранений у свідомості або непритомний, чи скаржився він на головний біль або блювоту, дзвін у вухах, подвоєння зору та/або запаморочення, чи він відмітив, що «щось не так або я не почуваюся добре».
- Задокументуйте надану медичну допомогу у Картці пораненого ТССС та прикріпіть її до одягу постраждалого, якщо ви перебуваєте безпосередньо на полі бою.

LAST UPDATED: 2023-11-12T09:13:38Z

07 Повідомте медичний персонал про ваші знахідки та надану допомогу; за потреби – допоможіть евакуювати поранених.