CMC TCCC РІВЕНЬ 3

Переклад tccc.org.ua

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

MARCH

ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ В ДІЛЯНЦІ ШИЇ

ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.
ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

1 РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.
ПРИМІТКА: Можливо, вам прийдеться розрізати одяг, щоб належним чином оглянути рану.

ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на джерело кровотечі.

3 ВИТЯГНІТЬ гемостатичну пов'язку з тактичної індивідуальної аптечки (JFAK) пораненого.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатичної пов'язки немає, використовуйте бинт або чисту суху тканину.



Проведіть щільне ТАМПОНУВАННЯ рани гемостатичною пов'язкою до заповнення всієї порожнини рани. Продовжуйте утримувати тиск. Завершіть тампонування в межах 90 сек.

ПРИМІТКА: Для зупинки кровотечі може знадобитися більше однієї пов'язки чи бинта.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Якщо в рані є стороннє тіло, забинтуйте його на місці. Не виймайте предмет.



ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що гемостатична пов'язка або бинт виступає над шкірою на 3-5 см.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатична пов'язка або бинт не виступає над шкірою на 3-5 см, накладіть додаткову гемостатичну пов'язку або бинт.

Після тампонування рани продовжуйте застосовувати прямий тиск руками аж до зупинки кровотечі. УТРИМУЙТЕ тиск мінімум 3 хв.



ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ, чи кровотеча зупинилась, одночасно утримуючи тиск

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що кров не просочується через гемостатичну пов'язку або навколо неї. Якщо кровотеча зупинилася, залиште гемостатичну пов'язку на місці, продовжуючи утримувати тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ БУЛА ЗУПИНЕНА:

8.1 Якщо використано гемостатичний бинт – вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 3.

АБО

8.2 Якщо використано звичайний бинт - додайте ще один і утримуйте тиск на рану (впродовж 3 хв), поки кровотеча не зупиниться.



РОЗМІСТІТЬ широкий еластичний бинт (~15 см) поверх гемостатичної пов'язки, залишаючи достатній за довжиною кінець, щоб потім зав'язати вузол.



Продовжуючи утримувати тиск, ЗАБИНТУЙТЕ затампоновану рану (обмотайте бинт не менше, ніж 1,5 рази), повністю її покривши.

БИНТУЙТЕ по діагоналі через грудну клітку, попід протилежною пахвою та по спині в напрямку до рани.

Продовження на наступній сторінці...

ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ В ДІЛЯНЦІ ШИЇ

...продовження



БИНТУЙТЕ навколо шиї, попід рукою, туго натягуючи еластичний бинт (створення додаткового тиску) та покриваючи перев'язувальний матеріал.

ПРИМІТКА: Не використовуйте пластиковий елемент для тиску на шиї.



ЗАФІКСУЙТЕ бинт, зав'язавши його кінці в міцний вузол.

ЗАФІКСУЙТЕ кінці вузла, обмотавши їх липкою стрічкою (шириною 7,5 см), зробивши мінімум 1,5 оберти.

ЗАФІКСУЙТЕ верхню частину руки (зі сторони поранення) до грудної клітки за допомогою бинта.

ПРОДОВЖУЙТЕ ОЦІНЮВАТИ рану на предмет відновлення кровотечі.



ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.