CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ŽGUTI KONVERSIOON

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi



PALJASTA haava piirkond, kui seda pole eelnevalt tehtud

MÄRKUS: Vajadusel eemalda kannatanu riided ja varustus

VÕTA hemostaatiline side või marli steriilsest pakendist VÄLJA

MÄRKUS: Kui hemostaatilist sidet või marlit pole käepärast, kasuta puhast ja kuiva riidetükki



PAKI side tihedalt haavale



MÄRKUS: Täida ja suru kogu haava õõnsus tihedalt täis, hoides samal ajal tugevat survet haavale . Vajalik võib olla rohkem kui üks hemostaatiline side või marli

VEENDU, et hemostaatiline side või marli ulatuks nahapinnast 3–5 cm kõrgemale

MÄRKUS: Kui hemostaatiline side või marli ei ulatu nahapinnast 3–5 cm kõrgemale, aseta peale täiendav hemostaatiline side või marli

MÄRKUS: Kui kannatanu kehasse on kinni jäänud läbistav ese, seo see kinni. Ära eemalda eset

PÄRAST pakkimist jätka käsitsi tugeva surve avaldamist vähemalt 3 minutit



VÕTA surveside (“nn Israeli side”) pakendist välja



ASETA survesideme padi otse haavale või eelnevalt paigaldatud hemostaatilisele sidemele, jätkates samal ajal otsest survet

Jätkub järgmisel lehel...

ŽGUTI KONVERSIOON

...Jätkub



MÄHI surve-/elastse side tihedalt ümber jäseme, koondades surve haavale ja veendudes, et padja servad oleksid kaetud

MÄRKUS: Kui sidemel on survelatt, tõmba elastne side täielikult läbi survelati, tõmba side tihedalt kinni ja lükka see survelati ülaosa kohale tagasi, surudes selle padjale



KINNITA sideme lõpp lõpuklambri või plaastriga sideme viimase sidumisringi külge



AEGLASELT lõdvenda žgutt (ühe minuti jooksul): jälgi sidet verejooksu suhtes

MÄRKUS: Võimalusel konverteeri žgutid vähem kui 2 tunni jooksul, kuid ära eemalda žgutti, mis on peal olnud üle 6 tunni

MÄRKUS: Kui verejooks kordub, pinguta algset žgutti uuesti, veendudes, et verejooks peatub ja distaalne pulss puudub



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge