CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ÜHE ABISTAJA MASK-HINGAMISKOTT (MH) TEHNIKA

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi



POSITSIONEERI end patsiendi pea kohale

Sisesta nasofarüngeaal (nina-neelu) toru (NPA-toru)

PANE MH KOKKU (ühendage mask koti pordiga)



HOIA mask patsiendi suu kohal "EC" tehnika abil, kasutades järgmist protseduuri:

MÄRKUS: EC-käeasendi tehnikat sooritatakse ühe käega



MOODUSTA "C"-täht, asetades pöidla maski ninajuurt katvale osale ja nimetissõrme lõualõhe katvale osale



SULGE mask kindlalt näole, surudes pöidla ja nimetissõrmega allapoole, samal ajal tõmmates alalõualuud üles, MOODUSTA "E"-täht ja ava hingamisteed pea kallutamise/lõua tõstmise liigutusega

SÄILITA maski lekkekindel asend ühe käega, surudes kindlalt maski, et hoida seda paigal ja tagada selle hermeetilisus patsiendi suu kohal



PIGISTA kotti teise käega 1-2 sekundit, jälgides samal ajal rindkere tõusmist, et veenduda kopsude efektiivses õhuga täitumises

JÄTKA KOTI PIGISTAMIST iga 5–6 sekundi järel (10–12 hingetõmmet minutis)

MÄRKUS: Teise võimalusena võib kotti suruda vastu jalga või käsivart, et patsiendile suuremat hingamismahtu anda või käte väsimust leevendada



JÄTKA ventilatsiooni, jälgi spontaanseid hingamisi ja kontrolli perioodiliselt pulssi



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge