Лікування шоку/Рідинна ресусцитація

У цій фармакологічній довідці TCCC подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов TCCC. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).

ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА

Антифібринолітичний препарат

Використовується бойовими медиками

Для поранених з передбачуваною потребою в масивному переливанні крові; геморагічним шоком, однією або кількома великими ампутаціями, проникаючим пораненням тулуба або ознаками важкої кровотечі; для поранених з ознаками або симптомами важкої черепно-мозкової травми чи ознаками порушення свідомості, пов'язаного з вибуховою або тупою травмою.

ДОЗУВАННЯ:	2 г повільно струминно ВВ або ВК.
ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:	ВВ або ВК.
ПРОТИПОКАЗИ:	Підвищена чутливість до транексамової кислоти, субарахноїдальний крововилив, активне дисеміноване внутрішньосудинне згортання; препарат вважається відносно безпечним під час вагітності за наявності клінічних показань.
МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДІЇ:	Розмитість зору або порушення сприйняття кольорів, нудота, блювання, діарея (тимчасова).
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:	Концентрат протромбінового комплексу (концентрат комплексу фактора IX) або концентрати антиінгібіторних коагулянтів - небезпека підвищення ризику тромбозу.



ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30 с – 5 хв/ 30 хв – 2 год / 24 год.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:
Призначається якнайшвидше, але не пізніше 3 годин від початку ураження.

Продовження на наступній сторінці…