CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

PULSI HINDAMINE

MÄRKUS: KUI PULSI LEIDMINE PIIRKONNAST EI ÕNNESTU, SIIS JÄTKA TEGEVUSEGA EELDADES, ET PULSSI SEAL EI OLE. ÄRA "JÄÄ KINNI" PULSI OTSIMISSE!

KAROTIIDIPULSS
(unearteril)

RADIAALPULSS
(randmel)

FEMORAALPULSS
(reiearteril)

JALASELJA ARTERI
PULSS

TAGUMISE
SÄÄREARTERI PULSS

CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

RADIAALPULSI HINDAMINE

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

1



ASETA kannatanu käsi peopesaga ülespoole

MÄRKUS: Selles asendis peaksid nägema naha all kõrgenenud ala (seal all on kõõlus)

2



PANE oma juhtiva käe keskmine ja nimetissõrm KOKKU

3

ASETA sõrmed kõõluse kõrvale samal küljel, kus asub kannatanu pöial

MÄRKUS: Kui Su sõrmed on kõval pinnal (randmeluudel) , liiguta neid mööda kõõlust allapoole ja kuni need jõuavad pehmema piirkonnani

4



VAJUTA sõrmedega õõnsasse kohta, et tunda naha all olevat radiaalarterit

MÄRKUS: Kui te ei tunne pulssi, vajutage veidi tugevamini, olles ettevaatlik, et kannatanut mitte vigastada

MÄRKUS: Kui Sul on endiselt raskusi radiaalarteri leidmisega, siis libista sõrmi pikki kõõluse kulgu randme poole kuni jõuad randmeluude alumise servani

MÄRKUS: Pulssi on kergem tunda kohas, kus õõnes ruum kohtub randmeluudega

5



LOENDA pulsilööke 15 sekundi jooksul kasutades kella

6



KORRUTA see arv neljaga ja saad kannatanu pulsisageduse (lööke minutis)

7



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge

CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

KAROTIIDIPULSI (unearteripulsi) HINDAMINE

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

1



PANE oma juhtiva käe keskmine ja nimetissõrm KOKKU

2



ASETA oma keskmine ja nimetissõrm kannatanu kaelal trahhea (hingetoru) kõrvale, et leida unearter

3



VAJUTA sõrmedega õõnsasse kohta, et tunda sügavamal naha all unearterit

MÄRKUS: Kui te ei tunne pulssi, vajutage veidi tugevamini, olles ettevaatlik, et kannatanut mitte vigastada

HOIATUS: Ole ettevaatlik ja ära vajuta unearterile liiga kõvasti, sest see võib põhjustada kannatanul pearinglust

4



LOENDA pulsilööke 15 sekundi jooksul kasutades kella

5

KORRUTA see arv neljaga ja saad kannatanu pulsisageduse (lööke minutis)

6



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge

CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

TAGUMISE SÄÄREARTERI PULSI HINDAMINE

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi



PANE oma juhtiva käe keskmine ja nimetissõrm KOKKU



LIBISTA sõrmed kannatanu saapasse pahkluu luulise osa taha või eemalda saabas, et paljastada pahkluu



ASETA oma sõrmed jala siseküljele pahkluu luulise osa ja Achilleuse kõõluse vahele



VAJUTA sõrmedega õõnsasse kota, et tunnetada sügavamal naha all olevat tagumist säärearterit

MÄRKUS: Kui te ei tunne pulssi, vajutage veidi tugevamini, olles ettevaatlik, et kannatanut mitte vigastada



LOENDA pulsilööke 15 sekundi jooksul kasutades kella

KORRUTA see arv neljaga ja saad kannatanu pulsisageduse (lööke minutis)



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge

CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

JALASELJA ARTERI PULSI HINDAMINE

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

1 VÕTA kannatanul jalast saabas ja sokk

2



PANE oma juhtiva käe keskmine ja nimetissõrm KOKKU

3



ASETA kannatanu jala ülaosa ülespoole

MÄRKUS: Selles asendis peaksite nägema jala ülaosas naha all kõrgendatud võlvi

4

ASETA sõrmed suure varba sirutajakõõluse (sirutajakõõlusest moodustunud tihedam ala) küljele

MÄRKUS: Peaks olema tunda pehmemeat õõnsat kohta

MÄRKUS: Kui Sa ei tunne pulssi, liiguta sõrmi rohkem külgsuunas, kuni need jõuavad pehmema piirkonnani

5



VAJUTA sõrmedega õõnsasse ruumi, et tunnetada naha all olevat jalaselja arterit

MÄRKUS:

(1.) Kui te ei tunne pulssi, vajutage veidi tugevamini, olles ettevaatlik, et kannatanut mitte vigastada

(2.) Kui Sul on endiselt raskusi jalaselja arteri leidmisega, siis libista sõrmed mööda sirutajakõõlust üles kuni jõuad pahkluuni

(3.) Kohas, kus õõnes ruum kohtub jalaluudega, on pulssi kergem tunda

(4.) VAJUTA sõrmedega õõnsasse kohta, et katsuda naha all olevat jalaselja arterit

6



LOENDA pulsilööke 15 sekundi jooksul kasutades kella

7

KORRUTA see arv neljaga ja saad kannatanu pulsisageduse (lööke minutis)

8



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge

CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

FEMORAALARTERI (riearteri) PULSI HINDAMINE

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

1

ASETA kannatanu selili

2



PANE oma juhtiva käe keskmine ja nimetissõrm KOKKU

3



TÕMBA kujuteldav joon vaagnaharja esiosast häbemeluuni

4



ASETA sõrmed sellel joonel keskmise ja alumise kolmaniku piirile ja suru alla ja üles pea suunas, veidi kubemekanalist mööda

MÄRKUS: Kubemekanal on reie ülaosa ja alakõhu vaheline lõhe, kus asuvad suured veresooned; see asub suguelundite kohal asuva luu (häbemeluu) ja reie ülaosa vahel

5

Pulsi tunnetamiseks VAJUTA arterile kahe sõrmega. Kui pulss reiel puudub ja kannatanu tundub olevat hemorraagilises šokis (kahvatu, jahe, higine) - RAVI ŠOKKI ja/või EVAKUEERI KANNATANU!

MÄRKUS:

(1.) Kui pulssi ei ole võimalik tunda, veendu, et kannatanu lamab selili, jalad välja sirutatud

(2.) Kui pulssi ikka ei leia, pööra kannatanu jalga väljapoole, paljastades rohkem reie sisekülje

(3.) Kui ikka ei õnnestu, aseta jalg välimisse pööramiseasendisse, painutades seda kergelt põlve suunas

6



LOENDA pulsilööke 15 sekundi jooksul kasutades kella

7

KORRUTA see arv neljaga ja saad kannatanu pulsisageduse (lööke minutis)

8



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge