CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE
M A R C H P A W S

JÄIGA LAHASE KASUTAMISE JUHEND

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi



MÄÄRA kindlaks murru asukoht ja aseta jäse neutraalsesse või funktsionaalsesse asendisse



HINDA jäseme pulssi, motoorset funktsiooni ja tundlikkust (PMT) murrust allpool



Vastavalt olukorrale EEMALDA ehted, kell, riided ja/või saapad

MÄRKUS: Juhenda abistajat vajadusel luumurru kohta käsitsi stabiliseerima (ilma piirkonda liigutamata)



VEENDU, et kõik lahtised haavad oleks sidemega seotud ja verejooks on peatatud



VALI sobiv lahasematerjal (nt lauajupp, pulgad, sobiv puuoks, volditud papp, lisaks polsterdusmaterjalid ja materjal lahase kinnitamiseks jäsemele)



MÕÕDA JA VORMINDA lahas vigastamata jäsemel



PAIGALDA lahas vigastatud jäsemele, jäseme funktsionaalses asendis (normaalses puhkeasendis), vältides võimalusel murruga jäseme suuremat liigutamist



POLSTERDA kõik lahase vahed, täites tühimikud ja kaitstes luulisi eendumisi, et muuta lahas mugavamaks



FIKSEERI lahas ümber jäseme sidemega, kolmurksidemetega või riidest ribadega (veendu, et sõlmed on seotud lahasematerjali kohal, mitte jäsemel)

MÄRKUS: Kolmnurksidemete kasutamisel tuleb üks asetada murrust kõrgemale ja teine allapoole (võimaluse korral), mõistes, et väga kõrge või madala murru korral ei pruugi see olla võimalik ning siis tuleb siduda otse üle murrukoha

Jätkub järgmisel lehel...

CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H P A W S

JÄIGA LAHASE KASUTAMISE JUHEND

...Jätkub

10



TOPI kolmnurksideme otsad selle vahele, et need liikumise ajal takistuste külge kinni ei jääks

11



VEENDU, et luumurrust ülal- ja allpool olevad liigesed oleksid lahasega fikseeritud, kui vähegi võimalik

12



FIKSEERI kogu vigastatud jäse (vajadusel). Näiteks võib transportimise ajal käeluumurru stabiliseerimiseks olla vajalik käe fikseerimine kehatüve külge käepäraste vahenditega

MÄRKUS: Transpordl fiksaatorid takistavad jäseme liikumist, kuid veendu, et need ei avaldaks survet otse luumurrukohale

13 HINDA PMT-t UUESTI. Kui PMT on häirunud - lõdvenda lahast,või paigalda see lõdvemalt uuesti

14 MANUSTA valuvaigisteid ja mis tahes lahtise luumurru korral VÕIMALUSEL antibiootikume

15



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge