CPP TCCC TASE 4

COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

KAENLAALUSE PIIRKONNA VEREJOOKSU KONTROLL

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

1 PALJASTA vigastus ja hinda verejooksu allikat
MÄRKUS: Vigastuse korralikuks paljastamiseks võib olla vajalik riideid ära lõigata

TÕSTA käsi, et haav paljastada ja hinnata verejooksu allikat

MÄRKUS: Kannatanu ravimikseks on parim istuv asend. Kui kannatanut ei saa istuvas asendis ravida, tuleb elastse sideme paigaldamiseks kannatanu võimalikult palju istukile tõsta



AVALDA otsest survet kõige aktiivsemale verejooksu kohale

4 Kasutades kannatanu esmaabi pakendit, eemalda hemostaatiline side steriilsest pakendist

MÄRKUS: Kui hemostaatilist sidet pole saadaval, kasuta marlit või puhast ja kuiva riidetükki



SIRUTA kannatanu käsivart 90-kraadise nurga all, asetades selle oma õlale (käe kõrguse säilitamiseks), jätkates samal ajal samme 5–13

TÄIDA kaenlaalune haav tihedalt hemostaatilise sideme või marliga, kuni haavaõõnsus on täidetud, hoides samal ajal haavale tugevat survet (lõpeta 90 sekundi jooksul)

MÄRKUS: Verevoolu peatamiseks võib vaja minna rohkem kui ühte hemostaatilist sidet või marlit

HOIATUS: Kui kannatanu kehasse on kinni jäänud läbistav ese, seo see kinni. Ära eset eemalda!



VEENDU, et hemostaatiline side või marli ulatuks nahapinnast 3–5 cm kõrgemale

MÄRKUS: Kui hemostaatiline side või marli ei ulatu nahapinnast 3–5 cm kõrgemale, aseta peale täiendav hemostaatiline side või marli



Hoida survet vähemalt 3 minutit

9 HINDA UUESTI, et veenduda verejooksu kontrolli all hoidmises, säilitades samal ajal survet haavale

MÄRKUS: Veendu, et verd ei imbuks läbi hemostaatilise sideme ega selle ümbert. Kui verejooks on peatunud, jäta hemostaatiline side paigale, hoides samal ajal survet haavale

KUI VEREJOOKS JÄTKUB:

10.1 Kui haav on pakendatud hemostaatilise sidemega - eemalda eelnev pakkematerjal ja paki uuesti, alustades 3. sammust

VÕI

10.2 Kui pakitud on marli või muud materjaliga - aseta selle peale täiendav marli/materjal ja suru (veel 3 minutit), kuni verejooks on peatunud

Jätkub järgmisel lehel...

CPP
TCCC
TASE 4

COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

KAENLAALUSE PIIRKONNA VEREJOOKSU KONTROLL

Jätkub...



MÄHI surve- (või elastne) side kaks korda ümber vigastatud õla, veendudes, et all olev hemostaatiline side või marli on täielikult kaetud - samal ajal säilitades survet hemostaatilisele sidemele või marlile

MÄRKUS: Kui kasutate ilma lõpuklambrita elastset sidet, jätke sideme lõpp kannatanu selja poole



Mähi elastne side üle vastaspoolse kaenlaaluse taha ja alla, kinnitades selle kaheksakujuliselt vastaspoole õla ümber



Sõltuvalt kasutatavast sidemest KINNITA see lõpuklambriga või seo elastse sideme otsad libisemiskindla sõlmega kokku



JULGESTA surve- (elastse) sideme otsad ja sõlm kasutades laia teipi, mässides teipi vähemalt 1,5 korda ümber sõlme



SIDUGE vigastatud poole õlavars (kolmnnurk)sidemega ümber rindkere



JÄLGIGE haava edasise verejooksu suhtes



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge