CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

RINDKERE PLAASTER/ÕHKRINNA KLAPP (CHEST SEAL), EESTIS ALATES MK-2

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi



LEIA ja PALJASTA kõik eesmised, tagumised või kaenlaalused rindkere haavad

MÄRKUS: Kui leiad mitu haava, ravi neid leidmise järjekorras



KONTROLLI lahtise ja/või õhku imeva haava märke rindkeres

MÄRKUS: Kui pole kindel, kas haav on täielikult läbistanud rindkere seina, ravi haava nii, nagu oleks see lahtine rindkerehaav

ASETA peopesa või käeselg lahtise rinnahaava peale, et see ajutiselt sulgeda

AVA täielikult õhkrinna klapi või muu õhukindla materjali välimine ümbris

MÄRKUS: Kui klapiga hermeetilist rindkere plaastrit pole saadaval, kasutage ilma klapita rindkere plaastrit



PUHASTA haavaümbrus mustusest, verest või muust vedelikust kasutades puhast marlit/sidet



EEMALDA rindkere plaastri kaitsekile, paljastades selle kleepuva osa



ASETA plaastri kleepuv külg otse augu peale, samal ajal kui kannatanu välja hingab ja vajuta tugevalt plaastrile, et see tihedalt kleepuks haavale

MÄRKUS: Veendu, et rindkere plaastri serv ulatuks haava servadest vähemalt 5 cm kaugusele



VEENDU, et rindkere plaastri kleepuv pind kleepub nahale

MÄRKUS: Vajadusel võib rindkere plaastri servade kinnitamiseks kasutada teipi



HINDA rindkere plaastri tõhusust kannatanu hingamise ajal

MÄRKUS: Kui kannatanu sisse hingab, peaks klapp sulguma, et õhk sisse ei pääseks

MÄRKUS: Kui kannatanu välja hingab, peaks haavast õhk pääsema välja ja läbi klapi väljuma

Jätkub järgmisel lehel...

RINDKERE PLAASTER/ÕHKRINNA KLAPP (CHEST SEAL), EESTIS ALATES MK-2

Jätkub...



KONTROLLI/KATSU, kas rindkerel on veel lahtisi haavu (eesmised, tagumised ja kaenlaalused). Vajadusel ravi lisahaavu samal viisil



PANE teadvusel kannatanu istuvasse asendisse või teadvuseta kannatanu koomaasendisse (vigastatud külg allapoole)

JÄLGI kannatanut pingelise õhkrinna tunnuste osas



Kui tekivad pingelise õhkrinna tunnused, TÕSTA rindkere plaastri üks serv üles, et võimaldada dekompressiooni ("röhitse" plaastrit)

MÄRKUS: Teise võimalusena eemaldage rindke rindkere plaaster mõneks sekundiks rõhu alandamiseks ja seejärel pange see uuesti peale või asendage uuega



Kui pingepneumotooraksi tunnused püsivad hoolimata plaastri "röhitsemisest", TEOSTA rindkere nõeldekompressioon (vt. rindkere nõeldekompressiooni juhised)



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge