ESQUEMA DE VACUNACIÓN

	ROTAVIRUS	Rotafi	DPT	PENTAWALENTI: ACELULAR DEST - VOLAHIS					i	BC G	MCUNA	
Relating®WENNESSEE ERA ROLLBIG FEBRO	DIARRE, POR ROTAV	RotaTeq®(YAN)(S)SARSIOSSENAS NDE-3E79 FEBIJ9	DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS		POR H. influenzae b	TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS	DIFTERIA.		HEPAIITIS,B		TUBERCULOSIS	QUE PREVIENE
	Render Williams College Colleg	PRIMERA IS	REFUERZO	03064 16 22)	TERCERA 6	SEGUNDAS 1	PRIMER () 2	STO GOID DE	A GILONO PEED	PRIMERA	UNICA	DOSIS FREC
6 MESES D/-D-	MESES OF N	ISSNEED TO USING	Medic	./દ	6 MESES 23	Furo 6-	PRIMER () 2 MPSPE DICIPAL	IODE 37	BE Prever	WASER MEBIOIDA	Macsan In R	EDAD Y FRECUENCIA DE VAC
01-02-2019	1000 2018				2001C	Dept. 2010	8	200	2 CERT	ina B	NOINALION	FECHA DE VACIONACIÓN

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

OTRAS	SR	SABIN			SRP	SRP		VZNEJOTENI			NEUMOCÓCICA	VACUNA	
6	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	L (trouble)	POLIOMIELIT	5.6	PAROTIDITIS	SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS		INFLUENZA		INFECCIONES POR NEUMOCOCO			ENFERMEDAD QUE PREVIENE
	-		NO	200	REFUERZO	S/LINES	REVACUNACIÓN	SEGUNDA	PRIMERA	REFUERZO	260Kings	PRIMERS	DOSIS
	ADICIONALES		ADICIONALES	Ó	6 AÑOS	GSZ ANGGER	ANUAL HASTA	7 MESES	6 MESES	12 MESES	LA WESES /	WEE CITY	FRECUENCIA
		1	14-03-2	19.17-19		19.11-2015	*10		18-11-2020	0 8 1	+6 NOU 2018		DE VACUNACIÓN