

para una mejor salud que deben recibir de acuerdo a su edad para conocer las acciones de promoción y prevención tiene derecho a recibir una cartilla como esta. Le sirve Cada uno de sus hijas o hijos menores de 10 años


Esta cartilla se otorga y utiliza en todas las unidades médica: de la SS, IMSS, ISSSTE, DIF, PEMEX, SEDENA SEMAR y del sector privado

proximas citas a los diferentes servicios de la institució Además, la cartilla le servira para que le registren sus


GRATUITA





















NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN

#### CADA VEZ QUE LLEVE A SU NIÑA O NIÑO A LA UNIDAD MÉDICA, SOLICITE AL PERSONAL MÉDICO O DE ENFERMERÍA, QUE:

- · Revise su Cartilla Nacional de Salud
- Vigile su peso y estatura
- Le realice las actividades de protección específica, principalmente la aplicación de las vacunas que correspondan
- Le informe las acciones para prevenir enfermedades y le realicen las pruebas de detección de acuerdo a la edad
- Registre su próxima cita
- Le oriente y capacite sobre los cuidados para conservar o recuperar la salud de su hija o hijo
- Anote en su Cartilla la fecha de las acciones que le practicaron

le le realicen a su hija o as las acciones contenidas cartilla. Su participación tial para mantener su salud.



## NUTRICIÓN

Pasos para calcular el IMC:    INDICE DE MASA CORPORAL (kg /m²)								
		MARILLA=RIESGO	ARILLA O ROJA, ACUDA	A CONSULTA MÉDICA				
VERDE=N	ORMAL AI		The second secon	PELIGRO				
EDAD	NINAS							
LUAD	BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD				
años 6 meses	≤ 12.7	15.2	≥ 16.9	≥ 19.0				
i años	≤ 12.7	15.3	≥ 17.0	≥ 19.2				
años 6 meses	≤ 12.7	15.3	≥ 17.1	≥ 19.5				
años	≤ 12.7	15.4	≥ 17.3	≥ 19.8				
años 6 meses	≤ 12.8	15.5	≥ 17.5	≥ 20.1				

15.7

15.9

16.1

16.3

≥ 17.7

≥ 18.0

≥ 18.3

≥ 18.7

≥ 20.6

≥ 21.0

≥ 21.5

≥ 22.0

EDAD	NIÑOS						
	BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD			
años 6 meses	≤ 13.0	15.3	≥ 16.7	≥ 18.4			
años	≤ 13.0	15.3	≥ 16.8	≥ 18.5			
años 6 meses	≤ 13.1	15.4	≥ 16.9	≥ 18.7			
años	≤ 13.1	15.5	≥ 17.0	≥ 19.0			
años 6 meses años	≤ 13.2	15.6	≥ 17.2	≥ 19.3			
	≤ 13.3	15.7	≥ 17.4	≥ 19.7			
años 6 meses años	≤ 13.4	15.9	≥ 17.7	≥ 20.1			
	≤ 13.5	16.0	≥ 17.9	≥ 20.5			
años 6 meses	≤ 13.6	16.2	> 18 2	≥ 20.9			

uente: Organización Mundial de la Salud, 2007

≤ 12.9

≤ 13.0

≤ 13.1

≤ 13.3

años

años

años 6 meses

años 6 meses

### NUTRICIÓN

EVALU	ACIÓN	Y VIGILA	NCIA DEL	ESTADO	NUT	RICION	AL
5040	FECHA	PESO	ESTATURA	EVALUACIÓN			
EDAD	FECT	(Kg)	(cm)	RIESGO DE DESNUTRICIÓN	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
AL NACER							
2 MESES	SEP 2	0115.300	.60		X.		
4 MESES							
6 MESES							
8 MESES							
10 MESES							
1 AÑO							
1 AÑO 6 MESI	ES						
2 AÑOS							
2 AÑOS 6 MES	ES						
3 AÑOS							
3 AÑOS 6 MES	ES						
4 AÑOS							
4 AÑOS 6 MES	ES		A CONTRACTOR				
5 AÑOS							
EVALU	IACIÓN IÓN DE P	Y VIGILA PESO Y ESTA	NCIA DEL TURA POR L	ESTADO O MENOS	NUT	RICION	IAL
EDAD	PESO (Kg)	ESTATURA (m)	ÍNDICE DE MASA			ACIÓN	
	(1,2)	(m)	CORPORAL (Kg/m2)	BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
6 AÑOS			PARKET				
7 AÑOS							
8 AÑOS	THE REAL PROPERTY.						
9 AÑOS	THE STATE OF						

### NUTRICIÓN

#### ALIMENTACIÓN Y DESPARASITACIÓN

ACCIÓN	ENFERMEDAD QUE PREVIENE				FECHA				
ORIENTACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	RESPIRA	RICIÓN, TORIAS, ERGIAS Y	INFECCIO DIARREIO OTRAS	24"	ES MI		4 s MES	5 MES	6 MES
ORIENTACIÓN SOBRE LACTANCIA	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12 MES	13 MES	14 MES	15 MES
MATERNA COMPLEMENTARIA	16 MES	17 MES	18 MES	19 MES	20 MES	21 MES	22 MES	23 MES	24 MES
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	DESNU	TRICIÓN Y OBESI	, SOBREP DAD	ESO					
DESPARASITACIÓN INTESTINAL (De 2 a 9 años, 2 veces al año, en Semanas Nacionales de Salud)	PARASITOSIS INTESTINAL								

#### NUTRICIÓN

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES							
ACCIÓN	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	FECHA					
VITAMINA "A" (Al nacimiento y en Semanas Nacionales de Salud)	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y DIARREAS	12-07-15 118 SEP 2015					
HIERRO En niños con bajo peso al nacer o prematuros, a partir de los 2 meses de edad	ANEMIA	Fecha de inicio  Fecha de término					
En niños con peso normal al nacer, a partir de los 4 meses de edad							
OTROS	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	1					

Evita ver televisión o videojuegos más de 2 horas al día. ¡ACTÍVATE!

Mínimo 30 minutos todos los días: camina, sube y baja escaleras, anda en bicicleta, juega la pelota o de 3 a 5 veces a la semana realiza tu deporte favorito.

# ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
всс	TUBERCULOSIS	ÚNICA	AL NACER	12-07-15
		UPWER 36	AL NACER	15-07-15
HEPATITIS B	HEPATERS	AFEGUNDA	2 MESES	1 8 SEP 2015
		TERCERA	6 MESES	2 7 ENE 2016
		PRIMERA	2 MESES	18 SEP 2015
PENTAVALENTE ACELULAR		SEGUNDA	4 MESES	1 9 NOV 2015
DPaT + VPI + Hib		MARCERAS	6 MESES	2 7 FNF 2018
		- FRANTAS	LLE MESES ()	8 AGO 2018
DPT	DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS	REFUERZO	4 AÑOS	2 3 AGO 2019
	RotaTeq® ROTAVPLS*  RotaTeq® PRUMANO-8  Lote:  Cad.:	NOV16	2 MESES	1 8 SEP 2015
RotaTeg® ROTAVRUS VIN HUMANO BOV  Lote Cad LOC	DRECOMBINATE RREA TAVIRUS	SEGUNDA	4 MESES	1 3 NOV 2015
RotaTeq® ROTANRUS VNO N	NJP	TERCERA	6 MESES	2 7 ENE 2816

# ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	
		PRIMERA	2 MESES	18 SEP 2815
NEUMOCÓCICA CONJUGADA	POR NEUMOCOCO	SEGUNDA	4 MESES	19 NOV 2015
	Neomococo	REFUERZO-	17 AZ MBSES	3 0 SEP 2016
	MEDICA	E SAMERADI	AN GLARGES A	9 OCT 2017
NFLUENZA	INTLUENZA	SECUNDA	TMESES	8 NOV 2018
		REVACUNACIÓN	LOS 59 MESES	8 DIC 2018
	SARAMPIÓN,	PRIMERA .	1 ANO	3 0 SEP 2016
SRP	RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	REFUERZO	6 AÑOS	A STATE OF THE STA
	. STIMIC		VENTIVA	7 OCT 2018
SABIN	POLIOMIELITI	S AD	ICIONALES	
	Campar	sa o	otwore	
		Te	brero	
				-
SR	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	AD	ICIONALES	1000
	Hep A		Enero	19 950
OTRAS VACUNAS	Varicela	08	1GD 201	8 - 6 ano 2 1/2.
	Torrice IU	0 0 1	100 201	o canosty

# ENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

ACCIÓN	FRECUENCIA	FECHA	
N PREVENTIVA LIÉN NACIDO xis oftálmica y ón de vitamina K)	EN EL MOMENTO DE NACER, POR EL MÉDICO O ENFERMERA QUE RECIBE AL NIÑO		
OPROFILAXIS	CUANDO EL MENOR TIENE CONTACTO COTIDIANO CON	Inicio de tratamiento	
UBERCULOSIS LMONAR	PERSONAS CON TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA	Fin de tratamiento	

#### SALUD BUCAL

rtir del nacimiento, el personal de salud orientará al responsable nenor, sobre higiene dental y los cuidados de la boca.

rtir de los 3 años de edad, realizar acciones preventivas, cada seis meses nenos una vez al año, para prevenir caries dental y enfermedad de la encía.

ÓN	FECHA
ÓN DE	1er semestre
TERIANA	2º semestre
IZA DE CA DE DENTAL	1 <sup>er</sup> semestre
primer	2º semestre
CIÓN	. 1 <sup>er</sup> semestre
os 3 años vez al año)	2º semestre
IZA DE O DENTAL	ALOC ON 1er semestre
de los edad)	2º semestre

### DETECCIÓN DE ENFERMEDADES

DETI	ECCIONES REALIZADAS MÉDICOS Y ENFERMERAS	EDAD RECOMENDADA	FECHA
ONATAL	HIPOTIROIDISMO	AL NACIMIENTO O ANTES DE LOS CINCO DÍAS DE VIDA	
TAMIZ NEONATAL AMPLIADO	HIPERPLASIA ADRENAL, FENILCETONURIA DEFICIENCIA DE BIOTINIDASA Y GALACTOSEMIA CLÁSICA	ENTRE EL 3° Y EL TOL 1 5° DÍA DE VIDA O Entregado	39.0026 12 AGO 20
	PLORACIÓN DE INTEGRIDAD ISUAL (Sólo por el médico)	ANTES DE LOS 28 DÍAS	
	PLORACIÓN DE LA FUNCIÓN ISUAL (Sólo por el médico)	DE SEIS A OCHO MESES	
	AGUDEZA VISUAL	ENTRE LOS CUATRO Y SEIS AÑOS	
OTRA			