FICHA DE RCP

Autora: Suzana Costa Reis Roriz

Adulta > 10 kg

NOME: IDADE:

PESO:

MASSAGEM CARDÍACA CHOQUE MÁXIMO 200J

100 a 120 bpm. 1°dose: 2J/kg

Troca a cada 2 minutos. Doses subsequentes: 4 a 10J/kg

Horário: Horários: 1º choque:

ADRENALINA (1:1000) = 1 mg 2° choque: Diluir 1 ml + SF 0.9% - 9 ml.

Fazer 0,1 ml/kg da diluição.

Dose máxima: 1 mg ou 10 ml.

PÁS

Pediátrica até 10kg

Na Fibrilação ventricular ou Taquicardia ventricu-

lar sem pulso, iniciar após segundo choque. 1ºdose:

2ª dose:

Outras doses:

BICARBONATO DE SÓDIO 10%

Diluir 10 ml em 10 ml de AD.

Dose: 1 ml/kg

1° dose: 2° dose:

AMIODARONA (50mg/3ml)

Não diluir.

Iniciar após o terceiro choque.

5mg/kg ou 0,3 ml/kg

Dose máxima: 3 doses ou 150 mg

1° dose: 2° dose: 3° dose:

ATROPINA (0,25mg/ml)

Não diluir

Dose máxima: 0,5 mg até 2 doses

0,02mg/kg ou 0,08 ml/kg

1ª dose: 2ª dose: