## FLUXOGRAMA - SEDAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PEDIATRIA

## VIA AÉREA PÉRVIA

Fornecer O<sup>2</sup> (cateter nasal ou máscara com reservatório) Monitorização e Oximetria

TC COM CONTRASTE
HEMOGRAMA E FUNÇÃO RENAL

TC SEM CONTRASTE SEM NECESSIDADE DE EXAME PARA FUNÇÃO RENAL

## PREPARO - A CRITÉRIO MÉDICO:

- 1) Dexclorfeniramina VO:
  - até 6 anos: 1,25 ml
  - 6-12 anos: 2.5 ml
  - acima de 12 anos: 5 ml ou

Hidroxizina 0,5 ml/kg VO

2) Hidrocortisona 10 mg/kg EV

## SEDAÇÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA:

- 1) DEXMEDETOMIDINA: 2mcg/kg Diluir em 30ml de SF e correr EV em 10 minutos e/ou
- 2) KETAMINA: 1-2mg/kg (0,02-0,04ml/kg) EV ou
- 3) MIDAZOLAM: 0,1-0,3mg/kg (0,02-0,06ml/kg) EV Antídoto Flumazenil 0,1ml/kg, podendo ser repetido após 3 minutos se necessário.