

Função exponencial

Resumo

Função exponencial

A função exponencial é uma aplicação de \mathbb{R} em \mathbb{R}_+^* que associa a todo número real x ao resultado da potência a^x , em que a , chamada base da função exponencial é um número real positivo e diferente de 1.

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\rightarrow a^x \end{aligned}$$

Cuidado! Precisamos tomar alguns cuidados em relação à base a .

Se a base fosse negativa, nem sempre o resultado da função não seria um número real. Observe o exemplo:

$$\begin{aligned} f(x) &= (-2)^x \\ f(0,5) &= (-2)^{0,5} = \sqrt{-2} \end{aligned}$$

Sabemos que esse resultado não existe no conjunto dos números reais.

Se a base for igual a zero, também poderá nos trazer problemas. Observe o exemplo:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0^x \\ f(-1) &= (0)^{-1} = \frac{1}{0} \end{aligned}$$

Sabemos que divisão por 0 é indeterminado.


Se a base for igual a 1, o resultado da função seria sempre 1, o que a tornaria uma função constante e não exponencial.

Gráfico

Sendo respeitadas todas as restrições, construiremos o gráfico da função exponencial. Dividiremos em casos:

1º caso: $a > 1$

Ex: $f(x) = 2^x$




Podemos observar algumas coisas importantes:

- A função é crescente, pois a base é maior do que 1.
- A curva nunca corta o eixo x, pois é impossível que uma potência de base diferente de zero dê 0.
- A curva corta o eixo y em $y = 1$, pois, quando $x = 0$, temos que $f(0) = a^0 = 1$ ($a \neq 0$).

2º caso: $0 < a < 1$

Ex: $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$



Podemos observar algumas coisas importantes:

- A função é decrescente, pois a base está entre 0 e 1.
- A curva nunca corta o eixo x, pois é impossível que uma potência de base diferente de 0 dê 0.
- A curva corta o eixo y em $y = 1$, pois, quando $x = 0$, temos que $f(0) = a^0 = 1$ ($a \neq 0$).

Quer ver este material pelo Dex? Clique [aqui](#)


Exercícios

1. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população:

$$p(t) = 40 \times 2^{3t}$$

em que t é o tempo, em hora, e $p(t)$ é a população, em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 min, a população será


- reduzida a um terço.
 - reduzida à metade.
 - reduzida a dois terços.
 - duplicada.
 - triplicada.
2. Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial, nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função $y(t) = a^{t-1}$, na qual y representa a altura da planta em metro, t é considerado em ano, e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y .



Admita ainda que $y(0)$ fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 m após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte, em ano, é igual a

- 3.
- 4.
- 6.
- $\log_2 7$.
- $\log_2 15$.


3. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R\$ 1 800,00, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial (s), em função do tempo de serviço (t), em anos, é $s(t) = 1800 \times (1,03)^t$. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será, em reais,
- 7.416,00.
 - 3.819,24.
 - 3.709,62.
 - 3.708,00.
 - 1.909,62.
4. Em um experimento uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, devido à ação de um agente bactericida. Neste experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo
- Afim
 - Seno
 - Cosseno
 - logarítmica crescente
 - exponencial
5. A função real f definida por $f(x) = a3^x + b$, sendo a e b constantes reais, está graficamente representada abaixo.



Pode-se afirmar que o produto $(a.b)$ pertence ao intervalo real:

- $[-4, -1[$
- $[-1, 2[$
- $[2, 5[$
- $[5, 8]$
- $]8, 10]$


6. Em um plano cartesiano o ponto $P(a,b)$, com a e b reais, é o ponto máximo da função $f(x) = -x^2 + 2x + 8$. Se a função $g(x) = 3^{-2x+k}$, com k um número real, é tal que $g(a) = b$, o valor de k é:
- 2
 - 3
 - 4
 - 1
 - 0
7. Em 1798, Thomas Malthus, no trabalho "An Essay on the Principle of Population", formulou um modelo para descrever a população presente em um ambiente em função do tempo. Esse modelo, utilizado para acompanhar o crescimento de populações ao longo do tempo t , fornece o tamanho $N(t)$ da população pela lei $N(t) = N_0 \times e^{kt}$, onde N_0 representa a população presente no instante inicial e k , uma constante que varia de acordo com a espécie de população. A população de certo tipo de bactéria está sendo estudada em um laboratório, segundo o modelo de Thomas Malthus. Inicialmente foram colocadas 2000 bactérias em uma placa de Petri e, após 2 horas, a população inicial havia triplicado. A quantidade de bactérias presente na placa 6 horas após o início do experimento deverá aumentar:
- 6 vezes
 - 8 vezes
 - 18 vezes
 - 27 vezes
 - 30 vezes
8. Um modelo de automóvel tem seu valor depreciado em função do tempo de uso segundo a função $f(t) = b \cdot a^t$, com t em ano. Essa função está representada no gráfico.



Qual será o valor desse automóvel, em real, ao completar dois anos de uso?

- 48000
- 48114
- 48600
- 48870
- 49683

9. Uma aplicação bancária é representada graficamente conforme figura a seguir.



M é o montante obtido através da função exponencial $M = C \cdot (1,1)^t$, C é o capital inicial e t é o tempo da aplicação. Ao final de 04 meses o montante obtido será de :

- a) R\$ 121,00
 - b) R\$ 146,41
 - c) R\$ 1210,00
 - d) R\$ 1310,00
 - e) R\$ 1464,10
10. A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão $V(t) = 1000 \times 2^{0,0625t}$ fornece uma boa aproximação do valor V (em reais) em função do tempo t (em anos), desde o início da aplicação. Depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará?
- a) 8
 - b) 12
 - c) 16
 - d) 24
 - e) 32

Gabarito

1. D

Desde que $20\text{min} = \frac{1}{3}\text{h}$, vem

$$p\left(\frac{1}{3}\right) = 40 \cdot 2^{3 \cdot \frac{1}{3}} = 80.$$

Portanto, após 20 min, a população será duplicada

2. B

Sendo $y(0) = 0,5$, temos

$$a^{0-1} = 0,5 \Leftrightarrow a = 2.$$

Assim, queremos calcular o valor de t para o qual se tem $y(t) = 0,5 + 7,5 = 8$, ou seja,

$$2^{t-1} = 8 \Leftrightarrow t = 4.$$

3. E

Fazendo os cálculos:

$$s(t) = 1.800 \cdot (1,03)^t$$

$$s(2) = 1.800 \cdot (1,03)^2$$

$$s(2) = 1909,62$$

4. E

O número de bactérias $N(t)$, em função do tempo t , em horas, pode ser modelado por uma função do tipo $N(t) = N_0 \cdot 2^{-t}$, com N_0 sendo a população inicial. A função N é exponencial.

5. A

Calculando:

$$f(x) = a \cdot 3^x + b$$

$$f(0) = -1 \rightarrow a \cdot 3^0 + b = -1 \rightarrow a + b = -1 \rightarrow b = -1 - a$$

$$f(2) = 8 \rightarrow a \cdot 3^2 + b = 8 \rightarrow 9a + b = 8 \rightarrow 9a - 1 - a = 8 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{9}{8} \\ b = -\frac{17}{8} \end{array} \right\} \rightarrow a \cdot b = \frac{-153}{64} \in [-4, -1[$$

6. C

Calculando a abscissa do vértice da parábola, temos

$$x_v = -\frac{b}{2 \cdot a} = -\frac{2}{2 \cdot (-1)} = 1$$

A ordenada do vértice será dada por:

$$y_v = -1^2 + 2 \cdot 1 + 8 = 9$$

Considerando, agora, que $g(1) = 9$, temos:

$$3^{-2 \cdot 1 + k} = 9 \Rightarrow 3^{k-2} = 3^2 \Rightarrow k = 4$$

7. D

Após 2 horas, teremos:

$$3 \cdot N_0 = N_0 \cdot e^{2t} \Rightarrow e^{2t} = 3$$

Após 6 horas, teremos:

$$N(6) = N_0 \cdot e^{6t} = N_0 \cdot (e^{2t})^3 = N_0 \cdot (3)^3 = 27 \cdot N_0$$

Portanto, a resposta correta será a alternativa [D], 27 vezes.

8. C

Se $f(0) = 60000$, então $b = 60000$. Ademais, sabendo que $f(1) = 54000$, vem

$$54000 = 60000 \cdot a^1 \Leftrightarrow a = \frac{9}{10}.$$

Por conseguinte, a resposta é

$$f(2) = 60000 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^2 = \text{R\$ } 48.600,00.$$

9. E

Para obter o montante obtido ao final de quatro meses basta aplicar $t = 4$ na função $M(t) = C \cdot (1,1)^t$. Porém, deve-se observar o que o valor do capital inicial (C), segundo o gráfico, é $C = 1000$, pois é o primeiro valor da curva exponencial.

Desta forma, temos:

$$M(t) = C \cdot (1,1)^t$$

$$M(t) = 1000 \cdot (1,1)^t$$

$$M(4) = 1000 \cdot (1,1)^4$$

$$M(4) = 1000 \cdot 1,4641$$

$$M(4) = 1464,10 \text{ reais}$$

10. C

$$\text{Para } t = 0 \Rightarrow V(0) = 1000 \cdot 2^{0,0625 \cdot (0)} = 1000$$

Logo,

$$\text{Para } t = ? \Rightarrow V(t) = 2000$$

$$\Rightarrow 2000 = 1000 \cdot 2^{0,0625 \cdot (t)}$$

$$\Rightarrow 2^{0,0625 \cdot (t)} = 2$$

$$\Rightarrow 0,0625 \cdot (t) = 1$$

$$\Rightarrow t = 16$$