
SALUD ANIMAL / ANIMAL HEALTH

VADEMECUM_


Línea Ganadera



Second Edition: V02-001
Biochemiq Art: Pablo Bisoglio
© Copyright 2013 Biochemiq

BIOCHEMIQ

Mejorando el presente
Improving the present



Biochemiq pone a su alcance los últimos avances para la protección de los rodeos.

Nacida en 1999, gracias a inversiones nacionales y extranjeras, BioChemiq ofrece productos y soluciones biológicas de avanzada para mejorar la protección, el bienestar y la productividad en el campo de la medicina y la salud animal.

MBS

MBS Molecular® Biology Supported

Protección de Avanzada

Mediante un avanzado soporte tecnológico en Biología Molecular, BioChemiq controla y certifica a nivel genético cada una de sus vacunas, verificando la presencia de las propiedades indispensables para garantizar una mejor protección.

BioQuick

BIO QUICK®

Biodisponibilidad y aplicación apropiada

El desarrollo del adyuvante “BioQuick” genera por agitación una suspensión homogénea y biodisponible que optimiza la proporción antigénica por dosis y reduce las reacciones indeseadas en el punto de aplicación. BioQuick es utilizado en especies de alta sensibilidad con excelentes resultados. Su éxito es avalado por la exportación de miles de litros demandados por empresas internacionales de elaboración de biológicos.

Híbridos
Fármaco
Biológicos

Producto	Vigormeq	BIOMEQ	BIOMEQ+ 3,5
Descripción	Tónico reconstituyente mineralizante con aminoácidos y vitaminas. Inmunoestimulante inespecífico.	Estimulante inespecífico de las defensas. Endoectoparasiticida de larga acción.	Estimulante inespecífico de las defensas. Endoectoparasiticida de larga acción.
Beneficios	Nuestra Energía tiene más fuerza. La combinación exclusiva de fósforo, oligoelementos, vitaminas, aminoácidos e inmunoestimulante inespecífico, otorgan mayor fuerza energética en su efecto reconstituyente mineralizante. Vigormeq pertenece a la exclusiva categoría de híbridos de Biochemiq que se caracteriza por potenciar el efecto de un fármaco mediante su combinación con un inmunoestimulante inespecífico biológico.	Inmunoestimular, desparasitar y potenciar. Biomeq es una nueva categoría de producto (Híbrido) que combina un componente biológico y fármaco, actuando simultáneamente como Inmunoestimulante inespecífico de las defensas, antiparasitario interno y externo de larga acción y estimulante del organismo potenciando la acción antiparasitaria.	Mayor concentración para inmunoestimular, desparasitar y potenciar. Biomeq + 3.5 es una nueva categoría de producto (Híbrido) que combina un componente biológico y fármaco, actuando simultáneamente como Inmunoestimulante inespecífico de las defensas, antiparasitario interno y externo de larga acción con alta concentración (3,5g) y estimulante del organismo potenciando la acción antiparasitaria.
Dosis	**Dosis Curativa** Bovinos adultos: 10-25 ml. - Terneros: 5-15 ml. IM/SC. Equinos adultos: 15 a 20 ml. - Potrillos: 5 a 15 ml. IM/SC. Ovinos y caprinos adultos: 3 a 5 ml. - Corderos y cabritos: 2 a 3 ml. IM/SC. Suinos (porcinos) adultos: 5 a 10 ml. - Lechones: 1a 3 ml. SC. Caninos: 0,5 a 5 ml. IM/SC. Felinos y animales de peletería: 0,5 a 2,5 ml. IM/SC. **Dosis Preventiva** En animales sanos administrar la mitad de la dosis cada 30 días o según criterio del profesional actuante.	1 ml cada 50kg de peso vivo vía subcutánea (equivalente a 200mcg/kg).	1 ml cada 50kg de peso vivo vía subcutánea (equivalente a 700mcg/kg).
Administración	Parenteral, inyectable por vía subcutánea, intramuscular según la indicación para cada especie	Bovinos: empleando jeringa y agujas estériles. Se recomienda aplicar en la tabla del cuello o por detrás de la paleta.	Bovinos: empleando jeringa y agujas estériles. Se recomienda aplicar en la tabla del cuello o por detrás de la paleta.
MBS	✓	✓	✓
Presentación	Caja conteniendo 1 Frasco por: **500** ml o **250** ml	Caja conteniendo 1 Frasco por: **500** ml o **50** ml	Caja conteniendo 1 Frasco por: **500** ml o **50** ml
Composición	Cada 100 ml contiene Fósforo: Fosforilcolamina (1) 10g; Aminoácido: Digerido Ácido de Caseína 5g; Inmunoestimulante: Inmunomiq(#) Ac. Micoligocos y LPS. 0,17g; Vitaminas: Cianocobalamina (Vitamina B12) 0,005g, Tiamina (Vitamina B1) 0,1g, Piridoxina (Vitamina B6) 0,066g; Oligoelementos: Gluconato de Zinc 0,25g, Yoduro de Potasio 0,2g; Excipientes c.s.p. 100 ml.	Ivermectina 1g, Inmunomiq (*1) 0,17g, Excipiente oleoso 100ml. (*1) Cada 100g de Inmunomiq contiene: Derivados bacterianos (Extractos inactivados constituídos por Ac. Micólicos y LPS bacterianos) 91,5g.	Ivermectina 3,5 g, Inmunomiq (*1) 0,17g, Excipiente oleoso 100ml. (*1) Cada 100g de Inmunomiq contiene: Derivados bacterianos (Extractos inactivados constituídos por Ac. Micólicos y LPS bacterianos) 91,5g.



Clostridial

Producto	CLOSTRIMIQ REC	CLOSTRIMIQ MS	CLOSTRIMIQ PH
Descripción	Vacuna contra Mancha, Gangrena Gaseosa y Enterotoxemia.	Vacuna contra Mancha, Gangrena Gaseosa y Enterotoxemia (Clásica y por Muerte Súbita).	Vacuna contra Mancha, Gangrena Gaseosa, Enterotoxemia, Muerte Súbita, Hemoglobinuria y Pasteurelosis.
Beneficios	Máxima protección clostridial recombinante para bovinos. La selección de cepas, mediante estrictos controles moleculares, utilizadas en la elaboración del producto, sumado al desarrollo exclusivo de tecnología recombinante, favorece la protección en bovinos concentrando la acción del sistema inmune frente a enfermedades clostridiales de alta casuística para la especie.	Mayor protección clostridial en sistemas de alta concentración de bovinos. La incorporación de *Cl. novyi* tipo A y *Cl. sordelli* a las características de la vacuna CLOSTRIMIQ amplían la protección contra gangrena, enterotoxemia y muerte súbita optimizando la prevención en los sistemas de alta concentración de bovinos.	Doble protección, clostridial y respiratoria. La incorporación de Cl. hemolyticum y Pasteurella a las características de la vacuna Clostrimq MS, otorga una máxima protección clostridial y una exclusiva protección contra neumonía gracias a la incorporación de unos de los componentes más importantes del complejo respiratorio.
Dosis	5 ml Vía Subcutánea	5 ml Vía Subcutánea	5 ml Vía Subcutánea
Administración	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente.	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente.	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente
MBS	✓	✓	✓
Presentación	Frasco conteniendo: **250** ml / **50** dosis **125** ml / **25** dosis	Frasco conteniendo: **250** ml / **50** dosis **125** ml / **25** dosis	Frasco conteniendo: **250** ml / **50** dosis **125** ml / **25** dosis
Composición	Cultivos inactivados de *Cl. chauvoei*, *Cl. septicum* y *Cl. perfringens* tipo A y Subunidades de toxinia epsilon recombinante; Adyuvante: gel de aluminio.	*Cl. chauvoei*, *Cl. septicum* y *Cl. perfringens* tipo A y D, *Cl. Novyi* tipo A y *Cl. sordelli*; Adyuvante: gel de aluminio.)	Cultivos inactivados de *Cl. chauvoei*, *Cl. septicum* y *Cl. perfringens* tipo A y D, *Cl. novyi* tipo A y D, *Cl. Sordelli* y Pasterurella multocida.; Adyuvante: gel de aluminio.

	CLOSTRIMIQ OVIN	CLOSTRIMIQ OVIN-T	BOTUMIQ-P
Producto			
Descripción	Vacuna contra Mancha, Gangrena Gaseosa, Enterotoxemia y Hepatitis Infecciosa Necrosante	Vacuna contra Mancha, Gangrena Gaseosa, Enterotoxemia, Hepatitis Infecciosa Necrosante y Tétanos.	Vacuna contra Botulismo.
Beneficios	Máxima protección clostridial específica para ovinos, caprinos y pequeños camélidos. La selección de cepas, mediante estrictos controles moleculares, utilizadas en la elaboración del producto favorece la protección en pequeños rumiantes y pequeños camélidos concentrando la acción del sistema inmune frente a enfermedades clostridiales de alta casuística para la especie.	Mayor protección clostridial para pequeños rumiantes y pequeños camélidos. La incorporación del toxoide Tetánico a las características de la vacuna CLOSTRIMIQ OVIN amplía la protección frente a manifestaciones clínicas del Tétanos originadas por accidentes y/o medidas de manejo como la esquila y el descole.	Acción reforzada contra Botulismo. Botumiq-P es acompañada de Glicerofosfato de sodio (fósforo) con el objetivo de complementar los requerimientos metabólicos.
Dosis	3 ml Vía Subcutánea	3 ml Vía Subcutánea	5 ml Vía Subcutánea
Administración	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente.	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente.	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente.
MBS	✓	✓	✓
Presentación	Frasco conteniendo: **240** ml / **80** dosis	Frasco conteniendo: **240** ml / **80** dosis	Frasco conteniendo: **300** ml / **60** dosis
Composición	Cultivos inactivados de *Cl. chauvoei*, *Cl. septicum*, *Cl. perfringens* tipo C y D Y *Cl. novyi* tipo B; Adyuvante: gel de aluminio	Cultivos inactivados de *Cl. chauvoei*, *Cl. septicum*, *Cl. perfringens* tipo C y D Y *Cl. novyi* tipo B y Cl. tetani; Adyuvante: gel de aluminio	Toxoides inactivados de *Cl. Botulinum* tipo C y D; Glicerofosfato de sodio; Adyuvante: gel de aluminio.

Reproductiva

Producto	REPROMIX	GESTAMIX	BRUCELMIQ
Descripción	Vacuna contra IBR, DVB, Campylobacteriosis Genital y Hemofilosis.	Vacuna contra IBR, DVB, Campylobacteriosis Genital, Hemofilosis y Leptospirosis.	Vacuna contra Brucelosis bovina. Cepa 19 liofilizada.
Beneficios	Reproducción efectiva en rodeos de cría y tambo. La combinación óptima de antígenos y controles moleculares hace ideal su aplicación en la prevención de enfermedades reproductivas de rodeos de cría y tambo, especialmente en animales donde dichas patologías producen mermas en los porcentajes de preñez.	Máxima protección contra enfermedades reproductivas. La combinación óptima de antígenos y controles moleculares hace ideal su aplicación en la prevención de enfermedades reproductivas de rodeos de cría y tambo, especialmente en animales donde dichas patologías producen mermas en los porcentajes de preñez y parición.	Minimice los riesgos contra el aborto. El control de la vacuna antibrucélica a nivel ADN diseñado por Biochemiq, asegura controles de última generación y vacunas antibrucélicas con elevados estándares de calidad.
Dosis	5 ml Vía Subcutánea	5 ml Vía Subcutánea	2 ml Vía Subcutánea
Administración	Hembras preservicio: 2 dosis con 21 días de intervalo. Dejar transcurrir 10 días antes del servicio.	Hembras preservicio: 2 dosis con 21 días de intervalo. Dejar transcurrir 10 días antes del servicio. Revacunar semestralmente.	Terneras de 3 a 8 meses de edad.
MBS	✓	✓	✓
Presentación	Frasco conteniendo: **300** ml / **60** dosis **125** ml / **25** dosis	Frasco conteniendo: **300** ml / **60** dosis **125** ml / **25** dosis	Caja conteniendo 1 fco. Vacuna liofilizada y 1 fco. Diluyente para: **50** ml / **25** dosis **20** ml / **10** dosis
Composición	Cultivos inactivados de HVB tipo I, DVB, *Campylobacter fetus* subsp. venerealis, *Campylobacter fetus* subsp. venerealis biovar intermedio, *Campylobacter fetus* subsp. fetus y *Histophilus somni (Haemophilus somnus)*; Adyuvante: gel de aluminio.	Cultivos inactivados de HVB tipo I, DVB, *Campylobacter fetus* sbsp. venerealis, *Campylobacter fetus* sbsp. venerealis biovar intermedio, *Campylobacter fetus* sbsp. Fetus, *Histophilus somni (Haemophilus somnus)* y Leptospira interrogans Pomona, e Icterohemorrhagiae; Adyuvante: gel de aluminio.	Fco. Vacuna liofilizada: suspensión de células viables de *Brucella abortus* cepa19, Fco. Diluyente: solución salina pH 6.4 – 6.8.

Respiratoria

	NEUMOENTERIMIQ	AIRMIX	AIRMIX LEPTO
Producto			
Descripción	Vacuna contra Neumoenteritis.	Vacuna contra IBR, DVB, PI3, ERSB, Pasteurelosis, Hemofilosis y Queratoconjuntivitis Infecciosa	Vacuna contra IBR, DVB, PI3, Pasteurelosis, Hemofilosis, Queratoconjuntivitis Infecciosa y Leptospirosis Bovina.
Beneficios	Reducción simultánea de trastornos respiratorios y digestivos. Previene en cría y re-cría neumonías y trastornos digestivos clásicos, ampliando su cobertura en manifestaciones respiratorias debido a la inclusión antigénica de *Histophilis somni (Haemophilus somnus).*	Máxima protección de neumonías y patologías oculares Los antígenos seleccionados sumado a los controles moleculares favorece la prevención simultánea de signos clínicos de neumonías y queratoconjuntivitis reduciendo las pérdidas ocasionadas por dicha enfermedad.	Protección múltiple de neumonías, patologías oculares y reproductivas Los antígenos seleccionados sumado a los controles moleculares favorece la prevención simultánea de signos clínicos de neumonías, queratoconjuntivitis y Leptospirosis reduciendo las pérdidas ocasionadas por dichas enfermedades.
Dosis	5 ml 3 ml Vía Subcutánea	5 ml Vía Subcutánea	5 ml Vía Subcutánea
Administración	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo; Hembras preñadas primovacunadas: 2 dosis con 21 días de intervalo; Revacunar anualmente.	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo; Hembras preñadas primovacunadas: 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar semestralmente.	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo; Hembras preñadas primovacunadas: 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar semestralmente.
MBS	✓	✓	✓
Presentación	Frasco conteniendo: **300** ml **125** ml	Frasco conteniendo: **300** ml / **60** dosis **125** ml / **25** dosis	Frasco conteniendo: **300** ml / **60** dosis **125** ml / **25** dosis
Composición	Cultivos inactivados de Pasteurella multocida, *Histophilus somni (Haemophilus somnus)*, *Escherichia coli* y *Salmonella dublin*; Adyuvante: gel de aluminio.	Cultivos inactivados de HVB tipo I, DVB, PI3, RSB, Pasteurella multocida, *Histophilus somni (Haemophilus somnus)* y *Moraxella bovis*; Adyuvante: gel de aluminio.	Cultivos inactivados de HVB tipo I, DVB, PI3, Pasteurella multocida, *Histophilus somni (Haemophilus somnus)*, *Moraxella bovis* y Leptospira interrogans Pomona y Icterohemorrhagiae; Adyuvante: gel de aluminio.

	Carbunclo	Neonatal	Ocular
Producto	**CARBOMIQ STERNE**	**ROTAMIX**	**VISUALMIX**
Descripción	Vacuna contra Carbunclo Bacteridiano.	Vacuna contra Rotavirosis, Mancha, Colibacilosis y Salmonelosis.	Vacuna contra IBR y Queratoconjuntivitis infecciosa.
Beneficios	Óptima inmunidad contra el carbunclo. La cantidad óptima de esporos sumado a la verificación molecular llevada a cabo por Biochemiq en el plásmido pX01 (toxina), son claves para proteger reduciendo riesgos de baja inmunidad frente al Carbunclo.	Máxima prevención contra enfermedades neonatales y mancha en el ternero. La combinación exclusiva previene enfermedades neonatales incluyendo protección contra Mancha (*Clostridium chauvoei*) durante el período ventana que abarca desde el nacimiento hasta los tres meses, donde comienza el plan de vacunación clostridial en terneros.	Óptima respuesta inmune frente a enfermedades oculares. La verificación molecular de los genes de interés (gB, entre otros) es clave para producir las principales glicoproteínas inmunogénicas en IBR, responsables de la generación de anticuerpos neutralizantes.
Dosis	2 ml / 1 ml Vía Subcutánea	5 ml Vía Subcutánea	3 ml Vía Subcutánea
Administración	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 1 dosis. Revacunar anualmente.	Hembras preñadas primovacunadas: último tercio de la gestación, 2 dosis con 21 días de intervalo. Entre la vacunación y la parición debe mediar un mínimo de 15 días. Revacunar al preparto.	Primovacunados: a partir de los 3 meses de edad, 2 dosis con 21 días de intervalo; Hembras preñadas primovacunadas: 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar semestralmente.
MBS	✓	✓	✓
Presentación	Frasco conteniendo: **300** ml **100** ml **60** ml	Frasco conteniendo: **300** ml / **60** dosis **125** ml / **25** dosis	Frasco conteniendo: **240** ml / **80** dosis **90** ml / **30** dosis
Composición	Cultivo vivo de *Bacillus anthracis* cepa Sterne (34F2pX01+/pX02-); Vehículo hidroglicerinado.	Cultivos inactivados de Rotavirus bovino serotipo 6, Rotavirus bovino serotipo 10, *Clostridium chauvoei*, *Escherichia coli* y *Salmonella dublin*; Adyuvante: gel de aluminio.	Cultivos inactivados de HVB tipo I y *Moraxella Boris*; Adyuvante: gel de alumino.

BIOCHEMIQ



Mejorando el presente

Improving the present

BIOCHEMIQ

BIOCHEMIQ S.A. - ARGENTINA. Tel. 0-810-333-1692 / info@biochemiq.com / www.biochemiq.com