

Ele não consegue sossegar

O que verificar, o que fazer na hora e quando chamar ajuda.

1 Antes de reagir, verifique

- ☐ **Dor?** Testa franzida, dentes cerrados, gemido, protege uma parte do corpo.
- ☐ **Banheiro?** Bexiga cheia? Intestino preso: há quantos dias sem evacuar?
- ☐ **Fome, sede, frio ou calor?**
- ☐ **Óculos e aparelho de ouvido:** está usando?
- ☐ **Mudou de repente** em horas ou dias? **Ligue para o médico hoje.**

2 Na hora da agitação

- ☐ Respire fundo e **baixe a voz**
- ☐ Aproxime-se **de frente**, na altura dos olhos
- ☐ **Uma frase curta** de cada vez. Espere a resposta (até 30 segundos)
- ☐ **Não discuta nem corrija.** Acolha: "Estou aqui com o senhor."
- ☐ Mude de ambiente; ofereça água, música de que gosta ou fotos
- ☐ **Nunca segure ou amarre sozinho**

3 Remédios: não mexa sem o médico

Rivotril, Valium, Dienpax, Lorax, Lexotan, Frontal, Stilnox, Haldol, Risperdal, Seroquel: não aumente, não acrescente e **não suspenda de repente.** Leve todas as caixas à consulta.

Chame ajuda agora

SAMU 192

Ligue de qualquer telefone

Ambulância do seu plano ou serviço de saúde

- ☐ Confusão ou agitação de **início súbito**
- ☐ Febre, **falta de ar** ou sonolência fora do normal
- ☐ Suspeita de **queda ou fratura**
- ☐ Sem beber ou comer há mais de **24 horas**
- ☐ **Perigo** para a pessoa ou para os outros

Telefone do médico:

Outro contato da família:

Grupos de apoio a cuidadores:

ABRAz · abraz.org.br