1. Ejercicios

1.1. Ejercicio 1

Derive cada una de las siguientes funciones

$$\begin{split} f(x) &= e^{e^{e^{e^x}}} \\ f(x) &= \log\left(1 + \log\left(1 + \log\left(1 + e^{1 + e^{1 + x}}\right)\right)\right) \\ f(x) &= (\sin x)^{\sin(\sin x)} \\ f(x) &= e^{\left(\int_0^x e^{-t^2} dt\right)} \\ f(x) &= x^x \end{split}$$

Solución

Veamos $f(x)=e^{e^{e^{e^x}}}.$ Sea $h(x)=e^x$, notemos lo siguiente:

$$h_1(x) = (h \circ h)(x)$$
$$= h(h(x))$$
$$= e^{e^x}$$

Así tenemos que

$$h'_1(x) = \left((h \circ h)(x) \right)'$$
$$= h'(h(x)) \cdot h'(x)$$

Sabemos que $h'(x) = e^x$, entonces

$$h'_1(x) = h'(e^x) \cdot e^x$$
$$= e^{e^x} \cdot e^x$$

Veamos que

$$h_2(x) = (h \circ h_1)(x)$$
$$= h(h_1(x))$$
$$= e^{e^{x}}$$

Así tenemos que

$$h'_2(x) = ((h \circ h_1)(x))'$$

= $h'(h_1(x)) \cdot h'_1(x)$

Sabemos que $h'(x) = e^x$ y $h'_1(x) = e^{e^x} \cdot e^x$, entonces

$$h'_2(x) = h'(e^{e^x}) \cdot e^{e^x} \cdot e^x$$
$$= e^{e^{e^x}} \cdot e^{e^x} \cdot e^x$$

Veamos que

$$h_3(x) = (h \circ h_2)(x)$$
$$= h(h_2(x))$$
$$= e^{e^{e^{x}}}$$

Así tenemos que

$$h'_3(x) = ((h \circ h_2)(x))'$$

= $h'(h_2(x)) \cdot h'_2(x)$

Sabemos que $h'(x) = e^x$ y $h'_1(x) = e^{e^x} \cdot e^x$, entonces

$$h_3'(x) = h'(e^{e^{e^x}}) \cdot e^{e^{e^x}} \cdot e^{e^x} \cdot e^x$$
$$= e^{e^{e^x}} \cdot e^{e^{e^x}} \cdot e^{e^x} \cdot e^x$$

Por lo tanto

$$\boxed{\left(e^{e^{e^{e^x}}}\right)' = e^{e^{e^x}} \cdot e^{e^{e^x}} \cdot e^{e^x} \cdot e^x}$$

Veamos $f(x)=\log\left(1+\log\left(1+\log\left(1+e^{1+e^{1+x}}\right)\right)\right)$ Sea $g(x)=e^{1+x}$, notemos lo siguiente:

$$g_1(x) = (g \circ g)(x)$$
$$= g(g(x))$$
$$= e^{1+e^{1+x}}$$

Así tenemos que

$$g_1'(x) = ((g \circ g)(x))'$$
$$= g'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Sabemos que $g'(x) = e^{1+x}$, entonces

$$g'_1(x) = g'(e^{1+x}) \cdot e^{1+x}$$

= $e^{e^{1+x}} \cdot e^{1+x}$

Sea $h(x) = \log(1+x)$, notemos lo siguiente:

$$h_1(x) = (h \circ g_1)(x)$$

= $h(g_1(x))$
= $\log (1 + e^{1+e^{1+x}})$

Así tenemos que

$$h'_1(x) = ((h \circ g_1)(x))'$$

= $h'(g_1(x)) \cdot g'_1(x)$

Sabemos que $h'(x) = \frac{1}{1+x}$ y $g_1'(x) = e^{e^{1+x}} \cdot e^{1+x}$, entonces

$$\begin{split} h_1'(x) &= h'(e^{1+e^{1+x}}) \cdot e^{e^{1+x}} \cdot e^{1+x} \\ &= \left(\frac{1}{1+e^{1+e^{1+x}}}\right) \cdot e^{e^{1+x}} \cdot e^{1+x} \\ &= \frac{e^{e^{1+x}} \cdot e^{1+x}}{1+e^{1+e^{1+x}}} \end{split}$$

Veamos que

$$h_2(x) = (h \circ h_1)(x)$$

= $h(h_1(x))$
= $\log \left(1 + \log \left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)\right)$

Así tenemos que

$$h'_2(x) = ((h \circ h_1)(x))'$$

= $h'(h_1(x)) \cdot h'_1(x)$

Sabemos que $h'(x)=\frac{1}{1+x}$ y $h'_1(x)=\frac{e^{e^{1+x}}\cdot e^{1+x}}{1+e^{1+e^{1+x}}}$, entonces

$$\begin{split} h_2'(x) &= h' \left(\log \left(1 + e^{1 + e^{1 + x}} \right) \right) \cdot \frac{e^{e^{1 + x}} \cdot e^{1 + x}}{1 + e^{1 + e^{1 + x}}} \\ &= \frac{1}{1 + \log \left(1 + e^{1 + e^{1 + x}} \right)} \cdot \frac{e^{e^{1 + x}} \cdot e^{1 + x}}{1 + e^{1 + e^{1 + x}}} \\ &= \frac{e^{e^{1 + x}} \cdot e^{1 + x}}{\left(1 + \log \left(1 + e^{1 + e^{1 + x}} \right) \right) \left(1 + e^{1 + e^{1 + x}} \right)} \end{split}$$

Veamos que

$$h_{3}(x) = (h \circ h_{2})(x)$$

$$= h(h_{2}(x))$$

$$= \log \left(1 + \log \left(1 + \log \left(1 + e^{1 + e^{1 + x}}\right)\right)\right)$$

Así tenemos que

$$h_3'(x) = ((h \circ h_2)(x))'$$

= $h'(h_2(x)) \cdot h_2'(x)$

Sabemos que $h'(x) = \frac{1}{1+x}$ y $h'_2(x) = \frac{e^{e^{1+x}} \cdot e^{1+x}}{\left(1 + \log\left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)\right)\left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)}$, entonces

$$h_3'(x) = h'\left(\log\left(1 + \log\left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)\right)\right) \cdot \frac{e^{e^{1+x}} \cdot e^{1+x}}{\left(1 + \log\left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)\right)\left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)}$$

$$= \frac{1}{1 + \log\left(1 + \log\left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)\right)} \cdot \frac{e^{e^{1+x}} \cdot e^{1+x}}{\left(1 + \log\left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)\right)\left(1 + e^{1+e^{1+x}}\right)}$$

$$=\frac{e^{e^{1+x}}\cdot e^{1+x}}{\left(1+\log\left(1+e^{1}\log\left(1+e^{1+e^{1+x}}\right)\right)\right)\left(1+\log\left(1+e^{1+e^{1+x}}\right)\right)\left(1+e^{1+e^{1+x}}\right)}$$

Por lo tanto

Veamos $f(x) = (\sin x)^{\sin(\sin x)}$

Por las propiedades de la función exponencial y de la función logaritmo tenemos que

$$f(x) = (\sin x)^{\sin(\sin x)}$$
$$= e^{\sin(\sin x) \cdot \log(\sin x)}$$

Así tenemos que

$$f'(x) = \left(e^{\sin{(\sin{x})\cdot\log{(\sin{x})}}}\right)'$$

$$= e^{\sin{(\sin{x})\cdot\log{(\sin{x})}}} \cdot (\sin{(\sin{x})} \cdot \log{(\sin{x})})'$$

$$= e^{\sin{(\sin{x})\cdot\log{(\sin{x})}}} \cdot ((\sin{(\sin{x})})' \cdot \log{(\sin{x})} + (\log{(\sin{x})})' \cdot \sin{(\sin{x})})$$

$$= e^{\sin{(\sin{x})\cdot\log{(\sin{x})}}} \cdot \left(\cos{(\sin{x})} \cdot \cos{x} \cdot \log{(\sin{x})} + \frac{\cos{x}}{\sin{x}} \cdot \sin{(\sin{x})}\right)$$

$$= e^{\sin{(\sin{x})\cdot\log{(\sin{x})}}} \cdot (\cos{(\sin{x})} \cdot \cos{x} \cdot \log{(\sin{x})} + \cot{x} \cdot \sin{(\sin{x})})$$

$$= (\sin{x})^{\sin{(\sin{x})}} (\cos{(\sin{x})} \cdot \cos{x} \cdot \log{(\sin{x})} + \cot{x} \cdot \sin{(\sin{x})})$$

Por lo tanto

$$\left[\left((\sin x)^{\sin{(\sin x)}}\right)' = (\sin x)^{\sin{(\sin x)}} \left(\cos{(\sin x)} \cdot \cos{x} \cdot \log{(\sin x)} + \cot{x} \cdot \sin{(\sin x)}\right)\right]$$

1.2. Ejercicio 2

- Halle f'(x) para cada una de las siguientes funciones

$$f(x) = (1+x)\left(1+e^{x^2}\right)$$
$$f(x) = \frac{(3-x)^{\frac{1}{3}}x^2}{(1-x)(3+x)^{2^3}}$$
$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^{2x}(1+x^3)}$$

Solución

1.3. Ejercicio 3

Hallar los siguientes límites mediante la regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - x + \frac{x^3}{6}}{x^3}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - x + \frac{x^3}{6}}{x^4}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^2}$$

Solución