PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Treino concorrente

Efeito interferência e organização do treino

Fisiologia do Exercício Aplicada

1980: DEZ SEMANAS, TRÊS GRUPOS, FORÇA DE PERNA

O achado que criou o medo



O VO_2máx subiu igual nos dois grupos de endurance. E repara no volume: o grupo concorrente fazia seis dias de endurance mais cinco de força.

Esquema, sem valores medidos · Hickson, European Journal of Applied Physiology 1980


Duas camadas de explicação

Camada molecular

Tensão mecânica → “construa”

Queda de energia: AMPK → “economize”

Camada prática



A leitura “a AMPK desliga a construção” envelheceu: a sinalização depende de tempo, dose e comida. Não é interruptor.

Coffey e Hawley, Journal of Physiology 2017 · tanques ilustrativos

2022: A EVIDÊNCIA SE CORRIGINDO

A interferência é assimétrica


Hipertrofia	Força máxima	Força explosiva	Capacidade aeróbica
=	=	↓	=
preservada	preservada	atenuada, sobretudo na mesma sessão	preservada

> “Vou perder músculo se correr?” Não. “Vou perder explosão?” Pode ser, dependendo de como você organiza.

Schumann e colaboradores, Sports Medicine 2022 · 43 estudos

PARA QUEM ELA APARECE: FORÇA DE PERNA

A interferência mora num lugar específico



destreinado

moderadamente treinado

treinado em força

sem interferência

com interferência

E mesmo nos treinados:

força + **endurance** — **menos de 20 min: aparece**


mais de 2 horas: não aparece

força + **endurance**

Petré e colaboradores, Sports Medicine 2021 · força dinâmica máxima de membros inferiores

A DECISÃO É DE ORGANIZAÇÃO

Três saídas, todas defensáveis



SAÍDA A, PRIMEIRA REGRA

Primeiro o que é prioridade

1º força	2º aeróbico
1º aeróbico	2º força

cerca de 7% mais ganho de força dinâmica de perna

menos ganho de força de perna


Hipertrofia e VO_2máx: iguais nas duas ordens.

> Se a prioridade é força, ela vem antes. Se é corrida, inverte. Quase sempre quem decide a ordem é o horário da academia.

Eddens, van Someren e Howatson, Sports Medicine 2018 · 10 estudos, mesma sessão

SAÍDA B, DIAS DIFERENTES

Nada errado nos exercícios. Tudo errado no calendário




Mover a perna para o dia mais distante do longo costuma resolver a queixa inteira, sem tirar nada de ninguém. O custo: 4 a 5 dias por semana.

Exemplo ilustrativo

SAÍDA C, ÊNFASE ROTATIVA


Uma desenvolve, a outra se mantém

Ênfase em força




8 a 12 semanas

Ênfase em corrida



8 a 12 semanas

Antes da prova: o erro



8 a 12 semanas

O erro mais comum do corredor amador: zerar a força nas doze semanas finais, quando o volume de corrida está maior. Chega à prova mais fraco.

Esquema, sem valores medidos

PARA QUEM ESSA CONVERSA É SÉRIA

A interferência importa numa ponta, e é nota de rodapé na outra



quem está com a conta apertada: aí não é interferência, é falta de recuperação

No jovem que busca desempenho

o endurance é o que pode custar força


No master

o que custa força é o tempo; o aeróbico que ele gosta não é o inimigo

er.

O CRITÉRIO

Nunca é “força ou aeróbico”



Três sinais juntos apontam interferência: a queixa começou com a segunda capacidade, o treino que piorou vem logo depois do outro, e o volume total não mudou. Aí, mova uma sessão.

O QUE FICA

Duas regras

- Primeiro o que é prioridade, no melhor horário
- Manutenção não é abandono: a carga fica

Preparador e educador físico

Montam a semana e decidem a ordem, o intervalo e os blocos.

As outras profissões

Olham o calendário e enxergam a colisão por trás de “meu rendimento caiu” ou “meu tendão dói”.

Três dias por semana? Sessão combinada, a prioridade primeiro. A que se cumpre vence quase sempre.