PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Destreino

Cronologia da perda e da recuperação das adaptações

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

UM ESTUDO DE 2013 EM IDOSOS SAUDÁVEIS

Catorze dias andando menos




14 dias, sem cama e sem doença: resistência anabólica instalada

> E a massa magra da perna ficou menor.

Breen e colaboradores, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2013

UM ESTUDO DE 2018

Duas semanas para perder; duas de volta não bastaram




> As adaptações se perdem mais rápido do que se constroem, e a volta não é o espelho da ida.

Esquema da linha do tempo, sem valores medidos · 22 adultos com sobrepeso e pré-diabetes, 69 anos · McGlory e colaboradores, Journals of Gerontology 2018

A CONCESSÃO QUE O TEMA PEDE

O estrago depende de quanto cai, e de quem cai



O que diferencia os estudos

mil passos não é o mesmo que dois mil

pré-diabetes não é o mesmo que metabolismo bom

o dado mais consistente: o metabólico, no mais vulnerável

> E é esse grupo que a gente mais encontra depois de internação e cirurgia.

Walker e colaboradores, European Journal of Applied Physiology 2024 · 66 idosos, quase 8 em 10 mulheres, ensaio randomizado

MUJIKA E PADILLA, 2000

O que se perde primeiro volta mais rápido

volume plasmático	enzimas e glicogênio	$VO_2máx$	coração	força
dias	semanas	primeiras semanas	meses	a mais resistente

perde primeiro · volta primeiro


perde por último · volta por último

> A primeira semana de volta pesa por causa da parte hidráulica, que é a mais barata de recuperar.

Esquema de ordem, sem valores medidos · Sports Medicine 2000, partes I e II

MEMÓRIA MUSCULAR

Quem já construiu reconstrói mais rápido




> O mecanismo, núcleos retidos na fibra, segue em debate em humanos. O fenômeno é consistente o bastante para ser dito ao paciente.

Esquema, sem valores medidos

DUAS CONVERSAS OPOSTAS

Duas semanas não estragam; três meses custam


Acalmar quem para pouco



custa volume plasmático e um pouco de enzima

o medo faz gente treinar doente e voltar cedo

Não banalizar quem para muito



tempo parado mais tempo de voltar


pós-internação: volta para trás do ponto de partida

> E a redução silenciosa, a que ninguém chama de parada, também é destreino.

Curvas: esquema, sem valores medidos

O OPOSTO DO REPOUSO POR PRECAUÇÃO

Manter alguma coisa vale muito mais que nada



Dose de manutenção
1 a 2 sessões de força por semana, carga perto da habitual

Na lesão, o que o quadro permitir
pedalar, nadar, poupar só o que precisa

Treinar o lado saudável
educação cruzada atenua a perda do lado imobilizado

> Quem mantém alguma coisa não está treinando pouco. Está encurtando muito o retorno.

Curvas: esquema, sem valores medidos

O QUE OS NÚMEROS DECIDEM

Afastamento não é binário

- Duas semanas não vão te estragar; três meses vão custar: vamos manter alguma coisa
- A primeira semana de volta é ruim, e é a parte barata
- No idoso e no pós-operatório, o relógio corre mais rápido

Preparador e educador físico

Dose de manutenção e retorno progressivo.

Fisioterapia

O mesmo em tecido lesionado.

Médico

A liberação clínica quando há condição médica.

Enxergar o afastamento antes que vire hábito é de toda a equipe.