PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Hidratação no exercício

Taxa de sudorese, reposição de sódio e prevenção da hiponatremia

Nutrição Esportiva

O POSICIONAMENTO DE 2007

Não perder mais de 2%. E não ganhar.



Não perder mais de 2%

ela cumpriu


E não ganhar

a metade que teria protegido

Fez o que mandaram. A segunda metade da regra teria protegido.

Sawka e colaboradores · Medicine and Science in Sports and Exercise 2007

Terminar entre zero e dois por cento abaixo





70 kg → 68,9 kg em 90 min · bebeu 0,6 L · suor 1,7 L · taxa ≈ 1,13 L/h · perda 1,6%

Taxa de suor = (peso antes − peso depois) + o que bebeu − a urina, dividido pelo tempo. Cada quilo perdido é, aproximadamente, um litro.

UMA REVISÃO DE 2017

Um fator de quatro entre pessoas





> Conta ilustrativa, não dado medido. Sua pouco, corre devagar, passa muito tempo na prova: a regra de quem sua muito vira excesso.

Baker · Sports Medicine 2017

TRÊS REGRAS DE USO

O número vale para uma condição

A taxa vale para aquela condição



verão e inverno dão números diferentes

medir no longão, no jogo, na prova

Não é repor cem por cento durante

perda

reposição durante

barras: esquema

limitar a perda, não zerar; a sede guia


Até uma hora, clima ameno: a sede resolve

a conta é para:

- sessão longa
- calor
- sintoma
- problema prévio

ANTES · POSICIONAMENTO DE 2007

Começar hidratado, com tempo de urinar



Para 70 kg: 350 a 500 mL quatro horas antes. Cor da urina: clara está bom, escura falta; muda com complexo B e volume recente. Sinal, não medida.

Medicine and Science in Sports and Exercise 2007

DEPOIS · SHIRREFFS E COLABORADORES, 1996

Volume maior que a perda, com sódio

perdeu
1,1 kg

→

vezes
1,25 a 1,5

→

até o jogo
1,4 a 1,7 L

com sódio, da bebida ou da comida

volume de 1,25 a 1,5 L por quilo perdido, nas horas seguintes

Quando importa

- outra sessão no mesmo dia ou cedo no dia seguinte
- perda grande


uma sessão por dia e jantar normal: a comida e a sede resolvem

> Volume sem sódio escoa pela urina. Sódio sem volume não basta. O balanço fecha na interação dos dois.

Medicine and Science in Sports and Exercise 1996

MAUGHAN E COLABORADORES, 2016

Treze bebidas, e a água como régua




O café de todo dia não desidrata. O leite é uma bebida de recuperação subestimada. A cerveja: o problema não é a água, é o sono e a recuperação.

Um litro de cada, em pessoas hidratadas · American Journal of Clinical Nutrition 2016

SÓDIO · UMA REVISÃO DE 2017

De 10 a 90 mmol/L no suor



Água de coco

potássio alto, sódio baixo e variável: não repõe o suador salgado

Quem precisa durante

- acima de duas horas
- calor e umidade
- suador salgado
- duas sessões no dia

> Sal em cápsula não protege de quem bebe demais. A hiponatremia do exercício é, quase sempre, excesso de água.

Baker 2017 · Hew-Butler e colaboradores 2015 · faixa da bebida: posicionamento de 2007

UM ESTUDO DE 2011

Cãibra não é número de hidratação

43

com cãibra

~~sódio no sangue: igual~~

~~desidratação: igual~~

ritmo mais rápido que o habitual

história de cãibra

166

sem cãibra

Perfil típico de quadra: futsal amador, jogo inteiro sem substituição, mais jogos que treinos, cãibra desde a adolescência. A conduta sai do copo e vai para a quadra.

210 triatletas de Ironman · Schwellnus, Drew e Collins · British Journal of Sports Medicine 2011

OS NÚMEROS DA AULA

Uma balança substitui qualquer tabela

- Menos de 2% de perda, nenhum ganho; taxa de suor medida na condição que importa
- 5 a 7 mL/kg quatro horas antes; 1,25 a 1,5 L por kg perdido, com sódio, quando há pressa
- Sódio só para quem precisa; cãibra pede condicionamento antes de sal

Nutricionista

Plano de líquidos e de sódio.

Preparador e educador físico

A pesagem no treino; o condicionamento na cãibra.

Médico

Hiponatremia, doença do calor, atleta confuso.

Na dúvida, não se empurra líquido em quem pode estar com sódio baixo.