
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Ferro, vitamina D e ômega-3

Suplementos de uso clínico, diagnóstico antes do produto

Suplementação, Ergogênicos e Antidoping


Corrigir deficiência melhora. Turbinar suficiência, não.



> Os ergogênicos acrescentam algo sobre uma base normal. Ferro, vitamina D e ômega-3 funcionam quando há falta.

A FORMA DA CURVA

Onde a pessoa está?



> A pergunta não é “isso é bom?”. É “onde essa pessoa está na curva?”. Para ferro e vitamina D, só um exame responde.

Esquema, sem valores medidos

TRÊS PERFIS TÍPICOS

Uma precisa, um se arrisca, um não move nada

A corredora

precisa

cansada há três meses; ferritina 18, hemoglobina normal

O homem da megadose

se arrisca

50 mil unidades de vitamina D por semana, há oito meses; nunca dosou cálcio

O jogador

não move nada

uma cápsula de ômega-3 por dia “para inflamação”

A DECISÃO

Três perguntas, para qualquer suplemento de uso clínico

	Ferro	Vitamina D	Ômega-3
Existe falta, demonstrada?	exame com indicação	exame com indicação	ingestão habitual de peixe
Existe risco no excesso?	sério	em dose alta sem controle	menor; anticoagulante
Existe dose, prazo e reavaliação?	repor sem data de reavaliação cria uso permanente por inércia		

UMA REVISÃO DE 2019


Ferro: quem testar e o que o número diz

Ferritina



primeiro estágio de deficiência em atletas, com hemoglobina ainda normal

Hepcidina depois do exercício



a absorção intestinal se fecha · curva: esquema

Inflamação

ferritina ↑

pode estar falsamente confortável

> Grupo de risco somado a sintoma abre exame. Nenhum dos dois, sozinho, costuma abrir.

Sim e colaboradores · European Journal of Applied Physiology 2019

DOIS ENSAIOS DE 2017

Ferro: dias alternados, dose única

Dias consecutivos



16,3% de absorção acumulada · 131 mg no total

Dias alternados



21,8% de absorção acumulada · 175 mg no total

Dividir a dose do dia

sem ganho de absorção

mais hepcidina


dose única, pela manhã, em dias alternados, longe da sessão intensa

Vitamina C junto; café, chá, leite e cálcio longe.

Stoffel e colaboradores · mulheres com estoque baixo · Lancet Haematology 2017

Por que não repor às cegas

Ferro em excesso



acumula; sem via eficiente de excreção

hemocromatose hereditária não é raríssima

polivitamínico com ferro também conta

sem saída

ferritina baixa

é achado, não diagnóstico


repor às cegas apaga a pista

- fluxo menstrual
- dieta
- doença celíaca
- **perda digestiva: obrigatório investigar**

> Diagnóstico, prescrição e reavaliação são do médico. Reconhecer risco e sintoma e encaminhar cedo é de todos.

VITAMINA D: SÓ A DECISÃO

Corrigir não é otimizar




Quem tem motivo para testar

- pouco sol
- treino coberto
- pele escura
- idade
- obesidade
- má absorção
- fratura por estresse

> Na megadose, a conduta é avaliação médica com cálcio e vitamina D, e a suspensão decidida com o resultado na mão.

Leia a linha de EPA e DHA, não o peso da cápsula



Quase nunca come peixe? Há espaço. Efeito claro em marcador de inflamação e dano; inconsistente no desempenho. Incorporação leva semanas.

A cápsula é exemplo de rótulo comum, não número de estudo

UM ENSAIO DE 2014


Apagar o sinal que adapta

54 jovens

duplo-cego, 11 semanas de treino aeróbio, sobretudo corrida

1.000 mg de C + 235 mg de E

por dia: doses de prateleira




alturas: esquema

Achado de vitamina C e E, não do ômega-3. Mas a postura vale: onde a inflamação faz parte do sinal, “reduzir inflamação” não é automaticamente bom.

Paulsen e colaboradores · Journal of Physiology 2014

Três posições na curva



Corredora

falta provável · risco: repor às cegas

médico investiga o porquê; dose única matinal, dias alternados; reavaliação

Jogador

talvez falte · risco baixo

peixe duas vezes por semana; se usar, a dose dos estudos

Megadose de D

falta não é a questão · risco: hipercalcemia

médico, cálcio e vitamina D; suspensão orientada

A dor depois do jogo tem candidatos melhores: volume de jogo acima do treinado, sono e recuperação.

Você toma alguma vitamina ou suplemento por conta própria?

- Corrigir deficiência melhora; turbinar suficiência, não
- Ferro e vitamina D: exame antes do produto, e reavaliação marcada
- Ômega-3: ingestão habitual primeiro; dose lida no rótulo

Médico

Exame, diagnóstico, prescrição, causa, suspensão.

Nutricionista

Comida que previne e sustenta a correção.

Educador físico e preparador

Veem o sinal primeiro; levam o dado adiante.

A pergunta de primeira consulta é de todas as profissões.