PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Entorse de tornozelo e dor no ombro

Do primeiro dia à recidiva evitada


Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

DUAS REGIÕES, UM ERRO EM COMUM

A conduta padrão termina cedo demais.



A regra de Ottawa



27 estudos

15.581 pacientes

97,6% sensibilidade combinada para fratura

> Pede imagem: dor óssea na borda posterior dos maléolos, na base do quinto metatarso ou no navicular, ou não conseguir dar quatro passos.

Revisão sistemática, BMJ 2003

QUALQUER QUE SEJA A REGRA

Sinais que pedem avaliação urgente

Deformidade
visível

Não apoia
o pé no chão


Dor
desproporcional

Formigamento
ou perda de sensibilidade

Pé pálido
ou frio

Qualquer um desses tira a conversa da beira do campo.

Proteger pouco, mover cedo



✕ **imobilizar por semanas sem indicação médica**

✕ **achar que o remédio substitui reabilitação**

Revisão de 46 revisões sistemáticas, Br J Sports Med 2017

O ERRO CLÁSSICO

Anda sem dor, o inchaço sumiu. Alta?

✓ anda sem dor

✓ o inchaço sumiu

~~alta?~~

a parte que evita a próxima torção

nem começou

Instabilidade crônica depois da primeira entorse

~40%

nas estimativas mais baixas



até 70%

nas mais altas, conforme critério e população




cada figura: uma pessoa depois da primeira entorse

> Insegurança, torções repetidas e limitação por anos: uma lesão que parece banal e deixa sequela.

Consenso do International Ankle Consortium, Br J Sports Med 2016

O QUE REDUZ A RECIDIVA

Quatro ingredientes, por semanas




> Em quem já torceu: órtese ou bandagem no período de risco (evidência forte) e treino neuromuscular (moderada).

Br J Sports Med 2017

O padrão de quem joga acima da cabeça

O padrão



dor lateral, acima da cabeça

começou devagar, sem trauma; dói ao deitar do lado

melhora com redução, volta com o volume

Fora do padrão

- **trauma com perda súbita de força**
- **não eleva o braço; sensação de luxação**
- **dor noturna intensa e persistente**
- **formigamento para a mão; dor que não muda**

O NOME E A LEITURA QUE MUDARAM

Dor do ombro relacionada ao manguito rotador

~~“algo pinçando que precisa ser tirado”~~ → **dor do ombro relacionada ao manguito rotador**

Primeira linha

exercício com progressão de carga, por meses, e ajuste do treino

Atleta jovem de arremesso ou natação

instabilidade é parte frequente do quadro

Acima dos quarenta

mais lesão estrutural; exercício segue primeira linha na maioria

Lewis e colegas, J Orthop Sports Phys Ther 2015

Quatro frentes

Ajuste do que produziu

sem isso a fisioterapia trata com uma mão e o treino machuca com a outra

Exercício progressivo

manguito e escápula, carga que sobe

Mobilidade e controle

escápula e coluna torácica, quando limitadas

Expectativa combinada

leva meses e oscila

Não fazer: repouso prolongado, infiltração como primeira linha, imagem de rotina em quadro típico.

Esporte por esporte

Natação

- metragem semanal
- uso de palmar
- distribuição entre os estilos

Arremesso

- contagem de arremessos
- dias de descanso

Academia

- volume de empurrar acima da cabeça
- proporção empurrar e puxar

> Em todos: o que mudou nas semanas antes da dor?

TORNOZELO E OMBRO

Alta por ausência de dor produz recidiva

- Tornozelo: regra de imagem, mover cedo, depois equilíbrio e gesto
- Órtese ou bandagem no período de risco
- Ombro: exercício por meses e ajuste do volume

Médico e fisioterapia

Imagem, encaminhamento e etapas da reabilitação.

Preparação física

Volume, arremessos, equilíbrio e aterrissagem no treino.

Quem está mais perto

Reconhece o alarme e tira o atleta.

Próxima aula: lesão óssea por estresse.