
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Tornozelo depois da entorse

A recidiva em números e as cinco perguntas do retorno

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

Um em cada três torceu de novo no ano seguinte.



Tratamento habitual, bem feito · BMJ 2009

BMJ, 2009

Oito semanas em casa, sem supervisão




> Não foi um programa caro, conduzido todo dia por um profissional. A pessoa fez sozinha, depois de orientada.


Ensaio holandês, BMJ 2009

A CONTA QUE SE LEVA PARA A CONVERSA

Nove atletas fazendo, uma entorse a menos



tratamento habitual: 33 em 100



com o programa: 22 em 100

> 33 – 22 = 11 em cada 100. 100 ÷ 11 ≈ 9. O programa não zera a recidiva: leva de um em três para perto de um em cinco.

Conta feita a partir das duas proporções do ensaio

Em casa, oito semanas, depois da alta

Amplitude

a dorsiflexão, o tornozelo dobrando para a frente

Força

panturrilha e estabilizadores do pé

Equilíbrio

do apoio parado ao instável, olhos abertos a fechados

Gesto

salto, aterrissagem, mudança de direção


em casa, oito semanas, depois da alta

a fisioterapia ensina e entrega por escrito

alguém pergunta toda semana se está sendo feito

O SEGUNDO NÚMERO, 2014

Treino, órtese ou os dois



nova entorse em um ano · órtese contra treino: risco relativo 0,53

384 atletas, ensaio holandês · Br J Sports Med 2014

Não foram diferentes


- **gravidade das novas entorses**
- **tempo perdido**
- **custos**

a órtese reduziu quantas, não o tamanho

SEM BRIGA DE TORCIDA

Uma protege, o outro reconstrói

A órtese protege



tempo · esquema

- **funciona desde o primeiro dia**
- depende de usar em todo treino, por meses

+

O treino reconstrói



tempo · esquema


- **amplitude, força e controle, em semanas**
- depende de fazer, e muita gente para

> Para quem já torceu, as duas se somam. A pergunta útil: qual delas essa pessoa vai de fato usar ou fazer, e por quanto tempo?

Revisão de revisões, Br J Sports Med 2017

A IDEIA DA AULA

A próxima entorse se decide nas oito semanas depois da alta.



> É quando a dor vai embora que a pessoa para de cuidar do tornozelo.

CONSENSO INTERNACIONAL DE 2021

Cinco perguntas antes de voltar

Dor

no esporte e nas últimas 24 horas

Tornozelo

amplitude, força, resistência, potência

Percepção

confiança, estabilidade, prontidão

Controle

equilíbrio parado e em movimento

Desempenho

saltos, agilidade, um treino inteiro

a porta só abre com as cinco, não com a ausência de dor

> 98% de concordância entre os participantes.

Br J Sports Med 2021

SEM LABORATÓRIO

Um jeito barato de responder cada uma

Dor	nota de 0 a 10 no treino e na manhã seguinte
Tornozelo	joelho à parede com fita; elevações de calcanhar numa perna, dos dois lados
Percepção	“Você confia nesse tornozelo para bloquear e cair?”; questionário de instabilidade
Controle	apoio numa perna, olhos abertos e fechados; alcance em várias direções
Desempenho	saltos numa perna, de lado e para a frente; o treino completo, observado

nenhum valor mágico: compare com o outro lado e com a própria pessoa ao longo das semanas

Três erros de alta

Alta pela dor



o erro que produz o um em cada três

Órtese sem treino



quando a órtese sai, o tornozelo é o mesmo de antes

Programa que para no jogo


8 semanas previstas, 2 feitas



quem para na segunda semana não fez o programa que funcionou

QUEM FAZ O QUÊ

Da beira da quadra às oito semanas



A dor não decide a alta

- Um em três com o tratamento habitual; perto de um em cinco com oito semanas em casa
- Órtese reduziu o número de novas entorses, não a gravidade
- Retorno por cinco perguntas

Fisioterapia

Ensina o programa e decide pelas cinco perguntas.

Preparação e treinador

Põem o programa na semana e cobram a órtese.

Atleta

Faz as oito semanas depois da alta.

Próxima aula: ombro e coluna; parar, modificar ou manter.