PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Lesões do esqueleto imaturo

Quatro passos para a dor localizada no jovem atleta

Atleta Adolescente e Atleta Idoso

Dois tratamentos para um diagnóstico de adulto



13 anos · ponteiro

cinco meses de dor no ombro direito

tratamento 1
“tendinite do manguito”

melhora em parte, volta a doer


tratamento 2
“tendinite do manguito”

melhora em parte, volta a doer

Manguito rotador é diagnóstico de adulto

O QUE O ADULTO NÃO TEM

Na criança, o elo mais fraco é a cartilagem de crescimento



esquema

Adulto

trauma em valgo: rompe o ligamento

tração repetida: tendão

Criança

trauma em valgo: lesa a fise

tração repetida: apófise

PASSO 1

Primeiro, tirar o que não é do esporte




- dor noturna que acorda
- febre
- perda de peso, mal-estar
- dor sem relação com o treino
- deformidade
- não consegue usar o membro

→ **avaliação médica urgente**

Sem nenhum deles, padrão mecânico: piora com a carga, melhora com a pausa. Daí em diante, raciocínio esportivo.

PASSO 2

Palpar o endereço: no jovem, o lugar exato decide



Apófises

- tuberosidade da tíbia
- polo inferior da patela
- calcâneo
- crista ilíaca
- tuberosidade isquiática
- epicôndilo medial

Fises por estresse


- rádio distal (apoio nas mãos)
- úmero proximal (arremesso, saque)

Osso

- tíbia, metatarsos
- colo do fêmur: alto risco
- vértebra lombar

PASSO 3, SE HOUVE TRAUMA

Depois de trauma, pensar em fise antes de entorse



I
radiografia pode vir normal

II
o mais comum

III

IV

V
radiografia pode vir normal

parar | **imobilizar** | **avaliar no mesmo dia** | **não: teste de estresse vigoroso**

J Bone Joint Surg Am 1963

PASSO 4

Na imagem, a diferença entre os dois lados é o achado



lado sem dor



lado da dor

Compare com o lado que não dói


Ressonância se a suspeita persiste

Apofisite: diagnóstico clínico

Radiografia normal com clínica sugestiva não libera

DOR LOMBAR COM ESPONDILÓLISE, ESTUDO DE 1995

No jovem que estende a coluna, a dor lombar tem causa



O padrão que pede investigação

- piora na extensão
- muitas vezes de um lado
- arrastada por semanas
- esporte de extensão repetida

O teste de extensão numa perna só não confirma nem afasta.

Arch Pediatr Adolesc Med 1995; Br J Sports Med 2006

Tira o gesto, mantém o atleta no grupo e conta

Tira o gesto

não o esporte

Conta o gesto

por sessão e por semana

Corrige

tornozelo, calçado, força, técnica

Explica o prazo

até a apófise se fundir

Acompanha

comprimento e desvio, meses depois

Evidência pequena: na apofisite do calcâneo, nove artigos numa revisão de 2013. Anti-inflamatório contínuo esconde o sinal; infiltração não tem lugar.

J Foot Ankle Res 2013

Dor localizada em quem cresce e treina tem endereço

- Na criança, o elo mais fraco é a cartilagem de crescimento; “dor do crescimento” não fecha diagnóstico
- Tirar o que não é do esporte, palpar o endereço, pensar em fise após trauma, comparar os lados
- A conduta tira o gesto, não o esporte, e conta o gesto

Quem treina

Conta os gestos de risco, legitima a queixa de dor e mantém o atleta no grupo.

Medicina e fisioterapia

Palpam o endereço, pedem a imagem certa e escrevem a hipótese.

A família

Sabe o prazo e sabe que dor que acorda à noite é urgente.