HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

Ecocardiograma transesofágico

Información para pacientes · Cardiología

Estudio que obtiene imágenes del corazón con una sonda fina y flexible que se introduce por la boca hasta el esófago, desde donde se ve el corazón con mayor detalle. Dura entre 20 y 40 minutos.

Antes del estudio

- Ayuno de al menos 6 horas de alimentos y líquidos, salvo indicación distinta del servicio. Puede tomar sus medicamentos con un sorbo de agua.
- Concurra con un adulto que lo acompañe: se aplica sedación y no podrá conducir ni quedarse solo.
- Informe si tiene dificultad para tragar, enfermedad del esófago o del estómago, várices, cirugías de esófago, problemas de sangrado, alergias (en especial a anestésicos), si toma anticoagulantes o si está embarazada.
- Retire prótesis dentales removibles, lentes y joyas. Recibirá la explicación del estudio y deberá firmar el consentimiento informado.

Cómo se realiza

- Se coloca una vía venosa y se aplica anestesia local en spray en la garganta, además de sedación leve. Usted se acuesta del lado izquierdo con un protector en la boca.
- Al pasar la sonda puede sentir náuseas o presión; la sonda no impide respirar. Se controlan de forma continua la presión, el oxígeno y el electrocardiograma.

Después del estudio

- Quedará en observación entre 1 y 2 horas hasta que pase la sedación.
- No coma ni beba hasta que se le haya pasado la anestesia de la garganta (1 a 2 horas) para evitar atragantarse. Empiece por líquidos y luego alimentos blandos.
- Durante 24 horas no conduzca, no maneje maquinaria ni tome decisiones importantes.
- Es normal una molestia leve en la garganta o ronquera durante uno o dos días.

Consulte de urgencia si presenta

- Dolor intenso en la garganta, el pecho o el abdomen.
- Dificultad para tragar o respirar, fiebre, vómitos con sangre o heces negras.
- Mareo intenso o desmayo.