HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

Enfermería para usuarios trasplantados

Información para pacientes · Nefrología y Trasplante

Cuidados para proteger el órgano trasplantado y prevenir complicaciones. Siga siempre las indicaciones de su equipo de trasplante.

Medicación inmunosupresora

- Tómela todos los días a la misma hora, sin omitir dosis: es lo que protege el órgano trasplantado del rechazo.
- No la suspenda ni cambie la dosis aunque se sienta bien. Si vomita poco después de tomarla o se olvida una dosis, comuníquese con el equipo para saber cómo proceder.
- Evite el pomelo (toronja) y su jugo, y las hierbas medicinales. No tome otros medicamentos (incluidos antiinflamatorios y antibióticos) sin consultar al equipo.
- Los análisis para medir los niveles del medicamento se hacen según indicación, habitualmente antes de la dosis de la mañana.

Prevención de infecciones

- Lávese las manos con frecuencia, sobre todo antes de comer y después de ir al baño, con agua y jabón o alcohol en gel.
- Evite el contacto cercano con personas con gripe, resfrío, varicela, herpes zóster o diarrea. Use tapabocas en lugares cerrados o con mucha gente cuando se lo indiquen.
- Cocine bien los alimentos, lave frutas y verduras y evite carnes, pescados y huevos crudos y lácteos no pasteurizados.
- No limpie excrementos de animales y lávese las manos después de tocar mascotas.
- Consulte antes de vacunarse: las vacunas con virus vivos están contraindicadas. Cuide su higiene bucal y avise que toma inmunosupresores antes de cualquier procedimiento dental.

Controles diarios y hábitos

- Controle y registre temperatura, presión arterial, peso y, si corresponde, glucemia y cantidad de orina.
- Manténgase hidratado según indicación y realice actividad física suave y progresiva. Evite golpes y esfuerzos sobre la zona del trasplante en las primeras semanas.
- Protéjase del sol: use protector solar, ropa y sombrero, y hágase un control dermatológico anual, ya que la inmunosupresión aumenta el riesgo de cáncer de piel.

Consulte de inmediato si presenta

- Fiebre mayor a 38 °C, escalofríos, tos o falta de aire.
- Dolor, hinchazón o sensibilidad en la zona del trasplante, disminución de la orina u orina con sangre, aumento de peso o hinchazón.
- Vómitos o diarrea que le impidan tomar la medicación, o heridas o lesiones de piel o boca que no cicatrizan.

Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela · Teléfono: 1953 / 08001953 · Correo: atencionalusuario@hc.edu.uy
Material informativo para pacientes. No reemplaza la indicación de su equipo de salud: ante dudas o síntomas de alarma, consulte.