HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

Estudios diagnósticos con pertecnetato

Información para pacientes · Medicina Nuclear

El pertecnetato marcado con tecnecio-99m es un trazador radiactivo de dosis baja que se usa en estudios de medicina nuclear, como la centellografía de tiroides, de glándulas salivales o de testículo, y la búsqueda de divertículo de Meckel.

Antes del estudio

- Confirme con el servicio qué estudio se le realizará y si necesita ayuno (por ejemplo, en algunos estudios abdominales).
- Informe si está embarazada, cree estarlo o está amamantando.
- Estudio de tiroides: informe si recibió contraste yodado en las últimas semanas o si toma medicamentos con yodo o para la tiroides. El equipo le dirá si debe suspenderlos; no lo haga por su cuenta.
- Traiga la orden y los estudios previos (ecografías, análisis, otros centellogramas).

Durante el estudio

- Se administra el trazador por vía intravenosa u oral, según el estudio. Solo se siente el pinchazo.
- Según el estudio, se espera entre unos minutos y varias horas antes de las imágenes. Luego se toman imágenes con una cámara, acostado o sentado y sin moverse, durante 15 a 45 minutos.
- La dosis de radiación es baja y comparable a la de otros estudios radiológicos. Las reacciones alérgicas son muy infrecuentes.

Después del estudio

- Puede alimentarse y retomar sus actividades, salvo otra indicación.
- Beba abundante líquido y orine con frecuencia para eliminar el trazador. Lávese bien las manos después de ir al baño.
- Durante las primeras 24 horas evite el contacto cercano y prolongado con embarazadas y niños pequeños.
- Lactancia: el equipo le indicará si debe suspenderla por un tiempo (en general entre 12 y 24 horas) y cómo proceder.

Avise al personal si presenta

- Picazón, erupción en la piel, hinchazón de cara o labios, o falta de aire.

Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela · Teléfono: 1953 / 08001953 · Correo: atencionalusuario@hc.edu.uy
Material informativo para pacientes. No reemplaza la indicación de su equipo de salud: ante dudas o síntomas de alarma, consulte.