HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

Plan de alta enfermería, Nefrología

Información para pacientes · Nefrología y Trasplante

Guía general para continuar su cuidado en casa luego del alta. Su equipo le indicará el plan específico para su caso: sígalo siempre por encima de este documento.

Medicación

- Tome cada medicamento en la dosis y el horario indicados. Un pastillero ayuda a organizarse.
- No suspenda ni agregue medicamentos sin consultar, incluidos antiinflamatorios (ibuprofeno, diclofenaco) y productos naturistas: algunos dañan el riñón.
- Renueve las recetas con tiempo y lleve siempre su lista de medicamentos.

Alimentación y líquidos

- Siga la dieta indicada por su nutricionista; en general se controla la sal, el potasio, el fósforo y las proteínas según su caso.
- Respete la cantidad de líquidos indicada. Evite embutidos y alimentos procesados, y no use sustitutos de la sal (contienen potasio) salvo indicación.

Controles en casa

- Pésese cada mañana, en ayunas y después de orinar, con ropa similar. Anote el valor.
- Controle y registre su presión arterial y, si tiene diabetes, la glucemia, según le hayan indicado.
- Concurra a todos los controles y análisis programados y lleve sus registros.

Cuidado de la fístula o del catéter

- Fístula: palpe todos los días la vibración (thrill). No permita tomar la presión ni extraer sangre en ese brazo y evite ropa ajustada, cargar peso o dormir sobre él.
- Catéter: mantenga el apósito limpio y seco, no lo moje ni lo manipule. Lávese las manos antes de tocar la zona.

Consulte de urgencia si presenta

- Fiebre o escalofríos; enrojecimiento, dolor o secreción en el acceso; falta de la vibración de la fístula (consulte el mismo día).
- Disminución marcada de la orina, hinchazón de piernas, cara o abdomen, o aumento rápido de peso (más de 1 kg en un día o 2 kg en dos días).
- Falta de aire, náuseas o vómitos persistentes, debilidad intensa o calambres, presión muy alta o muy baja.