HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

Prostatectomía radical

Información para pacientes · Urología

La prostatectomía radical es la cirugía que extirpa la próstata y las vesículas seminales; se indica generalmente por cáncer de próstata. Esta guía resume los cuidados antes y después de la operación.

Antes de la cirugía

- Informe todos los medicamentos que toma, en especial anticoagulantes o antiagregantes (warfarina, aspirina, clopidogrel). No los suspenda sin indicación médica.
- Cumpla el ayuno indicado por anestesia (habitualmente 8 horas, incluidos líquidos).
- Realice la preparación intestinal y la higiene que le indique el equipo.
- Concurra con los estudios previos, el carné de asistencia y un acompañante.
- Si fuma, procure dejar de hacerlo y evite el alcohol antes de la cirugía.

Después de la cirugía

- Tendrá una sonda vesical, habitualmente entre 7 y 14 días. Mantenga la bolsa por debajo de la vejiga, no tire de la sonda y vacíe la bolsa con regularidad.
- Camine apenas se lo indique el equipo: ayuda a prevenir trombosis y acelera la recuperación.
- Evite esfuerzos y no levante peso (más de 4 o 5 kg) durante 4 a 6 semanas. No conduzca mientras tome analgésicos fuertes.
- Mantenga la herida limpia y seca. Realice los ejercicios de piso pélvico (Kegel) que le enseñe el equipo para recuperar el control de la orina.
- Es frecuente la pérdida de orina transitoria. La función sexual puede verse afectada y existen tratamientos de rehabilitación: consulte con su urólogo.
- Concurra a los controles con PSA según lo indique su urólogo.

Consulte de urgencia si presenta

- Fiebre mayor a 38 °C o escalofríos.
- Sangrado abundante o coágulos, o falta de salida de orina por la sonda.
- Dolor intenso, o enrojecimiento, calor o secreción en la herida.
- Dolor, hinchazón o enrojecimiento en una pierna, dolor en el pecho o falta de aire.