



Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional

BANCO DE PREGUNTAS



carrera de
ENFERMERÍA

2023

1era Convocatoria

BANCO DE PREGUNTAS CARRERA DE ENFERMERIA

JUNIO 2023

De conformidad con el "Acuerdo de Confidencialidad, No Divulgación de la Información y Consentimiento Informado" que usted suscribió al momento de inscribirse para rendir el presente examen, se le recuerda que sus obligaciones dentro de este proceso son:

- "1. Guardar la reserva y confidencialidad, de cualquier tipo de información del CACES que se le suministre o a la cual llegará a tener acceso o conocimiento, respecto al EHEP. Por lo tanto, se obliga a abstenerse de usar, disponer, divulgar y/o publicar por cualquier medio, oral, escrito, y/o tecnológico y en general, para beneficio propio o de terceros con fines ajenos y no autorizados por el CACES, y de las autoridades judiciales competentes.
2. Utilizar la información suministrada por el CACES, únicamente para los fines de este Acuerdo.
3. No realizar copia o duplicado, fotografías por cualquier medio tecnológico, digital de la información mencionada en este acuerdo sin la autorización previa y escrita de la otra parte; tampoco podrá divulgarla a terceras personas, sin la autorización expresa y por escrito por parte del CACES. Se excluye de esta obligación la información, que sea de dominio público o que sea del conocimiento y autorización previa del CACES, sin constituir discreción de la información en los términos del presente acuerdo y, cuya revelación no cause agravio o perjuicio alguno a su titular." (Acuerdo de Confidencialidad, No Divulgación de la Información y Consentimiento Informado, 2023)."

Relacione los tipos de familia con sus características:

Tipos de familia	Características
1. Familia extensa	a. Familia con dos adultos cónyuges que ejercen el rol de padres y viven con sus respectivos hijos.
2. Familia ampliada	b. Grupo de arreglos de convivencia entre personas al margen de la relación de cónyuges en los que los miembros cumplen el criterio básico del compromiso, el cuidado y protección económico-afectiva.
3. Familia corporativa	c. Aquella en la que conviven más de dos generaciones, es decir viven desde abuelos hasta nietos.
4. Personas sin familia	d. Cualquier forma de familia que vive con miembros adicionales con lazos de consanguinidad lejanos (amigos, tíos, primos etc.)
5. Familia nuclear	e. Adultos solteros que viven solos, divorciados o viudos, ancianos que viven solos.

Respuestas:

- 1c, 2d, 3b, 4e, 5a.
- 1d, 2b, 3e, 4a, 5c.
- 1a, 2e, 3b, 4d, 5c.
- 1b, 2c, 3a, 4e, 5d.

Según la política de frasco abierto, luego de haber sido reconstituidas las vacunas SRP multidosis, SR, BCG y Antiamarílica. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendable de uso?

Respuestas:

- 6 horas y descartar.
- 8 horas y descartar.
- 2 horas y descartar.
- 12 horas y descartar.



¿Cuál es el esquema de administración correcto para la suplementación con hierro más ácido fólico a embarazadas y madres lactantes?

Respuestas:

- **Una tableta diaria 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.**
- Una tableta diaria inmediatamente después de las comidas.
- Una tableta diaria de lunes a viernes de preferencia con jugos cítricos.
- Una tableta diaria junto con las comidas con un vaso de agua pura o jugo.

Elija la opción correcta con relación a la siguiente afirmación. Placenta previa marginal o no oclusiva es aquella que:

Respuestas:

- **No ocupa el orificio cervical interno (OCI) y se ubica próximo a el.**
- Ocupa parcialmente el orificio cervical interno (OCI).
- Ocupa el orificio cervical interno (OCI) en su totalidad.
- Está localizada correctamente en el útero.

¿Cuál es el esquema de administración correcto para la suplementación con megadosis de Vitamina A?

Respuestas:

- **100 000UI a niños de 6 a 12 meses y 200 000UI a mayores de 12 meses cada 6 meses.**
- 100 000UI a menores de 6 meses y 200 000UI a mayores de un año cada 6 meses.
- 100 000UI a menores de un año y 200 000UI a mayores de un año cada 4 meses.
- 100 000UI a niños de 6 a 12 meses y 200 000UI a niños mayores de 12 meses cada 4 meses.

Las teorías sobre administración permiten identificar de donde provienen las ideas acerca de las organizaciones y la gente que las integra. De las siguientes opciones todas se refieren a teorías de la administración, EXCEPTO:

Respuestas:

- **Socialista.**
- Científica.
- Clásica.
- De las relaciones humanas.



Niño con dificultad respiratoria y con tos perruna. ¿Con qué condición se encuentran asociados estos signos?

Respuestas:

- **Crup.**
- Fibrosis quística.
- Asma.
- Epiglotitis.

Relacione las alteraciones en el nivel de conciencia con sus definiciones.

Alteraciones del nivel de conciencia	Definiciones
1. Confundido	a. Estado de somnolencia profundo y prolongado, procesos de pensamiento enlentecidos.
2. Letárgico	b. Estado patológico que se caracteriza por la pérdida de la conciencia, la sensibilidad y la motricidad.
3. Obnubilado	c. Desorientado temporal, espacial y persona con dificultad para seguir órdenes.
4. Estuporoso	d. Alteración en la que disminuye el nivel de conciencia, lentitud psicomotora, despierta con estímulos persistentes.
5. Coma	e. Solo despierta ante estímulos dolorosos, con localización adecuada del mismo y respuesta verbal incomprensible.

Respuestas:

- **1c, 2a, 3d, 4e, 5b.**
- 1a, 2b, 3c, 4d, 5e.
- 1b, 2e, 3a, 4c, 5d.
- 1e, 2c, 3b, 4a, 5d.

La compresión de la vena cava dada por el aumento de tamaño del útero y su contenido produce cambios en el sistema cardiovascular produciendo la reducción del volumen sanguíneo que llega al corazón. ¿Qué signos se producen en el embarazo, secundarios al efecto antes mencionado?

Respuestas:

- **Taquicardia, Síndrome supino hipotenso.**

- Taquicardia, Acidosis respiratoria.

- Gasto cardíaco normal, Acidosis respiratoria.

- Gasto cardíaco normal, Síndrome supino hipotenso.

En el control prenatal se incluyen actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido/a. Usted como parte del personal de enfermería debe conocer los enfoques del control prenatal. ¿Cuáles son?

1. **Completo e integral.**
2. **Precoz y con enfoque intercultural.**
3. **Presuntivo y selectivo.**
4. **Periódico y afectivo.**
5. **Evaluación y rehabilitación.**

Respuestas:

- **1, 2, 4**

- 1, 2, 3

- 2, 3, 4

- 3, 4, 5



Relacione los factores de riesgo socio económico y ambiental que afecta a la salud de la familia:

Riesgo	Factores
1. Riesgo ambiental 2. Riesgo Socio-económico	a. Hacinamiento b. Contaminación del agua c. Rechazo a la lactancia d. Baja escolaridad

Respuestas:

- **1bd, 2ac.**

- 1bc, 2ad.
- 1ab, 2cd.
- 1ad, 2bc.

Ingresa al centro de salud un niño de 2 años con piel pálida, taquicardia, mucosas orales secas, turgencia de la piel disminuida, madre refiere que ha disminuido la eliminación de orina. ¿Cuál es el grado de deshidratación del niño?

Respuestas:

- **Leve.**

- Moderado.
- Grave.
- Agudo.

La valoración de Ballard es una herramienta para determinar la edad gestacional del neonato. Seleccione los signos de madurez física:

1. Ventana cuadrada, talón a oreja, extensión del brazo.
2. Ojos y orejas, genitales masculinos, genitales femeninos.
3. Ángulo poplíteo, talón a oreja, postura.
4. Piel, lanugo, mamas, superficie plantar.

Respuestas:

- **2, 4**

- 1, 2
- 3, 4
- 1, 3

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Al nacimiento del recién nacido se producen adaptaciones de los diferentes sistemas orgánicos. Seleccione los cambios en el sistema cardiovascular que ayudan a la transición desde la circulación fetal a la posnatal:

1. Cierre del foramen oval.
2. Persistencia del conducto arterioso.
3. Cierre del conducto venoso.
4. Descenso del volumen sanguíneo.
5. Cierre del conducto arterioso.

Respuestas:

- 1, 3, 5
- 2, 3, 5
- 1, 2, 4
- 1, 4, 5

Niño asmático que ha estado ingresado en la unidad de pediatría por una crisis. ¿Qué recomendación debe dar el profesional enfermero al ser dado de alta el paciente?

Respuestas:

- **Identificar los factores que pueden desencadenar la crisis.**
- Disminuir la cantidad de líquidos, para disminuir las secreciones.
- Disminuir los carbohidratos de la dieta diaria.
- Vacunarse para la prevención de la crisis asmática.

Las recomendaciones sobre el baño del recién nacido son. EXCEPTO:

Respuestas:

- **El baño inmediato del RN y en caso de fetidez o sospecha de amniotitis, realizar una higiene con jabón.**
- El baño de todo el cuerpo se considerará posterior a las 12 horas después del nacimiento o si la madre lo solicitare.
- Puede limpiarse al RN en caso de estar cubierto de sangre con un algodón impregnado con agua estéril y un jabón neutro no antiséptico.
- No quitar el vernix de la piel, ya que este y el líquido amniótico protegen al RN contra la invasión bacteriana al nacimiento.



Las áreas en el cuidado físico del recién nacido son. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Estimulación para el desarrollo de la motricidad gruesa.**

- Protección de infecciones y lesiones.
- Mantenimiento de una vía aérea permeable.
- Mantenimiento de una temperatura corporal estable.

¿Qué es el reflejo de moro?

Respuestas:

- **Cuando el RN es levantado y se lo deja caer súbitamente, los brazos y piernas se extienden en forma simétrica, luego se abducen, mientras el pulgar y el dedo índice forman una C.**

- Cuando se gira la cabeza del recién nacido, mientras se encuentra en posición supina, las extremidades del mismo lado se extienden fuertemente y las del lado opuesto se flexionan.
- Cuando un ruido fuerte, como aplauso o caída de un objeto, suscita en el recién nacido la abducción de los brazos, la flexión de los codos y las manos permanecen apretadas.
- Cuando se desliza un dedo lateralmente hacia abajo y arriba por la columna del recién nacido, el tronco se flexiona hacia adelante y la pelvis se balancea hacia el lado estimulado.

El profesional de enfermería en la aplicación del proceso realiza actividades independientes. ¿Cuáles son los cuidados más importantes en un niño con neumonía?

1. Posición de decúbito con la cabecera de la cama elevada.
2. Monitorización de signos vitales, especialmente la respiración.
3. Iniciar alimentación lo más temprano.
4. Aspiración de secreciones nasofaríngeas.
5. Administrar antibióticos y analgésicos.

Respuestas:

- **1, 2, 4**
- 2, 3, 4
- 1, 3, 5
- 1, 3, 4

La mortalidad del recién nacido prematuro tardío (34 a 36 semanas 6 días) es más alta en comparación a los otros recién nacidos prematuros y tienen mayor riesgo de presentar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en esta etapa?

1. Taquipnea transitoria.
2. Síndrome de dificultad respiratoria.
3. Hipertensión pulmonar persistente.
4. Ictericia.
5. Inestabilidad térmica.
6. Estancia prolongada.
7. Sepsis.
8. Poliglobulia.

Respuestas:

- 2, 4, 5, 8
- 3, 6, 7, 8
- 1, 2, 3, 5
- 4, 5, 6, 7



La leche materna es un fluido dinámico, que se adapta las necesidades del niño y a su velocidad de crecimiento, por lo tanto, es el alimento ideal para la especie humana y tiene diferencias significativas con la leche de vaca y la leche artificial. Relacione las características y el tipo de leche al que pertenecen:

Características	Tipo de leche
1. Libre de contaminantes bacterianos, tiene factores anti-infecciosos y de crecimiento, lacto-albumina como proteína predominante que es de fácil digestión, ácidos grasos esenciales y lipasa para la digestión, el hierro está en forma ferrosa y en pequeña cantidad, vitaminas y agua en proporción adecuada.	a. Leche de vaca
2. Probables contaminantes bacterianos, sin factores anti-infecciosos ni de crecimiento, escasos ácidos grasos esenciales, la proteína dominante es la caseína de difícil digestión, sin lipasa, y con hierro en pequeña cantidad en forma férrica, insuficiente cantidad de vitamina A, C y agua.	b. Leche materna
3. Libre contaminantes bacterianos, sin factores anti-infecciosos ni de crecimiento, tiene proteínas parcialmente corregidas, faltan ácidos grasos esenciales, no tiene lipasa, tiene hierro añadido que no se absorbe bien, vitaminas añadidas y requiere agua extra.	c. Leche artificial

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Respuestas:

- 1b, 2a, 3c.

- 1a, 2b, 3c.
- 1b, 2c, 3a.
- 1c, 2b, 3a.

Existen varios test para la determinación de la edad gestacional de un recién nacido. EXCEPTO:

Respuestas:

- Test de Silverman-Andersen.

- Test de Capurro Somático y Somato-Neurológico.
- Test de maduración Neuromuscular de Ballard.
- Test de Farr y Dubowitz.

La morbi-mortalidad neonatal es un problema epidemiológico de gran magnitud en el Ecuador y en toda América, para prevenirlas se han diseñado protocolos basados en evidencia. ¿Cuáles son las intervenciones que previenen el nacimiento de RN prematuros y mejoran su supervivencia?

Respuestas:

- Uso de corticoides antenatales y uso de tocolíticos en el trabajo de parto prematuro.

- Suplementación a la madre con ácido fólico y tratamiento de anemia con hierro.
- Detección y tratamiento de las ITS y de la infección por estreptococo del grupo B.
- Uso de aspirina en la prevención de preeclampsia y eclampsia.

Un recién nacido tiene 20 horas de vida y nació a término con peso adecuado para la edad gestacional. Su grupo sanguíneo es ARH+ y es hijo de una madre ORH+. Al momento se encuentra con ictericia en zona 2 según la escala de Kramer y presenta Bilirrubinas totales de 15mg/dl a expensas de la bilirrubina indirecta. El resto del examen físico del recién nacido es normal. ¿Cuál es la probable complicación del niño?

Respuestas:

- Ictericia por incompatibilidad ABO.

- Ictericia multifactorial.
- Ictericia por incompatibilidad de factor.
- Ictericia fisiológica.



De las siguientes medidas de bioseguridad. ¿Cuál es la más importante en la prevención de las infecciones en las salas de recién nacidos?

Respuestas:

- **Lavado de manos hasta los codos.**

- Lavado quirúrgico de manos.
- Uso de bata y mascarilla.
- Uso de gorro y botas.

Usted debe preparar 150 ml de dextrosa en agua al 12.5% para un recién nacido con hipoglicemia recurrente. Su servicio dispone de dextrosas al 10% y 50%. ¿Qué cantidad pone de cada dextrosa en el microgotero para cumplir la prescripción, con base en los datos señalados ?

Respuestas:

- **140.62 ml de dextrosa al 10% y 9.37 ml de dextrosa al 50%**

- 140.62 ml de dextrosa al 50% y 9.37 ml de dextrosa al 10%
- 130 ml de dextrosa al 10% y 20 ml de dextrosa al 50%
- 110 ml de dextrosa al 10% y 40 ml de dextrosa al 50%

¿Cuál de los siguientes métodos sirve para realizar la verificación en la colocación de la sonda naso-gástrica en un paciente adulto con distensión abdominal?

Respuestas:

- **Introducir de 10 a 30 ml de aire por la sonda y auscultar en epigastrio.**

- Usar un oxímetro para comprobar si existe obstrucción de vía aérea.
- Medición del pH del líquido extraído por la sonda nasogástrica.
- Medir la cantidad de sonda que quedó sobrante desde la fosa nasal.

La función administrativa de organizar conduce necesariamente a la creación de la estructura organizacional, la misma que está caracterizada por niveles jerárquicos o espacios departamentales. Las siguientes son acciones que le corresponden realizar al responsable de este proceso en un servicio de salud, EXCEPTO:

Respuestas:

- **Realizar el control en función del departamento.**

- Establecer utilización adecuada de recursos.
- Definir el sistema de comunicación institucional.
- Mantener la línea de autoridad en unidad de mando.

El profesional enfermero del dispensario médico de una fábrica que produce madera, debe procesar datos con respecto a la enfermedad por la que los trabajadores decidieron renunciar. ¿Cuál de las medidas de tendencia central debe calcular para conocer la enfermedad más frecuente por la que los trabajadores renuncian?

Respuestas:

- **Moda.**
- Media.
- Varianza.
- Mediana.

El estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención, examinada a la luz de los valores y de los principios morales, en su concepción básica, es ética para la vida. ¿Cuál es la utilidad de la Bioética para el ejercicio de los profesionales de la salud?

Respuestas:

- **Suministra métodos de análisis basados en la argumentación y delibera sobre problemas concretos.**
- Especifica normas, principios y procedimientos del comportamiento profesional.
- Se ocupa de los deberes y de las tareas específicas de las diversas profesiones de salud.
- Especifica normas y principios que protegen desde el punto legal al personal sanitario durante su ejercicio profesional.

Gestante de 28 años, se encuentra en sala de labor de parto con un embarazo de 39 semanas más ruptura prematura de membranas de 24 horas, más labor de parto fase activa; está recibiendo inducción por infusión con una dextrosa en solución salina más 10 unidades internacionales de oxitocina a 16 gotas por minuto (48ml/h). La administración de este fármaco, requiere una valoración sistemática de enfermería. Si a la valoración presenta: hiperdinamia uterina, dolor permanente y progresivo acompañado de sangrado, ansiedad y además se registra bradicardia fetal. Seleccione 3 intervenciones en enfermería inmediatas en este caso:

1. Comunicar urgente al médico.
2. Canalizar otra vía periférica.
3. Suspender inmediatamente la infusión.
4. Administrar un tocolítico.
5. Pedir a la paciente que se coloque decúbito lateral izquierdo.
6. Preparar a la paciente para cesárea.
7. Administrar oxígeno 3 litros por catéter nasal.

Respuestas:

- 3, 5, 7
- 1, 3, 7
- 2, 3, 6
- 4, 5, 7

¿Cuál es la mejor opción para proteger del contagio de la hepatitis B al personal de salud?

Respuestas:

- **Aplicar vacuna anti hepatitis B según el esquema establecido por el M.S.P.**
- Aplicar medidas de asepsia, especialmente el lavado de manos.
- Recibir dosis suficiente de gamaglobulina.
- Utilizar jeringuillas descartables para cada paciente.

Paciente acude al servicio de Medicina Interna por presentar niveles elevados de urea, creatinina con disminución del volumen de orina en 24 horas, el médico indica su ingreso con diagnóstico de Insuficiencia Renal Aguda. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria?

Respuestas:

- **Control del equilibrio hídrico.**
- Dieta hiposódica e hipoproteica.
- Exámenes con medios de contraste.
- Administración de medicamentos.

Paciente de 75 años, ingresa al servicio de Medicina Interna por presentar fiebre, disnea, tos con expectoración y sibilancias, luego de la valoración, usted prepara al paciente para los siguientes exámenes diagnósticos. EXCEPTO:

Respuestas:

- Espirometría.

- Pruebas de laboratorio.
- Rayos X.
- Cultivo de secreción.

El edema agudo de pulmón es la acumulación de líquido en el intersticio y alvéolo pulmonar lo que dificulta el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la causa más común?

Respuestas:

- Insuficiencia Cardíaca Congestiva.

- Hipertensión Arterial.
- Diabetes Mellitus.
- Insuficiencia Renal Crónica.

El tratamiento inicial de pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en estadio moderado, se basa en un plan terapéutico que incluye:

Respuestas:

- Broncodilatadores inhalados y oxígeno suplementario.

- Analgésicos y oxígeno por ventilación no invasiva.
- Anticolinérgicos y oxígeno suplementario.
- Corticoesteroides y oxígeno por ventilación no invasiva.

¿Cuáles son los tres pilares en los cuales se basa el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, para minimizar las complicaciones propias de la enfermedad?

Respuestas:

- Dieta, ejercicio físico y medicación.

- Actividad, alimentación y anticoagulantes.
- Medicación, dieta y antihipertensivos.
- Dieta, ejercicio y analgésicos.

En el plan de egreso de enfermería de un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial. ¿En qué se enfoca la educación sobre su tratamiento farmacológico?

Respuestas:

- Importancia del apego al tratamiento, efectos adversos y control continuo de presión.

- Signos de alarma, posibles complicaciones propias de la patología y plan de interconsultas.
- Dieta hiposódica, modificaciones del estilo de vida como ejercicio y hábitos tóxicos.
- Dosis, farmacocinética y presentación para mejorar estilo de vida.

Una vez que usted ha definido un Plan de acción en un servicio de enfermería, las actividades descritas debe ser llevadas a cabo a través de los siguientes principios de la fase de la organización:

Respuestas:

- División del trabajo, definición de funciones, jerarquización, normas y reglamentos.

- Objetivos, estrategias, aplicación de la matriz FODA, diagrama de Gantt.
- Liderazgo, toma de decisiones, motivación, coordinación de actividades.
- Evaluación de riesgos, monitoreo, evaluación de desviaciones, medidas correctivas.

Identifique los elementos que en una investigación debe contener el consentimiento informado:

1. Firma del consentimiento voluntario.
2. Valoración crítica.
3. Divulgación de la información del estudio.
4. Relación beneficio -riesgo.
5. Comprensión de la información.
6. Revisión institucional.
7. Competencia del participante.
8. Comprensión de la mala práctica.

Respuestas:

- 1, 3, 5, 7

- 1, 2, 4, 5

- 1, 4, 5, 8

- 1, 3, 6, 7



¿Cuál es el síntoma de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que con frecuencia interfiere con las actividades diarias del individuo?

Respuestas:

- **Disnea.**
- Ansiedad.
- Fatiga.
- Debilidad.

La hiperplasia prostática benigna es una de las enfermedades más frecuentes del adulto mayor. ¿Cuál es la característica clínica de esta enfermedad?

Respuestas:

- **Retención urinaria.**
- Dolor testicular.
- Cistitis.
- Hematuria.

Paciente masculino de 52 años se encuentra hospitalizado en el área de medicina interna, presenta los siguientes hallazgos físicos: alateo nasal, taquipnea, tórax en tonel, utilización de músculos accesorios y espiración prolongada. ¿Qué patología presenta el paciente?

Respuestas:

- **Enfisema pulmonar.**
- Tuberculosis.
- Asma.
- Neumonía.

Paciente femenino de 38 años acude al centro de salud para control de peso y talla. Se determina un IMC de 32 kg/m². ¿Cómo clasifica su estado nutricional de acuerdo con la tabla de la Organización Mundial de la Salud?

Respuestas:

- **Obesidad I.**
- Normal.
- Sobrepeso.
- Obesidad II.



¿A cuál de las opciones hace referencia la siguiente definición? “[...] ciencia, conjunto de técnicas y conocimientos que se ocupan del hombre en actividad”.

Respuestas:

- **Ergonomía.**
- Biomecánica.
- Cambios posturales.
- Salud laboral.

A la emergencia llega un paciente con las siguientes manifestaciones clínicas: confusión, palidez, taquicardia, diaforesis, temblores, visión borrosa, debilidad y cefalea. Familiar refiere antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II insulínica hace 4 meses, lo cual le sugiere que al momento de ingreso presenta:

Respuestas:

- **Hipoglucemia.**
- Hiperglucemia.
- Cetoacidosis.
- Síndrome vagal.

Paciente adulto ingresa al servicio de emergencia refiriendo dolor abdominal difuso, malestar general, diarrea persistente, náusea y vómito, los resultados del examen de heces revelan infección por salmonella. Estos signos y síntomas corresponden a la siguiente patología:

Respuestas:

- **Gastroenteritis aguda.**
- Enfermedad de Crohn.
- Apendicitis.
- Colon irritable.

Un paciente con hemorragia subaracnoidea llega a emergencia con las siguientes características: estupor, hemiparesia derecha y rigidez de descerebración temprana. Según la escala de Hunt y Hess. ¿Qué grado de severidad presenta?

Respuestas:

- **Grado IV.**
- Grado III.
- Grado V.
- Grado II.



Paciente de 68 años, permanece en su casa, al cuidado de su esposo, presenta una laceración en zona de la articulación radio cubital proximal con flictenas, lo cual ocasiona dificultad para manipular objetos. ¿Cuál es el patrón funcional alterado?

Respuestas:

- **Patrón nutricional metabólico.**

- Patrón tolerancia al estrés.
- Patrón actividad y ejercicio.
- Patrón Rol-relaciones.

Paciente cursa embarazo de 5 semanas de gestación, es primigesta y está preocupada sobre el desarrollo y crecimiento de su hijo, solicita al profesional de enfermería información sobre los cuidados que debe tener en este período de gestación. Ordene la educación sanitaria que se debe impartir a la gestante desde la más importante para evitar riesgos en la madre y el niño:

1. Indumentaria.
2. Alimentación y nutrición.
3. Medicamentos y drogas.
4. Higiene.

Respuestas:

- **3, 2, 4, 1**

- 1, 2, 3, 4
- 2, 3, 1, 4
- 4, 2, 1, 3

¿A cuál de las opciones corresponde la siguiente definición? "Pérdida de calor corporal mediante el contacto no directo con un objeto muy frío".

Respuestas:

- **Radiación.**

- Evaporación.
- Conducción.
- Convección.



Seleccione las características de la Epidemiología Comunitaria:

1. Es una herramienta de uso popular.
2. Concibe a la comunidad solamente como un lugar delimitado geográfica y demográficamente.
3. No excluye el uso de la tecnología informática y de las telecomunicaciones.
4. Concibe a la comunidad como un conjunto de personas que comparten un interés común.
5. Los datos epidemiológicos tienen un camino unidireccional.
6. Da mucha importancia al papel de la comunidad en el campo de la investigación.

Respuestas:

- **1, 3, 4, 6**

- 1, 2, 5, 6

- 2, 3, 5, 6

- 3, 4, 5, 6

Las siguientes son complicaciones del tercer trimestre del embarazo. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Preeclampsia leve.**

- Amenaza de aborto.

- Embarazo ectópico.

- Enfermedad del trofoblasto.

De acuerdo con el Manual de atención integral en salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad del MSP del Ecuador, los siguientes puntos respaldan los derechos sexuales y reproductivos de una persona con discapacidad. EXCEPTO:

Respuestas:

- Aunque una persona con discapacidad pueda tomar decisiones, se requiere la presencia de un familiar o representante legal para recibir información o una prestación sobre salud sexual y reproductiva, de manera que la atención tenga respaldo jurídico.

- Desmitificar la idea de que las personas con discapacidad intelectual tienen manifestaciones sexuales impulsivas, no controladas y muy peligrosas para sí mismas o para quienes le rodean. Esta singularidad debe trabajarse, no desde la represión, sino desde el autocuidado.

- Si el personal médico tiene dudas respecto a la toma de decisiones autónomas de una persona con discapacidad, se requiere una evaluación por parte de un equipo multidisciplinario. Se asume como prioritario el criterio de la persona con discapacidad.

- Se sugiere generar un comité de ética asistencial, que no es vinculante, pero que puede dar recomendaciones sobre esterilización. En caso de sospecha de violencia sexual se debe presentar la denuncia a la Fiscalía.

En la dispensarización para el seguimiento y diagnósticos de la familia utilizados en la ficha familiar. ¿A qué tipo de criterio corresponde cuando nos referimos a las personas que padecen alguna condición que implica una alteración temporal o definitiva de sus capacidades motoras, funcionales, sensoriales o psíquicas?

Respuestas:

- Grupo IV, con secuelas o discapacidad.

- Grupo I, aparentemente sano.

- GRUPO II, con factores de riesgo.

- Grupo III; con patologías crónicas.

De acuerdo con el Art. 146 del COIP que se refiere al homicidio culposo por mala práctica profesional. ¿Cuántos años es la pena privativa de la libertad?

Respuestas:

- 1 a 3 años.

- 1 a 2 años.

- 3 a 5 años.

- 5 a 8 años.

¿A qué se refiere el enfoque de participación y ciudadanía en salud, con relación a los derechos sexuales y reproductivos?

Respuestas:

- Las personas asumen la responsabilidad de su salud como sujetos de derecho, ya que sin su participación no es posible generar condiciones saludables. Son ellos, quienes deben conocer, acordar, ejecutar y evaluar conjuntamente con el equipo de salud las intervenciones del modelo de atención.

- La salud como un derecho garantizado solamente por el Estado, está vinculada a múltiples factores sociales, económicos, políticos y culturales que determinan la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo sustentable de mujeres y hombres que habitan en el Ecuador.

- El ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos pertenece a cada individuo, a lo largo del ciclo vital, y no debe ser afectado por las inequidades económicas, de género, sociales y étnica.

- Las personas en el Ecuador, tienen derecho de elegir la cantidad de hijos que desean tener, derecho a elegir sus métodos anticonceptivos y de esta manera planificar.

Las entrevistas colectivas ayudan a recolectar datos sobre un tema investigado. ¿Cómo se denomina esta técnica?

Respuestas:

- **Grupos de enfoque.**

- Entrevistas.

- Escalas de actitudes.

- Cuestionarios.

Complete el enunciado:

La _____ es un procedimiento invasivo que consiste en la punción y extracción del líquido sinovial _____ con intención _____ o _____

Respuestas:

- **Artrocentesis - del espacio articular - diagnóstica - terapéutica.**

- Artrodesis - de la articulación – diagnóstica - terapéutica.

- Artroscopia - del espacio articular – terapéutica – rehabilitación.

- Artrotomía – de la articulación - diagnóstica - rehabilitación.



Complete el enunciado:

La prioridad de los cuidados pos-anestésicos es vigilar la función _____ que se altera por la acción de los _____ utilizados durante la cirugía, que pueden llevar al paciente a la _____.

Respuestas:

- **Respiratoria – anestésicos - hipoventilación.**

- Cardiovascular – anestésicos – inconciencia.
- Neurológica – anestésicos - hipoventilación.
- Renal – anestésicos – insuficiencia renal.

Seleccione la opción de respuesta que complete el siguiente enunciado:

La producción de la hormona _____ se da en la glándula _____, la cual interviene en la eyección de la leche materna.

Respuestas:

- **Oxitocina, neurohipófisis.**

- Progesterona, hipófisis.
- Prolactina, mamaria.
- Estrógeno, cuerpo lúteo.

Seleccione los indicadores fisiológicos que componen el Score MAMÁ:

1. Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, nivel de conciencia, temperatura.
2. Presión arterial media, oximetría, temperatura corporal, saturación de oxígeno.
3. Presión arterial diastólica, nivel de conciencia, hematocrito, frecuencia cardíaca.
4. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, proteinuria, frecuencia cardíaca.
5. Frecuencia respiratoria, urea, creatinina, proteinuria, presión arterial sistólica.

Respuestas:

- **1, 4**

- 2, 3

- 4, 5

- 1, 3

De acuerdo con la escala de Aldrete modificada, seleccione los indicadores para el alta de un paciente en la unidad de cuidados pos-anestésicos.

Respuestas:

- Mueve 4 extremidades, capacidad de respirar profundo y toser, presión arterial con variación del 20% de la cifra preanestésica, despierta al llamado, Sat O₂ > 92% al ambiente.

- Mueve 4 extremidades, limitación en la respiración, presión arterial con variación del 25% de la cifra preanestésica, despierta al llamado, Sat O₂ > 90% con oxígeno.

- Mueve 4 extremidades, limitación de la respiración, presión arterial con variación del 40% de la cifra preanestésica, despierta al ser llamado, Sat O₂ > 92% con oxígeno.

- Mueve 4 extremidades, limitación de la respiración, presión arterial con variación del 30% de la cifra preanestésica, despierta al llamado, Sat O₂ > 90% con oxígeno.

Paciente con diagnóstico de Cetoacidosis Diabética. Al realizar la valoración de enfermería, usted observa una respiración rápida, profunda y laboriosa. ¿Cuál de los siguientes patrones respiratorios es el descrito en este caso?

Respuestas:

- Respiración de Kussmaul.

- Respiración de Cheyne-Stokes.

- Respiración de Biot.

- Respiración Eupnéica.

Relacione los tipos de cianosis con sus características:

Riesgo	Factores
1. Central	a. No se observa a nivel bucal ni de mucosas.
2. Periférica	b. La sangre que sale del corazón es de color azul debido a un trastorno en la saturación arterial de oxígeno.
	c. Se observa una coloración azulada y violácea en la piel, labios, mucosas y lecho ungueal.
	d. La coloración azulada y violácea característica se encuentra en la piel de manos y pies y en los lechos ungueales. La piel suele estar fría y húmeda.

Respuestas:

- 1bc, 2ad.
- 1ac, 2bd.
- 1ab, 2cd.
- 1cd, 2ab.

¿Cuál de los siguientes cuidados debe incluir el período postoperatorio mediato de una sustitución total de cadera?

Respuestas:

- **Mientras permanece sentado mantener las rodillas separadas y por debajo del nivel de las caderas, no cruzar las piernas.**
- Mientras permanece sentado colocar los pies en un cojín para conservar las caderas a menor altura que las rodillas y poder cruzar las piernas.
- Puede flexionar la cadera para colocarse los pantalones, calcetines o zapatos, o mientras está sentado en una silla.
- Puede utilizar una silla o inodoro bajos si esto le proporciona mayor comodidad para poder satisfacer sus necesidades.



Complete el enunciado:

La _____, se define como un volumen urinario menor de _____. Entre las posibles etiologías de este problema se encuentran: Insuficiencia renal aguda o crónica, _____.

Respuestas:

- **Oliguria - 500 ml/día - ingestión inadecuada de líquidos.**
- Anuria - 500 ml/día - obstrucción completa.
- Anuria - 50 ml/día - infección.
- Oliguria - 50 ml/día - lesión obstétrica.

Paciente de 64 años, con antecedentes de litiasis vesicular no operada. Consulta por cuadro de ictericia desde hace 3 meses. ¿Cuál de los exámenes diagnósticos del sistema digestivo está indicado?

Respuestas:

- **Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).**
- Laparoscopia.
- Tomografía computarizada (TC).
- Esofagogastroduodenoscopia (EGD).

Los siguientes son fármacos que alteran las pruebas de función tiroidea. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Antidepresivos.**
- Estrógenos.
- Corticoesteroides.
- Opioides.



Como profesional del equipo de trasplante de órganos, usted recibe un donante, que tras haber sufrido un accidente automovilístico, ingresa al servicio de emergencia con diagnóstico de muerte cerebral. ¿Cuál es la clasificación que le corresponde a este paciente según la Escala de Riesgo Anestésico (ASA)?

Respuestas:

- **ASA 6**
- ASA 5
- ASA 4
- ASA 3

Calcule el gasto cardíaco de un adulto en reposo que tiene una frecuencia cardíaca (FC) de 70 latidos por minuto.

Respuestas:

- **4.9 L/min.**
- 5.4 L/min.
- 4.2 L/min.
- 5.7 L/min.

Al realizar el chequeo de la Lista de Verificación de la Seguridad Quirúrgica. ¿Cuál de las acciones constituye un paso esencial en la fase de pausa quirúrgica?

Respuestas:

- **Comprobar si pueden visualizarse las imágenes diagnósticas.**
- Verificar si existe una vía aérea difícil y riesgo de aspiración.
- Comprobación de la seguridad anestésica a través de la inspección del instrumental.
- Los aspectos críticos de la recuperación del paciente post operatorio.



Entre los cuidados transoperatorios, el profesional enfermero circulante debe colaborar en la colocación del paciente en la posición correcta en la mesa quirúrgica según el tipo de intervención. ¿Qué posición utiliza previa una resección del colon sigmoideo?

Respuestas:

- **Trendelenburg.**

- Trendelenburg invertida.
- Decúbito lateral de Sims.
- Decúbito ventral.

La aspiración de secreciones por traqueostomía es un procedimiento básico del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos mayores con patologías respiratorias. ¿Cuál es la primera actividad que debe realizar de acuerdo a prioridad?

Respuestas:

- **Explorar los ruidos pulmonares del paciente y la saturación de oxígeno mediante oxímetro de pulso.**

- Ventilar al paciente con la bolsa manual de reanimación y flujo alto de oxígeno por 30 s aproximadamente.
- Aplicar aspiración en tanto se retira y gira en forma cuidadosa el catéter 360 grados (no más de 10 a 15 s).
- Observar cantidad, color, olor y consistencia de las secreciones aspiradas para registrarlas en la historia clínica.

Son derechos humanos universales la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todas las personas, están relacionados entre sí y coexisten en la vida de los seres humanos en sus cuerpos y mentes. ¿A qué enfoque corresponde?

Respuestas:

- **Enfoque de derechos sexuales y reproductivos.**

- Enfoque de igualdad.
- Enfoque de género.
- Enfoque de sexualidad integral.



El profesional enfermero debe realizar en su actividad administrativa el cálculo de materiales y equipos que debe utilizar en la aplicación de procedimientos de enfermería en el área hospitalaria. ¿Qué factores influyen en la dotación efectiva de materiales y equipos?

Respuestas:

- **Curva estándar de consumo, porcentaje de ocupación, frecuencia de tratamientos.**

- Actividades, estrategias, diagnóstico situacional, planificación de consumos.
- Liderazgo, toma de decisiones, motivación continua, coordinación de actividades.
- Programación de necesidades, selección de insumos, almacenamiento y distribución.

Seleccione las finalidades del diagnóstico de la situación inicial de salud:

1. Caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población.
2. Identificar la magnitud y distribución de los problemas de salud y sus determinantes.
3. Facilitar la identificación de necesidades y prioridades en salud.
4. Desarrollar la capacidad de negociación con otros sectores y la comunidad.
5. Elaborar y monitorear el cumplimiento de indicadores.
6. Permitir observar la heterogeneidad de la población.

Respuestas:

- **1, 3, 4, 6**

- 1, 2, 3, 5

- 2, 3, 5, 6

- 2, 3, 4, 5

Con relación al procedimiento de ventilación de rescate para adultos; en una situación en la que: la víctima no responde, tiene pulso, pero no respira. Con este antecedente, complete el siguiente enunciado.

Realice _____ cada _____. Cada ventilación debe durar aproximadamente 1 segundo, en la que el tórax debe elevarse visiblemente. Compruebe el pulso cada _____.

Respuestas:

- **1 ventilación - 5 a 6 segundos - 2 minutos.**

- 2 ventilaciones - 7 a 8 segundos - minuto.

- 1 ventilación - 3 a 5 segundos - 2 minutos.

- 2 ventilaciones - 8 a 10 segundos - minuto.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

@CACES.EC

@CACES_EC

/CACES_EC

Paciente diagnosticado con tuberculosis vive con hijo de 4 años. Seleccione las acciones que debe aplicar para realizar el estudio de contactos.

1. Evaluar los contactos antes de las 24 horas de iniciado el tratamiento.
2. Realizar examen y control dentro del primer mes de haber iniciado el tratamiento.
3. Identificar signos, síntomas y lesiones radiológicas.
4. Informar la limpieza de las áreas de la vivienda donde se encuentra el paciente.
5. Realizar prueba de PCR en tiempo real, cultivo y PSD en la misma muestra.
6. Priorizar los cuidados a las personas sintomáticas respiratorias.
7. Recomendar no iniciar tratamiento preventivo con Isoniacida.

Respuestas:

- 2, 3, 5, 6

- 1, 2, 4, 7

- 1, 3, 6, 2

- 2, 4, 6, 7

En el área de influencia de un centro de salud se presentan casos de sarampión. ¿Cuál es el paso de investigación epidemiológica que considera los aspectos administrativos, logísticos y operativos?

Respuestas:

- Organizar el trabajo de campo.

- Establecer una definición operacional de caso.

- Realizar búsqueda activa de casos.

- Confirmar la ocurrencia de un brote.

El profesional enfermero ha realizado una investigación cuantitativa en la cual debe probar la hipótesis mediante pruebas estadísticas. ¿A cuál de las siguientes opciones corresponde la prueba que sirve para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable?

Respuestas:

- Prueba t.

- ANOVA.

- Regresión lineal.

- Correlación de Pearson.



Los siguientes enunciados tienen relación con el recién nacido prematuro, EXCEPTO:

Respuestas:

- **La termorregulación es eficaz, por el exceso de grasa subcutánea.**
- La evaluación es a través del test de Apgar.
- El masaje cardiaco se realiza cuando existe frecuencia cardiaca inferior de 80 latidos por minuto.
- El peso es un indicador para determinar la viabilidad del neonato.

Con relación a los atributos de la vigilancia epidemiológica. ¿Cuál se refiere a la rapidez con la cual se obtiene, analiza y reporta la información?

Respuestas:

- **Oportunidad.**
- Sensibilidad.
- Simplicidad.
- Flexibilidad.



Relacione la vacuna con su respectivo esquema de vacunación:

Vacunas	Esquema de vacunación
1. SRP	a. 2 meses - 4 meses - 6 meses
2. Rotavirus	b. Recién nacido
3. Pentavalente	c. 12 meses - 18 meses
4. Varicela	d. 2 meses - 4 meses
5. HB Pediátrica	e. 15 meses

Respuestas:

- **1c, 2d, 3a, 4e, 5b.**
- 1a, 2c, 3d, 4e, 5b.
- 1b, 2a, 3c, 4d, 5e.
- 1e, 2b, 3d, 4a, 5c.

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a los cambios relacionados con el envejecimiento?

Respuestas:

- **Disminución de la grasa subcutánea, del líquido intersticial y de los receptores sensoriales.**
- Aumento del gasto cardiaco y disminución de la tensión arterial.
- Aumento de la sensación de sed, aumento de la salivación y vaciamiento gástrico acelerado.
- Las mujeres presentan un ensanchamiento vaginal con aumento de las secreciones vaginales.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

En la valoración de mama de una paciente de 13 años se observa elevación del pezón y aumento de la areola. ¿A qué estadio de Tanner corresponde?

Respuestas:

- **Estadio 2**
- Estadio 3
- Estadio 4
- Estadio 5

¿Cuál es el método de esterilización que utiliza un autoclave?

Respuestas:

- **Calor húmedo.**
- Radiación.
- Gas.
- Óxido de etileno.



Relacione los 5 momentos del lavado de manos con su fundamento científico:

Momentos del lavado de manos	Fundamento científico
1. Antes del contacto directo con el paciente.	a. Para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies / objetos de entorno inmediato y para proteger el entorno sanitario.
2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica.	b. Para proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación y la potencial propagación.
3. Después de la exposición de fluidos corporales.	c. Para proteger al profesional sanitario de la colonización o infección por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la contaminación.
4. Después del contacto con el paciente.	d. Para impedir la transmisión de gérmenes por inoculación al paciente, así como de un punto del cuerpo a otro del mismo paciente.
5. Después del contacto con el entorno del paciente.	e. Para prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia al paciente y en última instancia proteger al paciente de la colonización.

Respuestas:

- 1e, 2d, 3c, 4b, 5a.
- 1a, 2b, 3c, 4d, 5e.
- 1a, 2d, 3c, 4b, 5e.
- 1e, 2b, 3c, 4d, 5a.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



¿Cómo se denomina la etapa que permite hacer la revisión del plan de cuidados en el proceso de atención de enfermería?

Respuestas:

- **Evaluación.**

- Planificación.

- Ejecución.

- Diagnóstico.

Usted es líder del servicio de gastroenterología en donde se presenta un problema entre dos enfermeros a su cargo, relacionados con la solicitud de permiso para el mismo turno. Para solucionar el conflicto debe tomar una decisión rápida incluyendo el uso de la autoridad y la normativa. ¿Qué método de solución del conflicto se está aplicando?

Respuestas:

- **Competencia.**

- Evitar las confrontaciones.

- Manejo de emociones.

- Colaboración.

Los pacientes sometidos a quimioterapia habitualmente refieren “sabor metálico” de los alimentos. ¿Cuál es la medida para disminuir esta alteración del gusto?

Respuestas:

- **Restringir el consumo de carnes rojas.**

- Comidas picantes, porque disminuyen esta sensación.

- Cepillado bucal en forma vigorosa y enjuagarse frecuentemente.

- Restringir el consumo de alimentos tibios.



Paciente de 70 años acude al servicio de emergencia por presentar dificultad respiratoria, ortopnea, mucosidad excesiva y tos con expectoración viscosa. ¿Cuál es el diagnóstico enfermero para este caso?

Respuestas:

- Limpieza ineficaz de las vías aéreas.

- Deterioro del intercambio de gases.
- Patrón respiratorio ineficaz.
- Perfusión tisular periférica ineficaz.

De las siguientes áreas de valoración, identifique las que corresponden a la escala de Morse:

1. Comorbilidades.
2. Respiración.
3. Ayuda para deambular.
4. Venoclisis.
5. Circulación.
6. Saturación de oxígeno.

Respuestas:

- 1, 3, 4

- 2, 4, 5

- 1, 5, 6

- 2, 3, 6

Seleccione la alternativa correcta respecto a la mecánica corporal:

Respuestas:

- Es preferible deslizar un objeto antes que levantarlo.

- Se recomienda utilizar los músculos pequeños antes que los grandes.
- Se prefiere levantar los objetos alejándolos de nuestro centro de gravedad.
- Los cambios de posición favorecen la fatiga muscular.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



¿En qué momentos se aplica la lista de verificación de cirugía segura?

Respuestas:

- **Entrada, pausa y salida.**

- Antes, durante y después.
- Inicio, pausa y fin.
- Pre, trans y post.

¿Qué aspecto debe tener en cuenta al aplicar la técnica de mecánica corporal al movilizar un paciente?

Respuestas:

- **Sujetar la persona próxima al cuerpo.**

- Mantener la espalda flexionada.
- Mantener los pies unidos.
- Evitar el uso de elevadores mecánicos.

Relacione las vacunas con las vías de administración:

Vacunas	Vías de administración
1. HB	a Subcutánea
2. OPV	b. Intradérmica
3. FA	c. Oral
4. BCG	d. Intramuscular

Respuestas:

- **1d, 2c, 3a, 4b.**

- 1a, 2b, 3d, 4c.
- 1c, 2d, 3b, 4a.
- 1b, 2a, 3c, 4d.



Dentro de las actividades del profesional de enfermería se encuentra ayudar a trasladar al paciente desde la cama a la silla de ruedas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye un principio de la mecánica corporal?

Respuestas:

- **A mayor base de sustentación, mejor será el equilibrio.**
- A menor base de sustentación, mejor será el equilibrio.
- Al flexionar las rodillas aumenta el centro de gravedad.
- Alejar un objeto del cuerpo mejora la estabilidad.

Relacione los desechos con su respectivo tipo:

Tipos de desechos	Desechos
1. Generales	a. Agujas
2. Corto punzantes	b. Torundas
3. Infecciosos	c. Vacunas vencidas
	d. Cartón
	e. Jeringas
	f. Plástico

Respuestas:

- **1df, 2ae, 3bc.**
- 1ac, 2bd, 3ef.
- 1ef, 2ac, 3bd.
- 1bc, 2de, 3af.

Paciente de 50 años que ingresa al área de emergencias por presentar lesiones traumáticas ocasionadas por un accidente de tránsito, a la valoración presenta frecuencia cardíaca de 150 por minuto, cambios marcados en el estado mental, caída en la presión arterial sistólica, caída de 65 mmHg en la presión arterial media, piel fría y con una pérdida estimada de sangre de más de 2 000 ml. ¿Cuál es el estadio de shock hemorrágico según la clasificación?

Respuestas:

- **CLASE IV**
- CLASE II
- CLASE I
- CLASE III

En el puerperio encontramos diferentes subclasificaciones. ¿A qué etapa corresponde el tiempo que comprende desde el segundo día del nacimiento hasta los 10 días de postparto?

Respuestas:

- **Puerperio mediato.**
- Puerperio inmediato.
- Puerperio normal.
- Puerperio tardío.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado. ¿Qué teorizante utiliza para la planificación de los cuidados de este paciente?

Respuestas:

- **Dorothea Orem.**
- Hidegard Peplau.
- Florence Nightingale.
- Virginia Henderson.



Relacione la competencia de enfermería con la práctica profesional:

Competencia	Práctica profesional
1. Práctica basada en la evidencia.	a. Utilizar herramientas como diagramas de flujo para hacer explícito el proceso de atención.
2. Mejorar la calidad.	b. Implicar a los amigos y la familia en los cuidados.
3. Cuidados centrados en el paciente.	c. Reconocer las contribuciones de otros miembros del equipo sanitario.
4. Trabajo en equipo y de colaboración.	d. Demostrar conocimientos de los métodos científicos básicos.

Respuestas:

- 1d, 2a, 3b, 4c.
- 1a, 2c, 3b, 4d.
- 1c, 2b, 3d, 4a.
- 1b, 2c, 3a, 4d.



Relacione los trastornos hipertensivos gestacionales con los criterios:

Clasificación	Criterios
1. Hipertensión gestacional	a. Tensión arterial (TAS) de 160mmHg, proteinuria mayor de 5 g en 24 horas, trastornos neurológicos.
2. Pre-eclampsia leve	b. Aparición de convulsiones tónico- clónicas, generalizadas y/o coma
3. Pre-eclampsia grave	c. Ligeros edemas en cara y manos, con proteinurias en orinas 24 horas inferior a 300mg/l
4. Eclampsia	d. Proteinurias en la orina de 24 horas inferior a 300mg/l

Respuestas:

- 1d, 2c, 3a, 4b.
- 1c, 2b, 3d, 4a.
- 1b, 2a, 3c, 4d.
- 1a, 2c, 3d, 4b.

Relacione las intervenciones de enfermería con sus actividades:

Intervenciones	Actividades
1. Dependiente.	a. Valoración de la integridad de la piel.
2. Independiente.	b. Consulta a servicio de asistencia social.
3. Interdependiente.	c. Inicio del tratamiento intravenoso.

Respuestas:

- 1c, 2a, 3b.
- 1b, 2a, 3c.
- 1a, 2b, 3c.
- 1b, 2c, 3a.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Relacione los momentos del lavado de manos con la fundamentación científica.

Momentos del lavado de manos	Fundamentación científica
1. Antes del contacto directo con el paciente.	a. Protege al paciente de los gérmenes nocivos incluidos los del propio paciente.
2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica.	b. Se protege a usted mismo y al medio asistencial de gérmenes nocivos.
3. Después de exposición a fluidos corporales.	c. Para proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia.
4. Después del contacto con el paciente.	d. Para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies.
5. Después del contacto con el entorno del paciente.	e. Protege al paciente de los gérmenes nocivos que llevamos en las manos.

Respuestas:

- **1e, 2a, 3b, 4c, 5d.**
- 1b, 2c, 3a, 4d, 5e.
- 1a, 2b, 3c, 4e, 5d.
- 1c, 2d, 3e, 4a, 5b.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



El profesional enfermero, al realizar una visita domiciliaria, identifica una familia conformada solo por la madre con dos hijos; el niño de 10 años y la adolescente de 16 años quien indica que ha dejado de asistir al colegio y al entrevistarla presenta llanto fácil y angustia. De acuerdo con el modelo de Dorothea Orem. ¿Cuál es el sistema de enfermería para apoyar a satisfacer las demandas del autocuidado terapéutico de la familia?

Respuestas:

- **De apoyo educativo.**
- Compensador.
- Parcialmente compensador.
- Requisitos universales.

Según la clasificación de severidad clínica en el embarazo, ¿en qué parámetros de hemoglobina existe anemia moderada?

Respuestas:

- **7.1 g/dl – 10.0 g/dl**
- 10.1 g/dl – 10.9 g/dl
- Menor de 7.1 g/dl
- Mayor de 11 g/dl

Gestante de 30 semanas acude al servicio de Gineco-obstetricia con presencia de hemólisis, disfunción hepática (enzimas hepáticas elevadas) y trombocitopenia. ¿A qué trastorno hipertensivo corresponde el caso?

Respuestas:

- **Síndrome de Hellp.**
- Preeclampsia leve.
- Hipertensión gestacional.
- Preeclampsia gestacional.



Los siguientes enunciados corresponden a las complicaciones de los trastornos hipertensivos gestacionales. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Cetoacidosis diabética.**
- Coagulación intravascular diseminada.
- Edema de pulmón.
- Insuficiencia renal.

¿Qué es la asesoría en salud sexual y reproductiva?

Respuestas:

- **Proceso breve y focalizado que se centra en las necesidades y demandas de las personas.**
- Conversatorio basado en la hipótesis y la experiencia de un asesor en temas de salud.
- Terapia psicológica a largo plazo realizada por un psicólogo o psiquiatra.
- Un proceso que en el que se toman decisiones en base a las exigencias del asesor de salud.

De las siguientes opciones, ¿cuál contiene factores de riesgo que predisponen a desarrollar anomalías de inserción placentaria?

Respuestas:

- **Edad $\geq$ 35 años, multiparidad, embarazo múltiple, anemia, cicatriz uterina previa (legrado, aspiración manual uterina, cesárea, miomectomía), tabaquismo, uso de cocaína, espacio intergenésico post cesárea < 12 meses.**
- Se debe sospechar de placenta previa en toda mujer embarazada que presente sangrado vaginal con más de 20 semanas de gestación.
- En las gestantes con placenta previa se triplica el riesgo de presentar distocias de situación (oblicua, transversa).
- Los síntomas urinarios y la hemorragia dolorosa proporcionan un alto índice de sospecha de placenta percreta con invasión vesical.



Al examen físico de enfermería usted observa alteraciones de la piel y mucosas. ¿Cuál es el patrón funcional que se encuentra alterado?

Respuestas:

- Nutricional - Metabólico.

- Actividad – Ejercicio.
- Eliminación – Intercambio.
- Seguridad – Protección.

¿Cuál es la herramienta específica del MAIS-FCI que sirve para identificar oportunamente a los individuos, a las familias sanas con posibles y potenciales riesgos y a quienes mediante una planificación adecuada se realizarán intervenciones para su salud?

Respuestas:

- Diagnóstico dinámico.

- Diagnóstico situacional.
- Ficha familiar.
- Visita domiciliaria.

Paciente masculino de 25 años llega a la unidad de salud por presentar, fiebre de 39.2 °C con malestar general, a la misma hora acude gestante de 42años, con 36SG, con dolor tipo contracción. Se brindó atención inmediata al paciente masculino, dejando en espera a la gestante. ¿Qué principio del MAIS FCI se aplicó en este caso?

Respuestas:

- Equidad.

- Eficiente, eficaz y de calidad.
- Participativo.
- Garantía de los derechos de las y los ciudadanos.



¿Qué principio de la mecánica corporal para el profesional de enfermería se debe aplicar en la movilización de un paciente?

Respuestas:

- **Mantener la espalda recta.**
- Sujetar al paciente alejado de nuestro cuerpo.
- Mantener rectas las rodillas.
- Alejar el centro de gravedad del polígono de sustentación.

Hombre que trabaja en un laboratorio químico, acude al servicio de Emergencia por derrame de líquido corrosivo en sus manos, evidenciándose quemaduras en dermis y epidermis. Seleccione la etiqueta diagnóstica NANDA I prioritaria:

Respuestas:

- **Deterioro de la integridad cutánea.**
- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
- Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz.
- Perfusión tisular periférica ineficaz.

Indique la opción correcta sobre criterio de admisión a la embarazada en trabajo de parto en la UTPR, de acuerdo con la Guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública:

Respuestas:

- **Dinámica uterina regular, borramiento cervical > 50%, dilatación de 3-4 cm, es decir, que se encuentre en fase activa del parto.**
- Menos de 3 cm de dilatación, sin dinámica uterina regular y borramiento cervical <50%.
- Se recomienda valoración por el especialista siempre que el trabajo de parto en fase activa se prolongue más allá del promedio de 8 horas en la nulípara y 5 horas en la múltipara.
- Se recomienda siempre informar al especialista gineco-obstetra responsable del servicio de atención en el primer y segundo nivel de que se está atendiendo un parto.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

En una casa de salud se produce un parto prematuro moderado. De acuerdo con la Guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador ¿a qué edad gestacional pertenece esta clasificación?

Respuestas:

- **32 a 33 semanas 6 días de gestación.**
- 34 a 36 semanas 6 días de gestación.
- 28 a 31 semanas 6 días de gestación.
- Menor o igual a 27 semanas 6 días de gestación.

¿Cuál de las siguientes opciones contiene las acciones de la enfermería comunitaria como profesión dentro de la atención primaria de salud?

Respuestas:

- **Promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud.**
- Promoción, prevención, prescripción y rehabilitación de la salud.
- Promoción, prevención, curación y diagnóstico.
- Promoción, prevención, curación y pruebas diagnósticas.

Teniendo en cuenta la cadena de supervivencia de una Parada Cardiorrespiratoria extra hospitalaria. ¿Cuál es el paso a seguir tras confirmar que la víctima está en paro cardíaco?

Respuestas:

- **Activar el sistema de emergencia.**
- Iniciar compresiones torácicas.
- Aplicar desfibrilación rápida.
- Efectuar traslado al hospital.



Relacione los tipos de soluciones con la concentración para la administración.

Solución	Concentración
1. Dextrosa al 5% en agua	a. Hipertónica
2. Dextrosa al 10% en agua	b. Hipotónica
3. Solución Salina 0.45%	c. Isotónica

Respuestas:

- 1c, 2a, 3b.
- 1b, 2a, 3c.
- 1a, 2c, 3b.
- 1a, 2b, 3c.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Relacione los electrolitos en plasma (mEq/L) con sus alteraciones:

Electrolitos	Alteraciones
1. Sodio	a. Hipercalcemia -hipocalcemia
2. Potasio	b. Hipernatremia -hiponatremia
3. Cloro	c. Hipermagnesemia -hipomagnesemia
4. Magnesio	d. Hipercloremia - hipocloremia
5. Calcio	e. Hipercalemia - hipocalemia

Respuestas:

- **1b, 2e, 3d, 4c, 5a.**
- 1a, 2b, 3c, 4d, 5e.
- 1c, 2b, 3a, 4e, 5d.
- 1d, 2e, 3b, 4a, 5c.

Con relación a la osteoporosis, complete el siguiente enunciado:

La osteoporosis **primaria** puede aparecer en la _____, la osteoporosis **secundaria** se asocia a factores como _____ y _____.

Respuestas:

- **Postmenopausia - uso de corticosteroides - enfermedad celíaca**
- Senectud - edad del paciente - aumento en la ingestión de calcio
- Pubertad - consumo de calcio - ejercicio de soporte de peso
- Senectud - uso de anticonvulsivos - aumento en la ingestión de calcio

¿Cuáles son las enfermedades que se detectan al realizar el Tamizaje Neonatal?

Respuestas:

- **Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y galactosemia.**

- Hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, hipercalcemia, hiperpotasemia.
- Aspiración de meconio, taquipnea transitoria, EMH, displasia broncopulmonar.
- Toxoplasmosis, Rubéola, Citomegalovirus, Herpes simple.

¿A cuál de las siguientes opciones corresponde la siguiente definición? Permite integrar acciones que el equipo de salud realiza durante el embarazo, parto y puerperio, para evitar la falta de datos y contribuir a mejorar la calidad de la atención.

Respuestas:

- **Carnet perinatal.**
- Historia clínica.
- Carnet de inmunización.
- Anamnesis.

Al educar al paciente diabético sobre un programa de ejercicios. ¿Cuál es la orientación correcta?

Respuestas:

- **Evitar el ejercicio en presencia de calor o frío extremos.**
- Reforzar la rutina de ejercicio si la glucosa es mayor de 250 mg/dl.
- Realizar el ejercicio de manera esporádica antes que diaria.
- Evitar ejercicio de resistencia como levantamiento de pesas.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Paciente de 46 años, con antecedentes de multiparidad, quien refiere que desde hace un tiempo tiene pérdida involuntaria de orina al estornudar o reírse. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería que se aplica en esta situación?

Respuestas:

- Incontinencia urinaria de esfuerzo r/c debilidad de los músculos pélvicos m/p pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina.

- Incontinencia urinaria por rebosamiento r/c obstrucción uretral m/p pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina.

- Incontinencia urinaria de urgencia r/c disminución de la capacidad vesical m/p pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina.

- Incontinencia urinaria funcional r/c debilidad de las estructuras pélvicas de soporte m/p sensación de necesidad de orinar.

En el examen físico de enfermería usted observa a un paciente que presenta los siguientes signos y síntomas: congestión pulmonar, alteraciones del patrón respiratorio, anasarca, ortopnea y aumento de la presión venosa central. ¿Cuál es la categoría diagnóstica según NANDA que corresponde a este caso?

Respuestas:

- Exceso de volumen de líquidos.

- Riesgo de déficit de volumen de líquidos.

- Déficit de volumen de líquidos.

- Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos.

En la cadena epidemiológica. ¿Cuál es el nombre del elemento que se refiere al hábitat natural de un agente infeccioso, sea una persona, animal, planta o material inanimado?

Respuestas:

- Reservorio.

- Agente.

- Huésped.

- Fuente de infección.

En los aspectos a tener en cuenta en la seguridad del paciente, se encuentra la notificación de eventos adversos con el objetivo de aprender de los errores y evitar que estos se repitan. ¿Qué característica debe tener el sistema de notificación de eventos adversos?

Respuestas:

- **Confidencialidad.**

- Punitivo.
- Obligatoriedad.
- Dependiente.

Como profesional de enfermería que labora en el quirófano, le corresponde realizar el chequeo de cirugía segura. ¿En qué momentos aplica la lista de verificación de cirugía segura?

Respuestas:

- **Antes de la inducción de la anestesia - antes de la incisión cutánea - antes que el paciente salga del quirófano.**

- Después de la inducción de la anestesia - después del acto quirúrgico - después de la recepción en la unidad de recuperación.
- Durante la anestesia - durante el conteo de material blanco - durante la extubación del paciente.
- Durante el acto quirúrgico - antes de la recepción en el servicio de recuperación - antes que el paciente egrese del quirófano.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Relacione la notificación del evento con su definición:

Notificación del evento	Definición
1. Cuasi eventos.	a. Evento que causa un daño involuntario al paciente por un acto de comisión o de omisión, no por la enfermedad o el trastorno de fondo del paciente.
2. Eventos adversos.	b. Todo evento adverso que haya derivado en la muerte del paciente o la pérdida importante o permanente de una función, de carácter imprevisto y sin relación con la enfermedad del paciente.
3. Eventos centinela.	c. Error de comisión o por omisión que podría haber causado daño al paciente, pero no produjo un daño grave gracias a la casualidad, a la prevención o a la atenuación.

Respuestas:

- 1c, 2a, 3b.
- 1b, 2c, 3a.
- 1a, 2b, 3c.
- 1b, 2a, 3c.

La teoría psicológica que se refiere a las necesidades humanas y su jerarquización pertenece a:

Respuestas:

- Abraham Maslow.
- Virginia Henderson.
- Marjory Gordon.
- Marta Rogers.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Relacione la autora de la teoría con el marco utilizado en la práctica profesional:

Autora	Marco para la práctica
1. Orem	a. La enfermera manipula el entorno del paciente para incluir: sonido, nutrición, higiene, luz, comodidad, socialización y esperanza adecuados.
2. Peplau	b. Las enfermeras ayudan al paciente a realizar sus necesidades básicas.
3. Nightingale	c. El cuidado enfermero es necesario cuando el paciente es incapaz de satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas de desarrollo o sociales.
4. Henderson	d. Las enfermeras participan en la estructuración de los sistemas sanitarios para facilitar las relaciones interpersonales.

Respuestas:

- **1c, 2d, 3a, 4b.**
- 1b, 2c, 3d, 4a.
- 1d, 2a, 3b, 4c.
- 1a, 2b, 3c, 4d.

¿Cuál es el autor de la teoría que se refiere a cuidar y ayudar al paciente a lograr el autocuidado?

Respuestas:

- **Dorothea Orem.**
- Virginia Henderson.
- Nola Pender.
- Martha Rogers.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



El profesional en Enfermería, en el marco de la práctica, manipula el entorno del paciente que incluye el sonido, ventilación, higiene, luz, comodidad. ¿A qué teorizante corresponde esta práctica?

Respuestas:

- **Florence Nightingale.**
- Martha Rogers.
- Madeleine Leininger.
- Imogene King.

Relacione el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, el lenguaje con la edad del niño.

Edad	Características
1. 12-15 meses	a. Corre sin caerse, come solo y combina dos o tres palabras.
2. 18-24 meses	b. Levanta la cabeza, coge un objeto que esté cerca y sonrisa social.
3. 1 mes	c. Camina solo, construye torres y usa palabras para indicar deseos.
4. 8-9 meses	d. Gatea y arrastra, oposición del pulgar y dice las primeras palabras.

Respuestas:

- **1c, 2a, 3b, 4d.**
- 1b, 2d, 3a, 4c.
- 1c, 2d, 3a, 4b.
- 1b, 2a, 3b, 4d.

¿Cuál es el tipo de violencia que es más difícil de demostrar y, en muchas ocasiones, no es identificada como agresión sino como manifestaciones propias del carácter del agresor?

Respuestas:

- **Psicológica o emocional.**
- Física.
- Sexual.
- De género.



Al valorar el pulso a un paciente, usted percibe que el mismo es irregular y a cada pulsación fuerte le sigue una débil. ¿Qué alteración del pulso presenta este paciente?

Respuestas:

- Pulso alternante.

- Pulso intermitente.
- Pulso bigeminado.
- Pulso paradójico.

La prueba del sudor (ionotest) es la que determina la cantidad de cloro en una muestra de sudor siendo positiva cuando el cloro se encuentra elevado. ¿Qué diagnóstico confirma?

Respuestas:

- Fibrosis quística.

- Epiglotitis.
- Asma.
- Neumonía.

¿Cuáles son las características del exantema de la enfermedad de Kawasaki?

Respuestas:

- Maculopápulas, morbiliforme, urticariforme.

- Maculopapular, descendente, confluyente.
- Maculopápulas en el tronco.
- Niño abofeteado, maculopápulas en el tronco.

Una madre acude con su niño de 4 meses al centro de salud para vacunación, la misma refiere que a los 2 meses luego de la aplicación del esquema, presentó reacciones neurológicas (convulsiones) por el componente pertussis. ¿Cuál es la vacuna indicada para este caso?

Respuestas:

- DT.

- Pentavalente.
- DPT.
- SRP.



Como parte de las medidas para el control del tabaquismo. ¿Qué intervención se realiza para cumplir con el monitoreo?

Respuestas:

- **Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención.**
- Proteger a la población de la exposición al humo de tabaco.
- Ofrecer ayuda para poder dejar de consumir tabaco.
- Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio.

¿Cuál es el parto que se presenta de manera espontánea, con bajo riesgo desde el comienzo hasta el alumbramiento y el producto se obtiene sin complicaciones?

Respuestas:

- **Parto eutócico.**
- Parto inducido.
- Parto inmaduro.
- Parto a término.

De la siguientes definiciones. ¿Cuál corresponde a la fase activa del trabajo de parto?

Respuestas:

- **Período que transcurre entre los 4 cm y los 10 cm de dilatación y se acompaña de dinámica regular.**
- Periodo que transcurre entre contracciones y 3 cm de dilatación, sin dinámica uterina regular y borramiento Cervical <50%.
- Período que transcurre entre el inicio de las contracciones uterinas regulares con modificación cervical hasta los 4 cm de dilatación.
- Periodo que transcurre desde el inicio de la dilatación <30%, las contracciones del útero muy irregulares y duran menos tiempo.

Las siguientes son medidas a aplicar en el periodo expulsivo en la labor de parto. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Realizar amniotomía o perfusión de oxitocina.**
- Medidas de asepsia.
- Posición cómoda para la embarazada.
- Prevención del trauma perineal.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

De los siguientes parámetros. ¿Cuál no estima la edad gestacional del recién nacido?

Respuestas:

- **Test de Apgar.**

- Fecha del último período menstrual.
- Ecografía del primer trimestre de embarazo.
- Escala de “New Ballard”.

Como responsable del programa de garantía de la calidad, usted verifica que el personal de enfermería realice y registre en cada turno la valoración torácica, incluida la auscultación. ¿Qué tipo de evaluación está realizando con esta verificación?

Respuestas:

- **Evaluación del proceso.**

- Evaluación de la estructura.
- Evaluación del resultado.
- Evaluación del profesional.

¿Cuál es la dosis recomendada para prevenir el síndrome de hemorragia por déficit de vitamina K en el recién nacido?

Respuestas:

- **Vitamina K en dosis única por vía IM (1 mg).**

- Vitamina K en 2 dosis por vía IM (1 ml).
- Vitamina K en dosis única por vía IM (1 ml).
- Vitamina K en 2 dosis por vía IM (2 mg).

¿Cómo se denomina al embarazo en edad gestacional entre 37 a 38 semanas y 6 días?

Respuestas:

- **Término precoz.**

- A término.
- Término tardío.
- Post-término.

¿Cuál es el micronutriente que previene la anencefalia, mielomeningocele y encefalocele durante el embarazo?

Respuestas:

- **Ácido fólico.**

- Hierro.
- Potasio.
- Calcio.

¿Cuál es una de las recomendaciones para la toma de la tensión arterial en el control prenatal?

Respuestas:

- **Para la toma de la TA diastólica debe utilizar el 5° ruido de Korotkoff.**

- La toma debe realizarse con la paciente de pie con el brazo a la altura del corazón.
- La toma debe realizarse con manguito que cubra 3.5 veces la circunferencia del brazo.
- Para la confirmación de la hipertensión severa debe repetirse la toma después de 30 minutos.

Según MAIS - FCI indique: ¿Cuál es el tipo de determinante de la salud que existe en una comunidad rural con coberturas bajas de vacunación?

Respuestas:

- **Conductuales.**

- Biológicos.
- Ambientales.
- Sociales.

¿Cuál es el trastorno endócrino - metabólico que aparece como consecuencia de la destrucción total e irreversible de las células beta del páncreas, provocando un déficit total de insulina?

Respuestas:

- **Diabetes Mellitus tipo I**

- Diabetes Mellitus tipo II
- Diabetes Mellitus asociada a pancreatitis.
- Diabetes gestacional.



¿Cómo se denomina a la estructura ovárica que da lugar a la liberación del óvulo?

Respuestas:

- **Folículo de Graaf.**

- Cuerpo lúteo.
- Cuerpo amarillo.
- Cuerpo albicans.

¿Cuáles son las unidades operativas que pertenecen al primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud?

Respuestas:

- **Puestos de salud, Consultorio General, CS Tipo A, CS Tipo B, CS Tipo C.**

- Puestos de salud, CS Tipo A, CS Tipo B, CS Tipo C.
- Consultorio General, CS Tipo A, CS Tipo B, CS Tipo C.
- Puestos de salud, Consultorio General, CS Tipo A, CS Tipo B, CS Tipo C y Hospital Básico.

¿A qué tipo de trastorno hipertensivo se asocia el aumento de la presión arterial en una mujer embarazada con un valor igual o mayor de 140/90 mmHg?

Respuestas:

- **Preeclampsia leve.**

- Eclampsia.
- Hipertensión arterial.
- Preeclampsia grave.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Seleccione las manifestaciones clínicas del dengue sin signos de alarma (DCSA):

1. Dolor retro orbitario.
2. Vómito persistente.
3. Irritabilidad.
4. Exantema.
5. Hepatomegalia > 2 cm.
6. Leucopenia.

Respuestas:

- 1, 4, 6
- 2, 3, 5
- 1, 3, 4
- 2, 5, 6

Seleccione los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda:

1. Daño endotelial.
2. Destrucción valvular.
3. Obstrucción venosa.
4. Estasis venosa.
5. Coagulación alterada.
6. Oclusión venosa crónica.

Respuestas:

- 1, 4, 5
- 2, 3, 6
- 1, 3, 4
- 2, 5, 6

¿Cuál es la medida preventiva primaria, en pacientes con factores de riesgo de trombosis venosa profunda?

Respuestas:

- **Profilaxis de medicamentos dentro de las 48 horas.**
- Hidratación de la piel en la zona afectada.
- Inmovilización del paciente para evitar complicaciones.
- Vigilar el estado nutricional del paciente.



De los siguientes. ¿Cuál es un cuidado específico del enfermero/a neonatólogo en el recién nacido con Ictericia Fisiológica?

Respuestas:

- Colocar compresa húmeda con solución bidestilada en los genitales externos del recién nacido masculino.

- Colocar al recién nacido solamente en posición prono, para evitar la posible broncoaspiración.
- Introducir solución glucosada en la alimentación al recién nacido favoreciendo la expulsión de la bilirrubina por el intestino a través de las heces fecales.
- Cubrir totalmente la piel del recién nacido con aceite mineral para evitar la descamación de la piel.

Relacione las etapas con los signos físicos en la Enfermedad de Alzheimer en el adulto mayor:

Etapas	Signos físicos
1. Temprana	a. Pérdida de toda la actividad voluntaria.
2. Media	b. Disartria.
3. Tardía	c. Sin déficit motores.
4. Etapa terminal	d. No puede llevar a cabo los movimientos.

Respuestas:

- **1c, 2d, 3b, 4a.**
- 1d, 2a, 3c, 4b.
- 1a, 2c, 3b, 4d.
- 1b, 2a, 3d, 4c.



¿Qué se puede diagnosticar mediante el cribado neonatal o prueba de TSH en el recién nacido?

Respuestas:

- Hipotiroidismo congénito del recién nacido.

- La diabetes tipo 1 del recién nacido.
- Malnutrición del recién nacido.
- Membrana hialina en el recién nacido.

De los siguientes, ¿cuál es un cuidado específico de enfermería para la prevención de la onfalitis en el recién nacido?

Respuestas:

- Favorecer la ventilación de la zona del muñón umbilical, evitando que el pañal lo cubra.

- Realizar baño antes de las 6 horas en el recién nacido.
- Colocar el pañal con cierta flexibilidad sobre el muñón umbilical.
- Realizar la curación del muñón umbilical cada 6 horas con solución antiséptica.

¿En qué posición debe colocar el profesional enfermero/a a un niño de 7 años con asma bronquial, polipnea y tiraje abdominal?

Respuestas:

- Posición semifowler.

- Posición genupectoral.
- Posición decúbito prono.
- Posición de Sims.



Seleccione las posiciones que puede adoptar la mujer según la norma de atención del parto cultural:

1. Posición semi sentada o sentada.
2. Posición cogida de la soga.
3. Posición pies y manos.
4. Posición de pie.
5. Posición horizontal.
6. Posición ginecológica o de litotomía.

Respuestas:

- 1, 2, 3, 4

- 2, 3, 4, 5

- 1, 2, 3, 6

- 2, 4, 5, 6

Relacione los artículos de atención al paciente con el riesgo de infección:

Riesgo de infección	Artículos
1. Críticos	a. Artículos que solo están en contacto con piel sana o no se ponen en contacto con pacientes.
2. Semicríticos	b. Artículos que están en contacto con piel no intacta o con mucosas no intactas.
3. No críticos	c. Artículos que están en contacto con cavidades estériles o tejido vascular.

Respuestas:

- 1c, 2b, 3a.

- 1a, 2c, 3b.

- 1b, 2a, 3c.

- 1b, 2c, 3a.



El diagnóstico de la gestación pone de manifiesto signos de presunción y signos de probabilidad. ¿Cuáles son los signos de probabilidad?

Respuestas:

- **Amenorrea, vulva y vagina cambian de color, sialorrea, náuseas, vómitos.**
- Sialorrea, náuseas, vómitos.
- Modificaciones del carácter, mareos, lipotimias.
- Modificaciones de los senos, palpitaciones, somnolencia.

El componente organización del sistema nacional de salud da provisión de servicio por niveles de atención. Relacione el nivel al que corresponde cada una de las prestaciones:

Nivel de atención	Prestación
1. Primer nivel de atención	a. Este nivel darán servicio de atención integral dirigida a la familia, individuo, comunidad enfatizando en la promoción y prevención
2. Segundo nivel de atención	b. Es el que concentra la experimentación clínica pre-registro o de procedimiento cuya evidencia no es suficiente para resolver y restáuralos en una población
3. Tercer nivel de atención	c. Comprende todas las acciones de servicios de acción ambulatoria especializada y aquellas que requieren hospitalización.
4. Cuarto nivel de atención	d. Corresponde al establecimiento que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados.

Respuestas:

- **1a, 2c, 3d, 4b.**
- 1c, 2b, 3a, 4d.
- 1b, 2c, 3d, 4a.
- 1d, 2a, 3b, 4c.



¿Qué equipos de protección personal debe utilizar, al brindar cuidados de enfermería, a un paciente con aislamiento por contacto?

Respuestas:

- **Bata y guantes.**
- Mascarilla quirúrgica y gafas protectoras.
- Mascarilla N 95 y Gorro.
- Gorro y botas.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al propósito fundamental de la administración?

Respuestas:

- **Efectividad.**
- Eficiencia.
- Reducción de gastos.
- Eficacia.

¿A qué principio del Modelo de Atención Integral de Salud se refiere el articular acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos de las personas, familias, comunidad y su entorno?

Respuestas:

- **Integralidad.**
- Universalidad.
- Continuidad.
- Equidad.

¿Qué componente del Modelo Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural MAIS-FCI se relaciona con la oferta de los servicios integrales e integrados de salud, garantizando la continuidad en la atención y respondiendo a las necesidades de salud de la población, a nivel individual, familiar y comunitario?

Respuestas:

- **Componente de provisión de servicios.**
- Componente de organización.
- Componente de gestión.
- Componente de financiamiento.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

¿Cuál es el cuidado de enfermería preventivo de la anemia ferropénica en los niños menores de 5 años?

Respuestas:

- Favorecer el cumplimiento de la alimentación complementaria según norma a partir de los 6 meses de nacido.

- Introducir hierro sérico por vía oral preventivo a partir de los 3 meses de nacido.
- Mantener lactancia materna exclusiva hasta el primer año de vida.
- Introducir a partir de los tres meses de vida una alimentación complementaria rica en verduras y aminoácidos.

Una de las estrategias nacionales de salud es el tamizaje neonatal, cuyo objetivo es prevenir la discapacidad intelectual mediante la detección temprana y oportuna de cuatro enfermedades. ¿Cuáles son estas enfermedades?

Respuestas:

- Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia y fenilcetonuria.

- Diabetes mellitus, enfermedad hipertensiva, fiebre reumática aguda, fiebre reumática crónica.
- Gonorrea, sífilis, virus del papiloma humano, VIH.
- Varicela, fiebre amarilla, sarampión, rubéola.

Paciente con diagnóstico de embarazo de 36 semanas más preeclampsia severa, más amenaza de parto pretérmino, se encuentra incómoda y no soporta estar decúbito lateral izquierdo como se le recomienda, a la valoración no se perciben movimientos fetales y la paciente manifiesta la misma preocupación, se registra una frecuencia cardíaca fetal de 123 latidos por minuto, pero el último control reporta 145 latidos por minuto; pese al tratamiento con nifedipino la cefalea persiste y le fastidia un ruido insoportable que no alivia. ¿Cuál es la alteración en el patrón de la frecuencia cardíaca fetal?

Respuestas:

- Desaceleración tardía.

- Desaceleración variable.
- Variabilidad.
- Desaceleración precoz.



De las siguientes opciones, ¿cuáles son medidas de tendencia central usadas habitualmente en los análisis estadísticos?

1. Intervalo de confianza
2. Moda
3. Varianza
4. Media
5. Desviación estándar
6. Mediana
7. Puntuaciones estandarizadas,
8. Diagramas de dispersión

Respuestas:

- 2, 4, 6
- 1, 2, 3
- 6, 7, 8
- 4, 5, 6

¿En qué consiste el APGAR familiar?

Respuestas:

- **Constituye un instrumento para detectar el grado de funcionalidad o disfunción de la familia.**
- Secuencia de etapas interconectadas que atraviesa el individuo y la familia a lo largo del tiempo.
- Es un instrumento que permite valorar la dinámica, la composición, estructura, el tipo de familia, relaciones, los roles que asumen y el ciclo evolutivo por el cual está cursando la familia en un momento determinado.
- Conjuntos de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los une y los aglutinan.

El cáncer de cérvix o cuello uterino en el estadio II se caracteriza por:

Respuestas:

- **El carcinoma se extiende más allá del cuello, alcanzando la pared pélvica y compromete la vagina, sin llegar al tercio inferior.**
- El carcinoma está estrictamente confinado al cuello, no se tiene en cuenta la extensión al cuerpo.
- El carcinoma se extiende más allá de la pelvis verdadera, compromete la mucosa de la vejiga o el recto.
- El carcinoma se extiende hasta la pared de la pelvis. El tumor comprende el tercio inferior de la vagina.

¿Qué cambio ocurre a nivel vaginal como signo probable de embarazo?

Respuestas:

- **Signo de Chadwick.**
- Movimientos fetales.
- Cloasma.
- Lipotimia.

¿Bajo qué modalidades los equipos de atención integral de primer nivel brindarán su atención?

Respuestas:

- **Atención extramural o comunitaria, atención intramural o en el establecimiento.**
- Conformación de las organizaciones comunitarias, diagnóstico situacional, dinámico, mapa parlante y sala situacional.
- Nivel epidemiológico, enfermedad, familiar, comunitario y nivel social.
- Perfil de cada miembro del equipo, tipo de unidad por su ubicación.



Relacione las complicaciones de las intervenciones coronarias percutáneas con las acciones de enfermería:

Complicaciones	Acciones de enfermería
1. Isquemia del miocardio	a. Suspender el anticoagulante y notificar.
2. Hemorragia y formación de hematoma	b. Aportar hidratación adecuada.
3. Insuficiencia renal aguda	c. Aplicar compresión manual.
4. Hematoma retroperitoneal	d. Administrar oxígeno y nitroglicerina.

Respuestas:

- **1d, 2c, 3b, 4a.**
- 1b, 2a, 3c, 4d.
- 1a, 2b, 3d, 4c.
- 1c, 2d, 3a, 4b.

Al valorar a un paciente que se encuentra en la etapa final de la vida, usted encuentra como hallazgo que el paciente tiene disminución de la actividad del tubo digestivo, con náuseas, acumulación de gases, distensión abdominal, además, pulso más lento y débil. ¿Cuál es el cambio característico indicativo de muerte clínica inminente que corresponde a estas manifestaciones clínicas?

Respuestas:

- **Pérdida del tono muscular.**
- Enlentecimiento de la circulación.
- Cambios de las respiraciones.
- Deterioro sensitivo.



¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es un signo de cáncer mamario avanzado?

Respuestas:

- **Retracción del pezón.**
- Dolor mamario difuso.
- Sensibilidad con la menstruación.
- Lesión móvil.

¿Cuál es la localización del dolor abdominal como consecuencia del engrosamiento de la vesícula biliar en un paciente con Dengue?

Respuestas:

- **Dolor hipocondrial derecho.**
- Dolor epigástrico.
- Dolor abdominal difuso.
- Dolor hipocondrial izquierdo.

Paciente con antecedentes de sobredosis de sedantes, con manifestaciones de obnubilación, taquicardia e hipertensión arterial. Se realiza Gasometría Arterial cuyos resultados son: pH. 7.28, PaCO₂. 54 mmHg, PaO₂. 83 mmHg, H₂CO₃. 25 mEq /l ¿Qué trastorno se pone de manifiesto?

Respuestas:

- **Acidosis respiratoria.**
- Alcalosis respiratoria.
- Acidosis metabólica.
- Alcalosis metabólica.

Seleccione el derecho de la salud sexual y reproductiva que promueve a todas las personas a vivir una vida libre de discriminación promocionando procesos de promoción y prevención:

Respuestas:

- **Enfoque de inclusión social.**
- Enfoque de interculturalidad.
- Enfoque de sexualidad integral.
- Enfoque de igualdad.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



¿Cuál es el primer paso a seguir ante un caso de sospecha de violencia de género, siguiendo el procedimiento de tamizaje?

Respuestas:

- Respetar la confidencialidad y la no revictimización.

- Realizar un tamizaje rápido al momento del triaje.
- Informar al médico que la persona presenta sospecha de violencia de género.
- Seguir procedimiento de atención (médica) según tipo de violencia y ciclo de vida.

Dentro del equipo de atención integral a víctimas de violencia de género. ¿Cuál es la función del profesional de enfermería?

Respuestas:

- Realizar el triaje inicial y tamizaje.

- Brindar atención clínica siguiendo los protocolos establecidos.
- Realizar contención emocional y proceso psicoterapéutico.
- Valorar la situación social de la víctima.

Paciente de 66 años con diagnóstico médico de Neumonía adquirida en la comunidad, con disnea, frecuencia respiratoria de 25 por minuto, cianosis distal y una gasometría arterial que muestra los siguientes valores: pH 7.30, PaO₂ de 55 mmHg, PaCO₂ de 48 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería en este paciente?

Respuestas:

- Deterioro del intercambio de gases relacionado con cambios en la membrana alveolo capilar manifestado por hipoxia e hipercapnia.

- Hipoxia relacionado con deterioro del intercambio gaseoso manifestado por eupnea.
- Gasometría arterial anormal relacionado con hipercapnia manifestado por deterioro del intercambio de gases.
- Neumonía relacionado con gasometría arterial anormal manifestado por cambios en la membrana alveolo capilar.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Seleccione los enunciados que hacen referencia al principio de universalidad de la bioseguridad:

1. Evitar la exposición directa a la sangre.
2. Se debe involucrar a todos los pacientes.
3. Incluir a todas las instituciones de salud.
4. Todos los materiales utilizados son depositados y eliminados sin riesgo.
5. Todo el personal debe cumplir precauciones estándares.
6. Utilizar materiales adecuados para manejo de fluidos orgánicos.

Respuestas:

- 2, 3, 5

- 1, 4, 6

- 2, 3, 6

- 1, 4, 5

Según la Guía de práctica clínica alimentación y nutrición de la mujer gestante y de la madre en período de lactancia. ¿Qué aspectos generales se debe tener en consideración durante el embarazo?

- a. Ganancia de peso saludable.
- b. Importancia de los nutrientes.
- c. Reducir los riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles.
- d. Limitar o evitar el consumo de alcohol, cafeína algunos edulcorantes.
- e. Reducir el riesgo de anomalías congénitas.
- f. Contaminación de alimentos.

Respuestas:

- a, b, d, f.

- b, c, d, e.

- f, d, c, a.

- c, a, e, f.

Familiares de paciente con enfermedad terminal solicitan al médico continuar con el tratamiento, a pesar de que el paciente se niega a recibirlo. ¿Cuál es el derecho vulnerado del paciente?

Respuestas:

- Derecho a decidir.

- Derecho a la información.
- Derecho a la confidencialidad.
- Derecho a no ser discriminado.

¿Cuál de los principios del MAIS garantiza el acceso a iguales oportunidades para el cuidado y atención integral de salud de toda la población, independientemente de la nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, nivel de educación, ocupación e ingresos?

Respuestas:

- Universalidad.

- Integralidad.
- Continuidad.
- Equidad.

Indique las acciones y consideraciones que el profesional enfermero debe conocer en la administración de antibióticos profilácticos:

- El personal de salud debe contar con un protocolo de manejo de antibióticos.
- La administración de antibióticos debe ser dentro de 20 minutos para maximizar concentración tisular.
- Registrar la administración de antibióticos en la lista de verificación de cirugía segura, el documento será parte del Kárdex.
- Descontinuar la profilaxis antibiótica 24 horas después de realizar el procedimiento quirúrgico.
- En caso de procedimiento quirúrgico menores se administrará profilaxis antibiótica de acuerdo a la mejor evidencia científica.
- En caso necesario la profilaxis antibiótica puede extenderse a 72 horas.

Respuestas:

- a, c, d, e

- a, b, c, d
- b, c, d, e
- b, d, e, f

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

La dermatitis atópica (DA), es una enfermedad alérgica de la piel. ¿Cuál es la principal manifestación de la DA en el lactante o primera infancia?

Respuestas:

- **Enrojecimiento de las mejillas.**

- Prurito intenso que afecta el sueño.
- Liquenificación en forma de placa.
- Piel seca y áspera en otras zonas.

Una gestante portadora de cerclaje, con antecedentes de insuficiencia cervical, pretende incorporarse a la práctica de ejercicios físicos del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. ¿Cuál es la condición clínica que usted explicaría a la paciente?

Respuestas:

- **Contraindicación absoluta para la práctica de ejercicios físicos.**

- Contraindicación relativa para la práctica de ejercicios físicos.
- Motivo para la interrupción de los ejercicios físicos.
- Situación a tener presente una vez iniciada la práctica de ejercicios físicos.



Relacione las crisis familiares con sus características:

Crisis familiares	Características
1. Crisis normativas.	a. Forman parte del ciclo vital de la familia.
2. Crisis no normativas.	b. Son acontecimientos situacionales que ocurren desde fuera de la familia.
	c. El carácter transitorio no depende del tiempo de duración.
	d. Son generalmente impredecibles.

Respuestas:

- 1ac, 2bd.
- 1ab, 2cd.
- 1bd, 2ac.
- 1bc, 2ad.

Complete el siguiente enunciado:

Paciente que presenta un peso de 80Kg y una talla 1.75m tiene un índice de masa corporal de _____ que corresponde a _____.

Respuestas:

- 26.14 - **sobrepeso**
- 32.14 – Obesidad Grado II.
- 26.14 - Obesidad Grado I.
- 32.14 - Obesidad o sobrepeso.



Un profesional de enfermería del primer nivel de atención debe realizar el procesamiento y el análisis de los datos recolectados con respecto a las enfermedades de notificación obligatoria. ¿Qué criterio básico de calidad del dato corresponde con la interpretación correcta de cada variable?

Respuestas:

- **Consistencia.**
- Integralidad.
- Oportunidad.
- Exactitud.

Relacione los tipos de investigación con sus finalidades:

Tipos de investigación	Finalidades
1. Investigación descriptiva	a. Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.
2. Investigación correlacional	b. Su finalidad es conocer el grado de asociación que exista entre dos o más conceptos.
	c. Tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que dos conceptos o variables aportan cierta información explicativa.
	d. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.

Respuestas:

- **1ad, 2bc.**
- 1ac, 2bd.
- 1ab, 2cd.
- 1bd, 2ac.



¿Cuál es el cuidado correcto al descongelar la refrigeradora como parte de los procedimientos que aseguren la adecuada conservación de las vacunas?

Respuestas:

- Limpiar el equipo con desinfectante suave o vinagre blanco, luego de lo cual se debe secar prolijamente.

- Descongelar la refrigeradora si el grosor del hielo en el evaporador es de 2.5 cm.
- Modificar la posición del termostato, incrementando la temperatura y desconectar el equipo.
- Acelerar la descongelación, utilizando objetos cortopunzantes para desprender las capas de hielo en el evaporador.

¿A qué principio del Modelo de Atención Integral de Salud se refiere la transferencia de competencias de una entidad administrativa del nivel nacional a otra jerárquicamente dependiente (nivel zonal, distrital, local)?

Respuestas:

- Desconcentrado.

- Participativo.
- Integralidad.
- Universalidad.

Según prescripción médica le piden administrar Fentanilo 50 microgramos, usted cuenta en el servicio con ampollas de 500 microgramos en 10ml. ¿Cuántos ml debe administrar?

Respuestas:

- 1 ml.**
- 10 ml.
- 2 ml.
- 5 ml.

Los siguientes son pasos de los procedimientos de deliberación que se utilizan en bioética para resolver problemas clínicos. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Deliberación de las responsabilidades parciales.**

- Deliberación de los hechos.
- Deliberación de los valores.
- Deliberación sobre los deberes.

Las funciones del derecho en la vida social son:

1. Resolver conflictos de intereses.
2. Organizar el poder político.
3. Reclamar ciertos actos.
4. Normar la teoría política moderna.

Respuestas:

- **1, 2**

- 1, 4

- 2, 3

- 3, 4

Señale a qué principio del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural -MAIS- corresponde: garantizar el acceso a iguales oportunidades para el cuidado y atención integral de salud de toda la población que habita en el territorio nacional independientemente de la nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, nivel de educación, ocupación e ingresos.

Respuestas:

- **Universalidad.**

- Integralidad.
- Participativo.
- Equidad.

De acuerdo a la clasificación de los servicios de salud por niveles de atención y capacidad resolutive. ¿Qué comprende el segundo nivel de atención?

Respuestas:

- **Realizar acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización.**

- Prestar servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, los centros hospitalarios son de referencia nacional; resuelve los problemas de salud de alta complejidad.

- Atender al usuario desde que se comunica un evento que amenaza la salud, en cualquier lugar donde éste ocurra, hasta que él o los pacientes sean admitidos en la unidad de emergencia, u otro establecimiento de salud, cuya capacidad resolutive sea la adecuada.

- Cubrir a toda la población, resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la comunidad. Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, individuo y comunidad, enfatizando en la promoción y prevención.

Relacione las vías de nutrición enteral con sus indicaciones:

Vías de nutrición enteral	Indicaciones
1. Nasogástrica	a. Pacientes con el esófago comprometido, alimentación a largo plazo.
2. Transpilórica	b. Pacientes con enfermedades que involucran el estómago, riesgo aspiratorio.
3. Gastrostomía	c. Pacientes con íleo paralítico asociado con cirugía abdominal.
4. Yeyunostomía	d. Pacientes clínicamente estables que requieren apoyo nutricional.

Respuestas:

- **1d, 2b, 3a, 4c**

- 1b, 2d, 3a, 4c

- 1b, 2d, 3c, 4a

- 1d, 2a, 3c, 4b



Relacione las etapas del proceso enfermero con las habilidades de comunicación que se aplican en cada una de ellas:

Etapas del proceso enfermero	Habilidades de comunicación
1. Diagnósticos de enfermería. 2. Implementación.	a. Delegación y análisis verbal con el equipo de atención sanitaria. b. Análisis interpersonal de los hallazgos de la valoración. c. Actividades de educación sanitaria verbales, visuales, auditivas y táctiles. d. Validación de las necesidades de atención sanitaria mediante análisis verbal con el paciente.

Respuestas:

- **1bd, 2ac.**
- 1ab, 2cd.
- 1cd, 2ab.
- 1ad, 2bc.

¿En qué nivel hay que actuar para que la prevención en salud sea efectiva y no se tenga que intervenir en los demás niveles, considerando que con este accionar evitaremos las enfermedades y mejoraremos las condiciones de salud de la comunidad?

Respuestas:

- **Primer nivel de prevención.**
- Segundo nivel de prevención.
- Tercer nivel de prevención.
- Cuarto nivel de prevención.



Relacione los criterios para el diagnóstico de TB con las recomendaciones que se deben realizar en los adultos:

Criterios para el diagnóstico de TB	Recomendación / característica
1. Criterio clínico	a. Afectados que reciben esquema para TB sensible que continúan con baciloscopia positiva al 2do mes de tratamiento.
2. Criterio bacteriológico	b. Tos con expectoración por más de 15 días con o sin hemoptisis.
3. Criterio epidemiológico	c. Cuando presentan una reacción al PPD igual o mayor en su diámetro a 5 mm.
4. Criterio inmunológico	d. PCR en tiempo real, se debe aplicar a toda persona con sintomatología sugestiva de TB

Respuestas:

- **1b, 2d, 3a, 4c.**
- 1a, 2c, 3b, 4d.
- 1d, 2a, 3c, 4b.
- 1c, 2b, 3d, 4a .

Considerando los procesos utilizados para sintetizar evidencia científica. ¿Cuál es el que tiene como objetivo la síntesis o agrupación de resultados de diversos estudios previos, utilizando el análisis estadístico para determinar el efecto de una intervención y la consistencia de las relaciones?

Respuestas:

- **Metaanálisis.**
- Revisión sistemática.
- Metasíntesis.
- Revisión sistemática de métodos mixtos.

Entre las actividades extramurales que realiza la enfermera conjuntamente con el equipo de atención integral incluyen:

1. Actividades de organización comunitaria.
2. Trabajo en entidades educativas.
3. Actividades dentro de un establecimiento de salud.
4. Trabajo en consulta externa en unidades de primer nivel.

Respuestas:

- 1, 2
- 3, 4
- 1, 4
- 2, 3

En el esquema de vacunación recomendada para adolescentes mayores de 13 años y adultos con infección por VIH, se indica, tres dosis a mujeres y varones de 9 a 26 años y a hombres que tienen sexo con hombres, hasta 40 años. ¿A qué vacuna se hace referencia?

Respuestas:

- **Papiloma virus (VPH).**
- Varicela zóster.
- Hepatitis A.
- Herpes zóster.

La enfermera del centro de salud atiende a un niño de 4 años 3 meses, que según información de la madre desde hace 24 horas presenta ronquera, tos perruna, irritabilidad, secreción y congestión nasal, leve dificultad para respirar. Al examen físico signos vitales saturación de oxígeno 92%, apariencia general irritable, cardiopulmonar estridor inspiratorio, leve tiraje intercostal. ¿Cuál es el diagnóstico probable para el caso?

Respuestas:

- **Crup.**
- Bronquiolitis.
- Faringoamigdalitis.
- Neumonía.

Como profesional de enfermería de un centro de salud, usted va a aplicar la segunda dosis de la vacuna fiPV a una niña de 4 meses. ¿Cuál es la vía y el lugar de aplicación de esta vacuna?

Respuestas:

- Intra Dérmica, Deltoides izquierdo.

- Intra Dérmica, Deltoides derecho.
- Intra Muscular, Muslo izquierdo.
- Subcutánea, Deltoides izquierdo.

Mujer múltipara (3 hijos anteriores) de 36 años acudió al primer nivel de una comunidad rural, tras referir dolores con un parto eutócico espontáneo sin complicaciones madre y neonato fueron dados de alta al cumplir las 24 horas de nacido sin novedad. Transcurrido 36 horas los profesionales de la salud planifican el control en su domicilio. ¿A qué tiempo corresponde el primer control del binomio madre e hijo?

Respuestas:

- Corresponde entre los dos y tres días de vida o 24 a 48 horas del alta.

- Corresponde del tercer al quinto día o 48 a 72 horas después del alta.
- Corresponde desde el cuarto día hasta los 28 días de nacimiento.
- Corresponde controles mensuales los primeros ocho meses de vida.

Al efectuar un estudio que relacione la frecuencia de un determinado problema de salud de una población general, con su exposición global a un factor de riesgo. ¿Cuál es el estudio epidemiológico que se debe realizar?

Respuestas:

- Correlacional.

- Transversal.
- Descriptivo.
- Longitudinal.

El equipo de salud de la unidad operativa de San Antonio requiere realizar intervenciones a nivel comunitario en toda su zona de influencia y para ello se plantea realizar el Análisis Situacional Integrado de Salud (ASIS). El médico delega la planificación de la actividad al profesional de enfermería, quién toma la decisión de iniciar con el diagnóstico dinámico. ¿Qué acciones planificaría el profesional de enfermería para que el equipo de salud elabore el diagnóstico dinámico?

- a. Aplicar y actualizar las fichas familiares, para luego retomar la información.
- b. Retomar información de los registros de atención de los servicios de salud.
- c. Actualizar el mapeo de actores.
- d. Recuperar la información proveniente de las actividades realizadas por los TAPS.
- e. Actualizar del mapa parlante como estrategia para la intervención.

Respuestas:

- **c, e.**
- a, d.
- a, b.
- d, e.

En la unidad operativa donde usted trabaja como enfermero/a capta a un usuario de 25 años de sexo masculino con tos y flema desde hace más de 15 días, es decir es un paciente sintomático respiratorio (SR). Además, refiere presentar diaforesis nocturna y bajo peso. Según la norma técnica del PCT. ¿A qué tipo de definición de caso corresponde?

Respuestas:

- **Caso presuntivo de Tuberculosis.**
- Caso de Tuberculosis.
- Caso índice.
- Caso contacto.

Cuando hacemos un análisis en una determinada población de: hábitos, costumbres, creencias, actitudes, comportamientos. ¿A qué determinantes de la Atención Primaria en Salud del MAIS FCI, corresponde?

Respuestas:

- Determinantes conductuales.

- Determinantes biológicos.
- Determinantes sociales.
- Determinantes ambientales.

La visita domiciliar es la actividad básica del Modelo de Atención Integral - MAIS. Por medio de ella se realiza un intercambio de información entre la familia y el equipo de salud del primer nivel. En esta actividad se tiene la oportunidad de conocer la situación familiar, el ambiente familiar, el ambiente físico y sus recursos. ¿Cuáles son los criterios para la priorización de la visita domiciliar?

Respuestas:

- Criterio socioeconómico, criterio epidemiológico, criterio demográfico, criterio administrativo.

- Criterio epistemológico, criterio socioeconómico, criterio demográfico, criterio administrativo.
- Criterio de familias con adultos mayores de 80 años, criterio de personas que viven solas o sin familias, criterio de personas que no pueden desplazarse al centro de salud, criterio de familias con enfermos graves o con discapacidad.
- Criterio de atención a la población que no pueda desplazarse al centro de salud, criterio de información, educación y apoyo al enfermo y su familia, criterio de facilitar la prevención primaria, secundaria y terciaria, criterio de unificar la calidad de atención de todos los profesionales implicados.

Paciente de 22 años acude acompañado de sus padres, para ser intervenido de una herniorrafia inguinal. Como parte del cuidado enfermero usted debe recolectar información para realizar el proceso de atención de enfermería. ¿Cuál es la principal fuente de información en este caso?

Respuestas:

- El paciente.

- La familia.
- Historia clínica.
- Exámenes de laboratorio.



Como profesional de Enfermería en Atención Primaria para cumplir con el Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador y el paquete de prestaciones para la mujer embarazada, usted activa la red local de mujeres embarazadas. ¿A qué componente corresponde la descripción operativa señalada?

Respuestas:

- Corresponsabilidad ciudadana.

- Atención Integral de Salud.
- Captación.
- Seguimiento.

Paciente de 34 años, multípara es su quinto parto; cursa por puerperio normal inmediato sus primeras dos horas, por lo que se encuentra en centro obstétrico. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debe valorar el profesional de enfermería?

Respuestas:

- SCORE mamá, involución uterina, características de los loquios.

- Signos vitales, resultados de laboratorio, características de loquios.
- SCORE mamá, estado de conciencia, apariencia de periné.
- Coloración de la piel, involución uterina, características de los loquios.

Usted como profesional de enfermería asiste a un neonato de 37 semanas con padecimiento respiratorio de evolución aguda, autolimitada y benigna, provocada por el líquido pulmonar fetal luego del nacimiento, que en condiciones normales es removido gracias a que el epitelio alveolar cambia de secretar cloro a absorción de sodio y las prostaglandinas dilatan los vasos linfáticos y favorecen el paso del fluido hacia la circulación pulmonar que se establece a plenitud luego de la primera respiración. ¿A qué patología del recién nacido corresponde el enunciado?

Respuestas:

- Taquipnea transitoria del RN.

- Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR).
- Enfermedad de membrana hialina (EMH).
- Hipertensión pulmonar persistente (HPP).

Usted como líder de un servicio hospitalario, se encuentra demostrando el procedimiento de lavado de manos a un grupo de estudiantes de Enfermería que ingresan a realizar sus prácticas en el servicio. Al indicar que el procedimiento lo deben realizar después de la exposición de fluidos corporales. ¿A qué momento de la higiene de manos se refiere?

Respuestas:

- **Momento 3.**

- Momento 1.
- Momento 2.
- Momento 4.

La Organización Mundial de la Salud, ponderó los riesgos y los beneficios para la salud respecto a la prescripción y uso de los métodos anticonceptivos, por lo tanto estableció criterios de elección. ¿A que categoría corresponde una condición en la que, en general, los riesgos teóricos o comprobados superan las ventajas de usar el método?

Respuestas:

- **Categoría 3.**

- Categoría 1.
- Categoría 2.
- Categoría 4.

Como profesional de Enfermería de un servicio hospitalario, al valorar la función respiratoria de un paciente de 43 años, usted observa que la respiración es anormalmente poco profunda en dos o tres respiraciones, seguida de un período irregular de apnea. ¿Cómo reporta esta alteración del patrón respiratorio en su informe?

Respuestas:

- **Respiración de Biot.**

- Respiración de Kussmaul.
- Respiración de Cheyne-Stokes.
- Hiperventilación.



La termorregulación es vital en el cuidado del recién nacido, cuando usted elige utilizar una incubadora de doble pared. ¿Cuál proceso de transferencia de calor interviene?

Respuestas:

- **Convección.**
- Radiación.
- Evaporación.
- Conducción.

Paciente atendido en emergencia luego de accidente de tránsito, es diagnosticado de shock hipovolémico, médico prescribe la administración de paquetes globulares. Durante la administración, el paciente presenta un shock anafiláctico, paro cardio respiratorio que no revierte pese a maniobras de RCP, por colocar paquete globular equivocado. ¿Cómo se denomina la situación descrita?

Respuestas:

- **Evento centinela.**
- Evento adverso.
- Reacción adversa.
- Fallas latentes.

Paciente femenina en edad fértil que se encuentra hospitalizada por presentar palidez, desorientación, cansancio, palpitaciones. Al ingreso realizaron exámenes de laboratorio generales, el hemograma revela glóbulos rojos $3.33 \times 10^6/\text{UL}$, hemoglobina 5.7 g/dL, hematocrito de 17.6 %, volumen corpuscular medio 62.5 fL, hemoglobina corpuscular media 17.10 pg por lo que le realizan exámenes adicionales: ferritina 150 mg/mL, hierro 35 ug/dL. ¿Cuál es la causa que ocasionó el cuadro clínico?

Respuestas:

- **Déficit de hierro.**
- Bloqueo de depósitos de hierro.
- Déficit de vitamina B12.
- Déficit de eritropoyetina.

Paciente de 26 años secundigesta, con antecedente de diabetes mellitus, embarazo a término llega a la emergencia en período expulsivo, refiere mucho dolor. En la valoración presenta dilatación del cuello uterino de 10 cm y las contracciones uterinas son regulares, a intervalos de 3 min, con una duración de 70 segundos, se traslada para sala de parto, se realiza parto distócico por desproporción cefalopélvica, obteniendo recién nacido con peso de 4000 gramos. En la revisión de cavidad presenta desgarro que afecta a la horquilla perineal, la piel perineal, mucosa vaginal, piel, aponeurosis y los músculos del periné, sin llegar al esfínter anal. ¿Cuál de las clasificaciones de los desgarros pertenece a este caso?

Respuestas:

- **Desgarro perineal grado II.**

- Desgarro perineal grado I.
- Desgarro perineal grado III.
- Desgarro perineal grado IV.

¿Cuál de los siguientes es un método anticonceptivo temporal hormonal combinado?

Respuestas:

- **Parche transdérmico.**

- Condón masculino.
- Dispositivo intrauterino.
- Ligadura.

Paciente de 23 años, que ingresa a la sala de emergencia del hospital, en su valoración presenta hipertermia de 39.7 °C, piel pálida, sudorosa y fría, tos productiva y dificultad para respirar que se acentúa al inspirar. En la revisión de la historia clínica el paciente tiene un diagnóstico clínico de Tuberculosis pulmonar, ha recibido tratamiento con medicamentos anti-tuberculosis por un mes y abandona su tratamiento. ¿Cuál es el caso de acuerdo con la Normativa del Ministerio de Salud del Ecuador?

Respuestas:

- **Caso previamente tratado.**

- Caso recaída.
- Caso fracaso.
- Caso pérdida en el seguimiento recuperado.

De acuerdo con lo que establece la norma para el manejo de los frascos abiertos. ¿Cuál es el tiempo de conservación de las vacunas multidosis como: bOPV, fIPV, DPT, dt en adultos y DT pediátrica?

Respuestas:

- **28 días.**
- 8 días.
- 10 días.
- 12 días.

Los profesionales de enfermería comunitaria asumen el reto de proporcionar prestaciones integrales de salud a la población, utilizando varias estrategias y herramientas. Una de ellas es la visita domiciliaria, definida como el encuentro o acercamiento del equipo de salud al domicilio del usuario, familia y/o comunidad. ¿Cuál es la primera etapa de la visita domiciliaria?

Respuestas:

- **Preparación de la visita.**
- Presentación en el domicilio.
- Valoración de la familia.
- Planificación de los cuidados.

La implementación del MAIS requiere de un conjunto de acciones, procesos e instrumentos que al operar mejoren la calidad de los servicios; uno de ellos es un instrumento técnico y metodológico que permite conocer en forma gráfica a los actores sociales, el proceso vivido por los actores locales, los factores de riesgo y de protección; ambiental, estilos de vida, sanitario y biológico. ¿Cómo se denomina este instrumento?

Respuestas:

- **Mapa parlante.**
- Sala situacional.
- Diagnóstico situacional.
- Ficha familiar.

Uno de los momentos para la ejecución del diagnóstico situacional inicial de salud (DSIS) es la identificación de las necesidades y problemas de la población, los mismos que deben ser priorizados dentro de una matriz para planificar intervenciones. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la priorización?

Respuestas:

- **Magnitud, frecuencia, gravedad, factibilidad de cambio.**

- Integralidad, continuidad, participación activa, magnitud.
- Universalidad, continuidad, frecuencia, eficiencia.
- Equidad, gravedad, calidad, eficacia.

En la Estrategia Nacional de Inmunización se establece la política de frasco abierto, que indica que hay vacunas que se deben usar máximo hasta 6 horas una vez abierto el frasco. ¿Cuál de las siguientes vacunas transcurrido ese tiempo deben ser descartadas?

Respuestas:

- **BCG - SRP.**

- Influenza - Hep B.
- IPV - DPT.
- Influenza - Hep A.

En la visita domiciliaria, el enfermero comunitario al revisar el carnet de inmunización de un niño de 9 meses se da cuenta que solo se le administraron las vacunas que corresponden hasta los 2 meses. Para continuar el esquema de vacunación. ¿Qué vacunas le corresponde administrar?

Respuestas:

- **Segunda dosis de: fipV, pentavalente, neumococo.**

- Segunda dosis de: Rotavirus, fipV, pentavalente, neumococo.
- Segunda dosis de: HB, pentavalente, neumococo.
- Segunda dosis de: pentavalente, neumococo, SRP.

La cadena de frío para la conservación de las vacunas utiliza los termos, que son recipientes de pequeñas dimensiones que permiten transportar y conservar las vacunas a una temperatura de $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$, sin ser abiertos conservan la temperatura hasta 36 horas y 22.5 horas al abrirlas unas 16 veces con 2 minutos de duración cada vez que lo abra. ¿Cuáles son las recomendaciones para mantener la temperatura correcta de las vacunas dentro del termo?

Respuestas:

- **Colocar las vacunas en vasos plásticos, evitar que el agua del deshielo de los paquetes fríos moje las vacunas.**

- Llenar de agua todo el paquete frío y colocar esponjas o cualquier otro material dentro del termo.
- Mantener la tapa del termo bien cerrada para que las vacunas estén en contacto con el agua del deshielo.
- Colocar el termo a la sombra o en el lugar lo más fresco posible, evitar mantener la tapa del termo abierta.

Para disminuir el riesgo de transmisión de la tuberculosis, se recomienda que todos los establecimientos de salud dispongan de medidas administrativas, ambientales y de protección personal. ¿Cuál es una medida de control administrativo?

Respuestas:

- **Promover el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis.**

- Ventilación adecuada que permita el flujo natural de aire.
- Minimizar el uso de procedimientos que induzcan la tos en los afectados de TB.
- Recoger la muestra de esputo en ambientes con luz y ventilación natural.

Paciente de 65 años en el quinto día de hospitalización en neurología, con diagnóstico de ACV (ICTUS) isquémico. A la valoración TA= 140/80 mmHg, FC=90X', FR= 20X', SaO₂= 92% al aire ambiente. Se encuentra alerta, con hemiplejía izquierda, con labilidad emocional, con sonda vesical permeable y gasto urinario adecuado. La familia está muy preocupada por el estado del paciente. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en este caso?

Respuestas:

- **Mejorar la movilidad.**

- Evitar actividades de autocuidado.
- Valorar el estado mental, percepción, orientación, afecto y habla únicamente al egreso del paciente.
- Mantener permanentemente la piel húmeda.



Dentro de las medidas terapéuticas que realiza el profesional de enfermería están la aplicación de calor y frío. ¿Cuál es un objetivo de la aplicación de calor?

Respuestas:

- **Aumentar el aporte sanguíneo en la región tratada.**
- Reducir el metabolismo basal.
- Aliviar el dolor causado por el aumento de líquidos circulantes.
- Reducir el edema e inflamación.

¿Cuáles son los componentes del metaparadigma enfermero?

Respuestas:

- **Persona, entorno, salud, enfermería.**
- Persona, salud, entorno, teoría.
- Salud, teoría, conceptos, entorno.
- Enfermería, médicos, salud, paciente.

Como profesional de enfermería de un centro geriátrico, al valorar el estado nutricional de un paciente, identifica un IMC de 24.5. Según este dato. ¿A qué estado nutricional corresponde el adulto mayor?

Respuestas:

- **Normal.**
- Bajo peso.
- Sobrepeso.
- Obesidad I.

¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma en el adulto mayor?

Respuestas:

- **Falta de apetito, sueño, cansancio, descuido en su apariencia personal, desmotivación, ansiedad y depresión.**
- No se altera su atención y concentración en las actividades mentales como pensar, razonar y tomar decisiones.
- Su agilidad mental se no se altera y no presenta olvidos frecuentes.
- Actitud positiva hacia la persona adulta mayor dependiente (maltrato).

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Todo acto relacionado con el cuidado de la salud debe estar sustentado en el ejercicio de los siguientes principios bioéticos:

Respuestas:

- **Principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.**
- Principios de individualidad, beneficencia, integridad y justicia.
- Principio de autonomía, beneficencia, misericordia y continuidad.
- Principio de unidad, beneficencia, integridad y no maleficencia.

Según la Teoría de los Sistemas de Enfermería de Dorothea Orem. Relacione los casos que se presentan con el sistema que corresponde:

Sistemas	Casos
1. Totalmente compensador.	a. Paciente con fracturas de fémur derecho, requiere ayuda para movilizarse.
2. Parcialmente compensador.	b. Paciente ambulatorio con diagnóstico de hipertensión arterial requiere orientación sobre medicación y medidas dietéticas.
3. Apoyo educativo.	c. Paciente con Ventilación Mecánica, internado en Unidad de Cuidados Intensivos.

Respuestas:

- **1c, 2a, 3b**
- 1c, 2b, 3a.
- 1a, 2b, 3c
- 1b, 2a, 3c.



Complete el enunciado:

Hombre de 27 años con infección estafilocócica en piel, requiere aislamiento _____ con uso de _____ y batas desechables.

Respuestas:

- **de contacto – guantes.**
- de contacto – mascarilla N95.
- por gotas – mascarilla quirúrgica.
- por aire – guantes.

Hombre de 52 años con tumor cerebral, que debe someterse a una exéresis del tumor, el neurocirujano explica a profundidad el procedimiento quirúrgico, riesgos y beneficios. El paciente lee el consentimiento y firma antes de la cirugía. ¿Qué principio de la Bioética se cumple en este caso?

Respuestas:

- **Autonomía.**
- Beneficencia.
- Justicia.
- No maleficencia.

Durante la administración de un medicamento intravenoso, usted nota que se forma una sustancia blanca nebulosa en el tubo de extensión de la vía. ¿Cuál es la prioridad en la intervención de enfermería?

Respuestas:

- **Detener el flujo IV e interrumpir la administración del medicamento.**
- Pinzar el tubo de administración de la solución IV en el sitio más cercano al paciente.
- Cambiar el tubo de extensión de vía y reiniciar la infusión del medicamento.
- Consultar sobre la compatibilidad de la solución IV y el medicamento.

Paciente de 50 años, atendida en emergencia, refiere dolor a nivel abdominal y no realiza deposición hace 5 días. A la valoración presenta signos vitales dentro de parámetros normales. Le prescriben enema evacuante. ¿Cuál es la posición para realizar este procedimiento?

Respuestas:

- Sims Izquierdo.

- Decúbito ventral.
- Decúbito supino.
- Genucubital.

Paciente de 65 años, con antecedentes de Hipertensión Arterial, al momento se encuentra hospitalizado por presentar arritmia. Entre los medicamentos a administrar se encuentran: Insulina humana NPH 40 IU, Diltiazem 120 mg, Enoxaparina 40 mg y Morfina 10mg. ¿Cuál de los medicamentos administrados es un antihipertensivo?

Respuestas:

- Diltiazem.

- Insulina humana NPH.
- Enoxaparina.
- Morfina.

¿Cuál es la posición correcta para la colocación de un enema evacuante?

Respuestas:

- Sims.

- Trendelenburg.
- Decúbito ventral.
- Rossier.



Con relación a las vías de administración de medicamentos complete el siguiente enunciado:

La vía _____ se utiliza para _____. La aguja entra en la piel con un ángulo de _____.

Respuestas:

- **intradérmica – hacer pruebas de alergia – 5°-15°.**
- subcutánea – realizar pruebas de alergia – 45° o 90°.
- intradérmica – administrar insulina – 45° o 90°.
- subcutánea – administrar heparina – 5°-15°.

Los impulsos eléctricos cardíacos nacen en el nódulo sinusal para luego pasar al nódulo aurículo-ventricular. Desde allí se continúa la transmisión a través de:

Respuestas:

- **Haz de Hiss.**
- Nódulo ventricular.
- Red de Purkinje.
- Conjunto de células denominadas "P".

¿Cuáles son los mecanismos físicos principales por los que un paciente pierde calor con facilidad?

Respuestas:

- **Radiación, conducción, convección, evaporación.**
- Evaporación, condensación, ebullición, precipitación.
- Condensación, evaporación, convección, radiación.
- Cristalización, Isomerización, condensación, radiación.

Paciente de 80 años con diagnóstico de cáncer de próstata, el médico insiste que debe recibir quimioterapia, pero se niega a recibir el tratamiento. Determine el principio vulnerado por el profesional en la toma de decisiones éticas.

Respuestas:

- **Autonomía.**
- Veracidad.
- Beneficencia.
- No Maleficencia.



Seleccione el literal correcto en que se enmarca el siguiente enunciado: "Todas las unidades operativas de los tres niveles de atención establecerán mecanismos que permitan el acceso a la asistencia continua, progresiva y gratuita a todas las personas adultas mayores".

Respuestas:

- Normativa general geronto-geriátrica de las normas y protocolos de atención del adulto mayor MSP.

- Proceso continuo asistencial y progresivo del adulto mayor de las normas y protocolo del MSP.
- Objetivo general de las normas y protocolos de atención integral de salud del adulto mayor MSP.
- Independencia y autonomía de las normas y protocolos de atención integral de salud del adulto mayor MSP.

Seleccione el supuesto que guarda relación con la teoría planteada por Florence Nightingale:

Respuestas:

- Un entorno sano y favorable influye en el estado de salud físico y psíquico del hombre.

- Los métodos de asistencia deben basarse en la relación de ayuda y/o de suplencia de enfermería hacia el paciente.
- La enfermería es un proceso terapéutico interpersonal, que hace posible la salud.
- Los factores cognitivo-perceptivos motivan las actividades de promoción de la salud.

¿Cuál es su intervención al administrar un medicamento por vía intradérmica y no observar la pápula en el sitio de inyección?

Respuestas:

- Registrar el hecho según la política de la institución.

- Repetir la administración del medicamento hasta observar la pápula.
- Dar masaje en la región hasta observar la pápula.
- Aspirar para verificar la correcta administración del medicamento.



Durante su turno en la noche en un servicio hospitalario, en el momento de administrar la medicación se da cuenta que un paciente no se encuentra en su habitación; procede a buscarlo con el personal del servicio sin tener éxito. A la mañana siguiente, usted notifica este evento sin temor a represalias. ¿Cuál es la característica de notificación de eventos adversos que está aplicando?

Respuestas:

- **No punitivo.**
- Voluntario.
- Independiente.
- Confidencial.

Se indica administrar 500 ml de Lactato de Ringer en un tiempo de 24 horas. Calcular el número de gotas a administrar por minuto.

Respuestas:

- **7 gotas.**
- 8 gotas.
- 9 gotas.
- 6 gotas.

De las siguientes opciones, ¿Cuál es el cambio que se da en relación con los órganos de los sentidos en el proceso de envejecimiento?

Respuestas:

- **Disminución del sentido del gusto de los sabores dulce y salado.**
- Insensibilidad a la luz.
- Disminución del sentido del gusto de los sabores ácido y amargo.
- Aumento de células en los conductos nasales.



Durante la permanencia de la madre y el recién nacido en el establecimiento de salud, ¿Cuál es la técnica de lactancia materna que el profesional en enfermería debe enseñar a la madre?

Respuestas:

- Amamantar en posición adecuada, facilitar un buen agarre del seno, enseñar los signos de buen agarre, verificar que el niño mame bien.

- Amamantar en posición lateral, facilitar un buen agarre del seno, enseñar signos de buen agarre, verificar que el niño no duerma.
- Amamantar en posición sentada, la cabeza y cuerpo del RN están en línea curva y alineada hacia las piernas y el agarre es normal.
- Facilitar un buen agarre del seno, el recién nacido no topa el seno con el mentón para evita asfixia y la madre conserva su posición.

Seleccione los factores de riesgo laboral durante el embarazo:

- 1. Movimiento fetales, con presencia de tapon mucoso.**
- 2. Posición de pie por tiempo prolongado (más de tres horas).**
- 3. Esfuerzo físico excesivo, puede provocar daño al feto.**
- 4. Control insuficiente prenatal, tres visitas y una última a las 20 semanas.**
- 5. Exposición de agentes físicos, químicos y biológicos.**
- 6. Levantar objetos pesados.**

Respuestas:

- 2, 3, 5, 6**
- 1, 2, 3, 4
- 1, 3, 5, 6
- 1, 3, 4, 5

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



En la institución de salud donde usted labora, es responsable del manejo y distribución de las vacunas, para lo cual debe organizarlas según sus características. Por lo tanto, se requiere que seleccione solo la vacuna atenuada bacteriana. ¿Cuál de las siguientes vacunas corresponden a lo solicitado?

Respuestas:

- **BCG.**
- SRP.
- Hepatitis A.
- Hepatitis B.

En el desarrollo histórico de la práctica de la enfermería, la religión ha jugado un papel fundamental. Seleccione la orden religiosa que se ocupó del cuidado de las personas con lepra, sífilis y trastornos crónicos de la piel.

Respuestas:

- **Los Caballeros de San Lázaro.**
- Los Hermanos Alexianos.
- Las Diaconisas de Kaiserswerth.
- Los Caballeros Hospitalarios.

Ordene los pasos a seguir para la realización de un plan local de salud:

1. **Determinación de objetivos.**
2. **Programación en Salud.**
3. **Análisis de la situación.**
4. **Evaluación.**
5. **Priorización de necesidades o problemas.**
6. **Ejecución.**

Respuestas:

- **3, 5, 1, 2, 6, 4**
- 1, 3, 5, 4, 2, 6
- 2, 4, 3, 1, 5, 6
- 4, 1, 6, 2, 5, 3

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



¿Cuál es la posición correcta del paciente para mejorar la circulación?

Respuestas:

- **Trendelenburg.**
- Semi-fowler.
- Sims.
- Ginecológica.

La vacuna Pentavalente se administra a los infantes en el siguiente esquema:

Respuestas:

- **2 meses, 4 meses y 6 meses.**
- 24 horas de nacido/a, siempre y cuando el peso del recién nacido sea mayor a 2 500 gramos y no tenga ninguna patología.
- 2 meses, 4 meses, 6 meses y refuerzo al año de la última dosis.
- 2 meses y 4 meses.

Cuando un paciente experimenta dolor, el profesional de enfermería debe valorar las características del mismo, tomando en cuenta la clasificación según el tiempo de evolución del dolor y poder realizar acciones encaminadas a disminuirlo. ¿Cuál es la clasificación que se menciona?

Respuestas:

- **Agudo y crónico.**
- Somático superficial.
- Somático profundo.
- Dolor visceral.

Como profesional de enfermería, usted debe realizar una prueba cutánea de tuberculina (Prueba de Mantoux) a un paciente que se sospecha está infectado con el bacilo de Tuberculosis. ¿Qué sitio usted elige para realizar esta prueba?

Respuestas:

- **Parte interna del antebrazo.**
- Región subescapular.
- Parte superior del tórax.
- Región periumbilical.

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador para disminuir la mortalidad materna, ha establecido la estrategia del Score MAMÁ, que es aplicado en todas las unidades públicas para evaluar el riesgo obstétrico. ¿De los siguientes criterios para evaluar el riesgo obstétrico, cual no corresponde?

Respuestas:

- **Sangrado.**

- Signos vitales completos.
- Proteinuria.
- Estado de consciencia.

Con relación a la educación que el profesional de enfermería proporciona al paciente diabético. Señale el enunciado correcto:

Respuestas:

- **Observar los pies todos los días en busca de cortes, ampollas, manchas rojas y edema.**

- Indicarle al paciente insulino dependiente que no debe ingerir alimentos antes de realizar ejercicios.
- Tras la administración de insulina de acción rápida el paciente debe de esperar de 30 a 45 minutos para ingerir alimentos.
- Un mayor consumo de fibras incrementa las cifras de glucosa y hace necesario incrementar la dosis de insulina.

Un metaparadigma es un conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina. ¿Cuáles son los conceptos globales del metaparadigma enfermero?

Respuestas:

- **Persona, entorno, cuidado y salud.**

- Entorno, teorías, cuidado y enfermería.
- Cuidado, enfermería, relaciones y salud.
- Salud, persona, enfermería y cuidado.



Con relación al procedimiento de la medición de la presión arterial complete el siguiente enunciado:

El paciente no debe haber fumado ni tomado cafeína en los _____ previos a la medición. Se bombea aire en el manguito hasta que el esfigmomanómetro alcanza _____ por encima del punto en el que desapareció el pulso braquial. Se libera con cuidado la válvula de forma que la presión disminuya a un ritmo de _____ por segundo.

Respuestas:

- **30 minutos - 30 mmHg - 2 a 3 mmHg.**
- 25 minutos - 20 mmHg - 5 a 10 mmHg.
- 20 minutos - 40 mmHg - 10 a 20 mmHg.
- 15 minutos - 10 mmHg - 2 a 3 mmHg.

¿Cuál es una medida de control administrativo que aplica para la prevención de tuberculosis en el primer nivel de atención?

Respuestas:

- **En el momento de ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.**
- Minimizar el uso de procedimientos que induzcan la tos en afectados con TB bacteriológicamente positiva.
- Uso de respiradores N95 durante la toma de muestras de esputo o en el traslado de afectados con TB bacteriológica positiva.
- Entrevista con los contactos para el oportuno registro y control dentro de las 72 horas de iniciado un tratamiento antituberculoso.

Paciente acude al hospital por presentar anorexia, náuseas, vómitos, letargo, debilidad, y signos de tetania, el médico solicita exámenes de laboratorio y decide ingreso con diagnóstico de hipomagnesemia grave, para su tratamiento le indica administrar 4gr de sulfato de magnesio, usted cuenta en el servicio con una presentación de 20%/10ml. ¿Cuántas ampollas (ml) administra?

Respuestas:

- **2 ampollas (20 ml).**
- 1 ampolla (10ml).
- 1.5 ampollas (15ml).
- 0.5 ampolla (5 ml).

El Gluconato de Calcio es un fármaco muy utilizado en el servicio de Neonatología, su presentación farmacéutica es de 10 ml al 10 % y en su turno le piden administrar 125 mg IV cada 12 horas. ¿Cuál es la dosis que administra?

Respuestas:

- **1.25 ml**
- 0.5 ml
- 0.75 ml
- 1.0 ml

A la valoración física de enfermería se observa en el recién nacido: dificultad respiratoria, movimiento tóraco-abdominal, tiraje intercostal, retracción xifoidea, aleteo nasal y se escucha un quejido. ¿A través de qué escala se pueden valorar estos signos?

Respuestas:

- **Escala de Silverman-Anderson.**
- Escala de Sarnat.
- Escala de Downes.
- Escala de Apgar.

¿Cuáles son los valores normales de las constantes vitales para un adulto?

Respuestas:

- **Frecuencia cardíaca 60-100 L/min, frecuencia respiratoria 14-20 R/min, tensión arterial 120/80 mmHg, temperatura 36.5 - 37 °C y oximetría >90 %.**
- Frecuencia cardíaca 50 - 70 L/min, frecuencia respiratoria 12 - 20 R/min, tensión arterial 100/60 mmHg, temperatura 36.5 - 37 °C y oximetría >90 %.
- Frecuencia cardíaca 60 - 100 L/min, frecuencia respiratoria 14 - 22 R/min, tensión arterial 120/80 mmHg, temperatura 37 °C y oximetría < 95 %.
- Frecuencia cardíaca 60 - 120 L/min, frecuencia respiratoria 18 - 22 R/min, tensión arterial 120/80 mmHg, temperatura 36. 5 - 37 °C y oximetría > 95 %.

Seleccione la autora de la teoría de enfermería que tiene como objetivo proporcionar al paciente el mejor entorno posible para que las fuerzas de la naturaleza permitan la curación o el mantenimiento de la salud.

Respuestas:

- **Florence Nightingale.**

- Hidegard Peplau.
- Virginia Henderson.
- Doroty Johnson.

Un grupo de profesionales de enfermería en un servicio de salud, mantienen un ambiente de trabajo respetuoso y de colaboración. ¿A qué elemento del Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), se refiere el comportamiento de este grupo?

Respuestas:

- **La enfermera y sus compañeras de trabajo.**

- La enfermera y las personas.
- La enfermera y la práctica.
- La enfermera y la profesión.

¿Cuál es el orden de valoración que se realiza en la auscultación de los focos cardíacos?

Respuestas:

- **Aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral.**

- Pulmonar, aórtico, tricúspide y mitral.
- Tricúspide, pulmonar, aórtico y mitral.
- Tricúspide, mitral, pulmonar y aórtico.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Los siguientes medicamentos son parte de una de las claves en el SCORE mama. Indique en cuál de las claves: Ampicilina sólido parenteral - Ceftriaxona sólido parenteral - Clindamicina -Furosemida líquido parenteral -Gentamicina líquido parenteral - Metronidazol líquido parenteral - Paracetamol líquido parenteral - Ranitidina líquido parenteral

Respuestas:

- **Clave amarilla.**

- Clave roja.
- Clave verde.
- Clave azul

Como enfermera/o del Servicio de Urología, usted debe brindar orientaciones a pacientes que egresan con sondas permanentes. Entre las medidas dietéticas está orientar sobre el consumo de algunos alimentos que acidifican la orina para reducir el riesgo de infección de las vías urinarias. ¿Cuál de los siguientes alimentos son los adecuados para este tipo de pacientes?

Respuestas:

- **Cereales integrales y carnes.**

- Frutas y productos lácteos.
- Verduras y frutas.
- Legumbres y verduras.

Paciente gestante primigesta de 28 años, acude al centro de salud para control de su embarazo, refiere que la fecha de la última menstruación fue el 14 de mayo del 2020. ¿Aplicando la regla de Naegele, qué fecha probable de parto sería?

Respuestas:

- **21 de febrero del 2021.**

- 10 de febrero del 2021.
- 20 de febrero del 2021.
- 15 de febrero del 2021.



En un centro de salud hay varios mecanismos de bioseguridad, uno de ellos es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados que aseguran la eliminación de las formas vegetativas, pero no elimina las esporas. ¿Qué mecanismo se aplica en este caso?

Respuestas:

- Desinfección.

- Descontaminación.
- Antisepsia.
- Esterilización.

Durante la visita domiciliar a una familia nuclear, la madre refiere que su esposo le castiga a su hijo todo el tiempo y al día siguiente le lleva un regalo. Según los mecanismos adaptativos del ser humano. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que presenta el padre?

Respuestas:

- Anulación retroactiva.

- Desplazamiento.
- Formación de una reacción.
- Identificación.

Paciente de 85 años, fue dada de alta después de un evento cerebro vascular, tiene afectación neuromuscular. Egresó en compañía de la hija. ¿Cuál debe ser el plan de egreso utilizando el modelo de Dorotea Orem?

Respuestas:

- Enseñar a la paciente a utilizar los recursos adaptativos para favorecer su autosuficiencia.

- Atender a la paciente en su domicilio cada vez que tenga necesidades insatisfechas.
- Minimizar el riesgo de lesiones, utilizando compañía permanente.
- Entrenar a la hija para que realice el soporte óptimo de los sistemas afectados.

Paciente de 32 años se encuentra en la sala de emergencias obstétricas, con un embarazo de 20 semanas de gestación según FUM, presenta cefalea persistente, con una presión arterial sistólica $\geq$ de 160 mm Hg y presión arterial diastólica $\geq$ 110 mm Hg, con proteinuria $\geq$ de 300 mg en orina de 24 horas. ¿A qué patología corresponde estas manifestaciones clínicas?

Respuestas:

- **Preeclampsia grave.**

- Hipertensión gestacional.
- Hipertensión severa.
- Hipertensión crónica.

En un programa de salud donde se proponen soluciones innovadoras, la característica que es capaz de aportar nuevas ideas es:

Respuestas:

- **La creatividad.**

- Sistemática.
- Flexibilidad y dinamismo.
- Prospectividad.

En la administración de SRP. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se pueden presentar si se habla de presencia de un ESAVI grave?

Respuestas:

- **Convulsiones febriles que aparecen entre el 7mo y 12vo día.**

- Llanto persistente de 0 a 24 horas de aplicación de la primera dosis de SRP.
- Síndrome de Guillain Barré de 0 a 6 semanas de aplicación de SRP.
- Linfadenitis supurativa de 2 a 6 meses de aplicación de SRP.

Cuando el cérvix se ha dilatado entre 8 a 10 centímetros, las contracciones del útero duran de 45 a 60 segundos, con intervalo de 2 a 3 minutos. En la valoración de enfermería, al ingreso a centro obstétrico, el profesional en enfermería realiza múltiples actividades. ¿Cuál corresponde a la actividad independiente prioritaria?

Respuestas:

- Recolectar datos para la historia clínica.

- Observar el comportamiento y conducta de la madre.
- Valorar de las contracciones uterinas.
- Valorar el estado de las membranas amnióticas.

Mujer de 38 años con diagnóstico de infección de vías urinarias, refiere ardor a la micción, urgencia, nicturia y dolor agudo en la región dorsal. En este caso. ¿Cuál es la intervención de enfermería para el alivio del dolor?

Respuestas:

- Aplicación de calor en el perineo.

- Educar a la paciente a espaciar las micciones.
- Indicar a la paciente que aumente la ingestión de café o té.
- Educar a la paciente a limpiar el perineo y el meato uretral de atrás hacia delante.

Mujer de 70 años, atendida en un centro de salud. Durante la entrevista, refiere pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina por varias ocasiones al día, además, indica sensación de tener la vejiga llena. ¿Qué tipo de incontinencia urinaria refiere esta paciente?

Respuestas:

- Incontinencia urinaria por rebosamiento.

- Incontinencia urinaria de urgencia.
- Incontinencia urinaria funcional.
- Incontinencia urinaria refleja.

La mujer trabajadora (afiliada al IESS) después de haber dado a luz, tiene derecho a:

Respuestas:

- Doce semanas de licencia por maternidad y posteriormente la jornada laboral durará 6 horas hasta que la hija/o cumpla un año de edad.

- Seis semanas de licencia por maternidad y posteriormente la jornada laboral durará 6 horas hasta que la hija/o cumpla ocho meses de edad.

- Dos semanas antes y ocho semanas después de permiso de maternidad, posteriormente tendrán jornadas laborales de seis horas.

- Doce semanas después del nacimiento que pueden ser tomadas entre la madre y el padre o los dos.

¿Cuál es el orden correcto para retirar los métodos de barrera una vez utilizados?

Respuestas:

- Guantes, bata, mascarilla, protección ocular y gorro.

- Bata, guantes, mascarilla, protección ocular y gorro.

- Guantes, mascarilla, protección ocular, gorro y bata.

- Guantes, gorro, mascarilla, bata y protección ocular.

¿Cuáles son las intervenciones prioritarias del profesional enfermero/a, para el manejo de la hemorragia en el post parto inmediato?

1. Comunicación al personal pertinente.

2. Masaje uterino a través del abdomen después de la expulsión de la placenta.

3. Reanimación e inicio de maniobras de reposición de líquidos y oxigenación.

4. Realizar la tracción del cordón umbilical aplicando la contratracción por encima del pubis.

5. Monitorización e investigación de la causa de la hemorragia posparto.

6. Detección del sangrado uterino post parto.

Respuestas:

- 1, 3, 5, 6

- 1, 2, 4, 5

- 1, 4, 5, 6

- 2, 3, 4, 5



Indique dos de los principios bioéticos que forman parte del consentimiento informado:

Respuestas:

- **Autonomía y beneficencia.**
- No maleficencia y prioridad.
- Beneficencia e integralidad.
- Autonomía y equidad.

De acuerdo con sus conocimientos. ¿Cuál es la dosis de impregnación del sulfato de magnesio que indica el médico para la prevención de convulsiones en preeclampsia?

Respuestas:

- **Sulfato de magnesio 4 gramos intravenoso en 20 minutos.**
- Sulfato de magnesio 6 gramos en 10 minutos.
- Sulfato de magnesio 6 gramos intravenoso en 20 minutos.
- Sulfato de magnesio 8 gramos intravenoso en 20 minutos.

Paciente de 85 años con diagnóstico de cáncer de próstata a la valoración médica evidencia complicaciones en el cuadro clínico por posible metástasis lo cual implica un manejo terapéutico a base de quimioterapia, por las complicaciones que puedan presentarse durante el procedimiento, indica que debe conversar con sus familiares. ¿Cuál es el derecho que se encuentra vulnerado?

Respuestas:

- **Derecho a decidir.**
- Derecho a la información.
- Derecho a no ser discriminado.
- Derecho a la confidencialidad.

¿Cuál es la responsabilidad del profesional de salud con relación a los métodos anticonceptivos?

Respuestas:

- Dar información veraz sobre los métodos anticonceptivos a persona o a la pareja, quienes decidirán cuál utilizar

- Elegir el método anticonceptivo ideal para la persona o para la pareja, tomando en cuenta su experiencia y según el criterio científico.
- Indicar métodos hormonales a personas que no han tenido hijos y métodos mecánicos a quienes ya han tenido por lo menos una gesta.
- Recomendar el preservativo, porque además de ser un método anticonceptivo es el único método que evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

¿Cuál de los siguientes valores determinan una hemorragia postparto vaginal y por cesárea?

Respuestas:

- 550 mL en un parto vaginal y 1 050 mL en un parto por cesárea.

- 450 mL en un parto vaginal y 950 mL en un parto por cesárea.
- 400 mL en un parto vaginal y 900 mL en un parto por cesárea.
- 300 mL en un parto vaginal y 900 mL en un parto por cesárea.

Paciente hospitalizado de 58 años, con diagnóstico de cáncer gástrico en fase II-III, tiene indicación de tratamiento con morfina de 2.5 a 5.0 mg IV cada 4 horas. Ha recibido 2.5 mg IV hace 4 horas por un dolor puntuado como 3 en una escala de 0 a 10. Ahora, está viendo la televisión y recibe una visita de sus familiares. Cuando le preguntan por su dolor, le da una puntuación de 5. Sus constantes vitales están estables. ¿Qué intervención de enfermería es la más apropiada?

Respuestas:

- Administrar morfina, 5,0 mg IV, y volver a valorar a los 20 minutos.

- Administrar morfina, 3,5 mg IV, y pedirle que continúe mirando la televisión porque sirve de distracción para su dolor.
- Administrar 2,5 mg de morfina IV para evitar que se convierta en un adicto.
- No administrar nada en ese momento porque no tiene signos de dolor.



En el proceso enfermero comunitario. ¿Cuál es la fase en la que se identifican los problemas de la comunidad?

Respuestas:

- **Valoración.**
- Planificación.
- Ejecución.
- Evaluación.

El sistema de respuesta rápida (SRR) o claves obstétricas, está conformado por profesionales de la salud capacitados en estas claves. Cada miembro del equipo tiene funciones específicas. Si un equipo conformado por cuatro profesionales, en una institución de salud de tercer nivel de atención, da respuesta a la activación de la clave obstétrica roja. ¿Cuál es una de las funciones del Coordinador?

Respuestas:

- **Buscar la causa de hemorragia e iniciar el tratamiento.**
- Verificar permeabilidad de la vía aérea.
- Suministrar oxígeno suplementario para conseguir saturación mayor a 90 %
- Garantizar el acceso de dos vías venosas con catéter N°16 o 18, una en cada brazo.

La enfermería es una disciplina versátil que se esfuerza por satisfacer las necesidades fisiológicas, psicológicas, socioculturales, de desarrollo y espirituales de los pacientes; en el marco de la praxis los profesionales de enfermería manipulan el entorno del paciente para incluir: sonido, nutrición, higiene, luz, comodidad, socialización y esperanza. ¿A qué teoría corresponde a este enunciado?

Respuestas:

- **Teoría de Nightingale.**
- Teoría de Orem.
- Teoría de Leininger.
- Teoría de Benner y Wrubel.



En la visita domiciliaria programada por el centro de salud se encuentra una casa que no cuentan con sistemas de acueducto y alcantarillado. En la inspección se detecta escasa iluminación y ventilación, así como presencia de roedores. Si tuviera que tomar como referente una teórica en enfermería. ¿Cuál es la indicada para realizar de manera exitosa su trabajo?

Respuestas:

- **Florence Nightingale.**

- Hildegard Peplau.
- Patricia Benner.
- Ida Jean Orlando.

Las estructuras anatómicas del aparato reproductor masculino que intervienen en la espermatogénesis son:

Respuestas:

- **Los testículos.**

- Las glándulas reproductoras accesorias.
- El sistema ductal.
- El epidídimo.

Paciente de 32 años, acude a la consulta por presentar un cuadro de cuatro días de evolución, caracterizado por eritema perioral. El paciente es evaluado en un comienzo en forma ambulatoria y tratado con medidas generales y una asociación de antihistamínicos y corticoides orales. El cuadro persiste y dos días más tarde se agrega exantema de mejillas y cuello, hiperestesia cutánea y aparición de vesículas y pústulas, al examen físico presión arterial 120/70 mm Hg; frecuencia cardíaca 82 latidos/min, frecuencia respiratoria 20/min y saturación de oxígeno arterial en 98%, temperatura 37 °C. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- **00046 Deterioro de la integridad cutánea.**

- 00004 Riesgo de infección.
- 00086 Riesgo de disfunción neurovascular periférica.
- 00044 Deterioro de la integridad tisular.

¿Para planificar la atención al paciente, que aspectos valora el profesional enfermero utilizando el Patrón Funcional 1, Percepción-Manejo de salud de Marjory Gordon?

Respuestas:

- **Hábitos higiénicos, vacunaciones.**

- Condiciones de piel y mucosas.
- Funciones excretoras.
- Percepción del nivel de energía.

¿Qué es el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva?

Respuestas:

- **Es la Política Nacional que promueve la inclusión, la igualdad y el respeto de los Derechos Humanos en el marco de la Salud Sexual y Salud Reproductiva.**

- Es un plan que se genera para el control de la natalidad en el Ecuador, principalmente en edades en que se ponen en riesgo la salud de la mujer y el infante.
- Es una política nacional creada como respuesta a la violencia contra la mujer, en la que se vigila que se promueve la inclusión, la igualdad y el respeto de los Derechos Humanos.
- Es un grupo de leyes que se crearon para mujeres y hombres ecuatorianos, en el que se vigila la igualdad, equidad y el respeto a sus creencias y costumbres relacionadas con la actividad sexual.

Indique el nombre, vía y dosis de la vacuna que dentro del esquema de vacunación del Ecuador se aplica a los recién nacidos sanos durante las primeras 24 horas hasta los 11 meses 29 días.

Respuestas:

- **BCG, intradérmica, 0.05/0.1 ml.**

- HB, intradérmica, 0.05/1 ml.
- BCG, subcutánea, 0.5 ml.
- HB, intramuscular, 0.5 ml.

Al Centro de Salud tipo A, ingresa de emergencia paciente de 15 años, familiares refieren que se realizó parto domiciliario, atendido por partera, indicando que no salió la placenta por completo y presencia de sangrado en moderada cantidad. Al examen físico paciente agitada, palidez generalizada, sudoración profusa, Ecografía reporta restos placentarios, a la especuloscopia se observa restos corioplacentarios en cérvix. Signos vitales PA: 80/50 mmHg FC: 120 lpm, S02 97 % T: 36.7 °C GLASGOW 15/15 FR: 20 rpm SCORE MAMA 6, identificando un shock hipovolémico grado II. ¿Qué acción de enfermería aplicaría inmediatamente en el manejo inicial de la paciente?

Respuestas:

- **Colocar 2 vías periféricas e iniciar infusión de líquidos.**
- Realizar masaje uterino o compresión bimanual permanente.
- Transferir a paciente a un nivel de mayor complejidad.
- Tomar muestras sanguíneas en tres tubos.

Paciente de 45 años, ingresa a Emergencia con signos de shock hipovolémico por sangrado. Usted como enfermera/o canaliza una vía intravenosa de grueso calibre para reposición de líquidos. En este caso, se pueden administrar las siguientes soluciones, EXCEPTO:

Respuestas:

- **Solución Glucosada al 5%.**
- Lactato de Ringer.
- Plasma.
- Sangre.

Paciente adulto que al examen físico presenta hipertensión, refiere sensación de falta de aire y edema en miembros inferiores. Identifique el término que caracteriza la alteración del patrón respiratorio:

Respuestas:

- **Disnea.**
- Apnea.
- Polipnea.
- Eupnea.



Señale la infección de transmisión sexual que ocasiona enfermedad inflamatoria pélvica y complicaciones como la esterilidad:

Respuestas:

- **Infección por Chlamydia trachomatis.**
- Infección por Neisseria gonorrhoeae.
- Infección por condilomas acuminados.
- Infección por Sífilis.

Complete la siguiente información:

El código deontológico es el _____ sistematizado de normas que el mismo _____ disciplinar comparte y al que se _____.

Respuestas:

- **Conjunto, grupo, compromete.**
- Grupo, equipo, mantiene.
- Código, principio, juzga.
- Mecanismo, módulo, cumple.

Ordene las etapas de programación de una charla educativa:

1. Identificar objetivos y contenidos.
2. Prever la evaluación.
3. Definir áreas o bloques de necesidades educativas.
4. Definir la metodología.

Respuestas:

- **3, 1, 4, 2**
- 1, 3, 2, 4
- 2, 4, 3, 1
- 4, 2, 1, 3



En el postoperatorio inmediato de una intervención quirúrgica renal. ¿Cuál es la complicación principal que se puede producir?

Respuestas:

- Hemorragia.

- Infarto.
- Infecciones.
- Acodadura de la sonda vesical.

Al realizar la valoración de enfermería a un paciente adulto con herida penetrante en el hemitórax derecho, usted se percata que existe una marcada disminución del estado de conciencia y retracción del hemitórax afectado, inmediatamente realiza la monitorización y observa los siguientes datos: FR 30 respiraciones por minuto, FC 140 latidos por minuto, PA 70/35 mmHg y T 38.2 °C, sin embargo, a pesar de haber comprobado el correcto funcionamiento de todo el equipo, no se logra registrar el valor de la saturación de oxígeno ni de su curva pletismográfica. ¿Cuál es la causa que impide registrar este signo vital?

Respuestas:

- Disminución de la tensión arterial.

- Aumento de la frecuencia respiratoria.
- Ausencia del murmullo vesicular.
- Aumento de la temperatura.

Paciente de 52 años con diabetes mellitus tipo I, de más de 40 años de evolución, con vasculopatía y retinopatía diabética, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, usa habitualmente heparina. El personal de enfermería es el encargado de enseñar a la paciente la forma y lugar de administración de la heparina. ¿Cuál es la vía de administración de la heparina?

Respuestas:

- Vía subcutánea.

- Vía intramuscular.
- Vía intradérmica.
- Vía intravenosa.



¿Cuál es la definición de valoración como primera fase del proceso de atención de enfermería?

Respuestas:

- Proceso organizado y sistemático de recolección y recopilación de datos sobre el estado de salud de la persona.

- Definición de los diagnósticos de enfermería, como juicios clínicos, que explican y describen el estado de salud de la persona.
- Proceso para determinar la causa o etiología del problema, como juicios clínicos a partir de la valoración en forma de diagnóstico enfermero.
- Planeación de la atención de enfermería como un desarrollo de estrategias y prioridades.

En el área de Obstetricia, una paciente que está en el puerperio inmediato, presenta facies pálidas, agitación, dolor abdominal tipo cólico y loquios en escasa cantidad. La enfermera evidencia este particular, informa al médico de guardia y registra en su informe. ¿Qué concepto de pensamiento crítico muestra la enfermera?

Respuestas:

- Capacidad de análisis.

- Perseverancia.
- Integridad.
- Autoconfianza.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Seleccione las complicaciones agudas de la diabetes:

- 1. Hipoglucemia.**
- 2. Retinopatía.**
- 3. Cetoacidosis diabética.**
- 4. Nefropatía.**
- 5. Síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico.**

6. Neuropatía.

Respuestas:

- **1, 3, 5**
- 1, 4, 5
- 2, 4, 6
- 2, 3, 6

Señale uno de los principios básicos para la limpieza y desinfección hospitalaria:

Respuestas:

- **La limpieza debe comenzar por las áreas limpias y por último las áreas sucias y desde las más altas a las más bajas.**
- La limpieza debe comenzar por las áreas sucias y por último las áreas limpias para evitar la contaminación.
- La limpieza debe comenzar por las áreas más bajas a las más altas para evitar turbulencia en la habitación.
- La limpieza de las superficies es de abajo hacia arriba para que la suciedad caiga al suelo y sea lo último en recoger.



¿Cuál de las siguientes sub divisiones de la farmacología estudia la absorción, distribución, biotransformación y eliminación de las drogas?

Respuestas:

- **Farmacocinética.**

- Farmacodinamia.
- Farmacognosia.
- Farmacoterapia.

Paciente con Diabetes tipo 1, acude a la emergencia por presentar vómitos y deposiciones diarreicas por varias ocasiones, se realiza una glicemia y se evidencia 400 mg/dL. El médico le indica iniciar el tratamiento para Cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritario en este caso?

Respuestas:

- **Administrar volumen de líquidos parenterales.**

- Controlar el electrolito Na en pruebas de orina.
- Registrar ingresos en la hidratación del paciente.
- Realizar un electrocardiograma y reportar alteraciones.

Usuaría primigesta y acude a control prenatal en la última semana de embarazo según FUM, de acuerdo con el control médico, se planifica parto normal; acude a la post-consulta con el profesional de enfermería y comenta: “estoy muy preocupada y tengo miedo porque se acerca el parto, no sé cómo es esto, además me siento algo incómoda porque siento deseos de orinar a cada rato”. Seleccione los dominios alterados en la usuaria primigesta:

1. Afrontamiento y tolerancia al estrés.
2. Sexualidad.
3. Percepción/cognición.
4. Confort.
5. Seguridad/protección.

Respuestas:

- **1, 3, 4.**

- 1, 2, 5.
- 2, 4, 5.
- 2, 3, 5.



En la valoración de enfermería, paciente de 57 años refiere dolor retro esternal intenso de inicio súbito, que se irradia al brazo izquierdo y que persiste pese al reposo, la administración de O₂ por bigotera y nitroglicerina sublingual prescritos. Con relación a los antecedentes. ¿Cuál es la situación clínica del paciente?

Respuestas:

- **Infarto agudo del miocardio.**

- Insuficiencia cardiaca.
- Edema pulmonar.
- Hipertensión arterial pulmonar.

Ordene las fases de la gestión interna de los desechos sanitarios:

1. Tratamiento interno.
2. Almacenamiento interno o temporal.
3. Almacenamiento final.
4. Generación, almacenamiento primario.
5. Recolección y transporte interno.

Respuestas:

- **4, 2, 5, 1, 3**
- 2, 5, 1, 4, 3
- 5, 3, 4, 1, 2
- 4, 1, 2, 3, 5

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



De las siguientes opciones, indique uno de los pasos de la fase de ejecución en el proceso de atención de enfermería:

Respuestas:

- **Poner en práctica el plan de atención.**
- Establecer los objetivos esperados.
- Determinar el logro de los objetivos propuestos.
- Ordenar los datos sobre el estado de salud.

Para calcular la Razón de Muerte Materna (RMM); El indicador que divide para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100 000 corresponde a:

Respuestas:

- **Muertes maternas.**
- Muerte materna tardía.
- Defunción Obstétrica directa.
- Defunción obstétrica indirecta.

¿Qué intervención de enfermería se proporciona a una gestante en labor de parto, cuando la cardiotocografía muestra una frecuencia cardíaca fetal de 170 latidos por minuto?

Respuestas:

- **Administrar oxígeno.**
- Acelerar la infusión de oxitocina.
- Colocar la paciente en decúbito lateral derecho.
- Restringir la administración de líquidos intravenosos.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Complete el siguiente enunciado:

Las infecciones asociadas con la atención de salud (IAAS) se definen como _____ localizados o _____ que se producen como _____ de la permanencia o _____ de un paciente en una institución de salud que no estaba presente a su _____.

Respuestas:

- **Procesos, generalizados, consecuencia, concurrencia, ingreso.**
- Procesos, consecuencia, generalizados, concurrencia, ingreso.
- Procesos, generalizados, concurrencia, consecuencia, ingreso.
- Procesos, generalizados, consecuencia, ingreso, concurrencia.

Paciente masculino adulto atendido en emergencia, a la valoración de enfermería presenta: dolor intenso y distensión abdominal, sudoración, vómito, ictericia generalizada. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en este caso?

Respuestas:

- **Manejo del dolor.**
- Manejo del vómito.
- Valoración de ictericia.
- Manejo de líquidos



Al primer nivel de atención, acude la madre con su hijo de dos meses de edad para su respectivo control del niño sano. Establezca el orden de los pasos para el procedimiento según lo establece la Normativa del MSP:

- 1. Actividades preventivas**
- 2. signos vitales y antropometría**
- 3. Anamnesis**
- 4. Evaluación de la alimentación**
- 5. Promoción para la salud.**
- 6. Examen físico**
- 7. Evaluación del desarrollo psicomotor.**

Respuestas:

- **3, 2, 6, 7, 4, 1, 5**
- 1, 4, 3, 6, 7, 5, 2
- 2, 5, 7, 3, 1, 6, 4
- 6, 3, 2, 1, 5, 4, 7

¿Cuál es la intervención de enfermería a nivel preventivo para evitar la transmisión de la Hepatitis A?

Respuestas:

- **Instruir a las personas en las prácticas seguras en la preparación de alimentos y lavado de manos.**
- Ingerir una dieta restringida en grasas y con un aporte calórico de 2000 a 3000 kcal/día.
- Evitar la exposición frecuente a sangre, hemoderivados u otros líquidos corporales.
- Aconsejar al paciente que evite el uso de drogas IV/inyecciones.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Paciente de 22 años acude al centro de salud para solicitar información sobre planificación familiar, en la consulta refiere ser presionada por su pareja para quedar embarazada, sin embargo, indica que no se encuentra preparada para formar una familia. ¿A qué enfoque de derecho hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- Enfoque de sexualidad integral.

- Enfoque de igualdad.
- Enfoque de género.
- Enfoque de inclusión social.

Mujer de 32 años, ingresa al servicio de obstetricia con un embarazo de 34 semanas. Al interrogatorio refiere sangrado transvaginal hace 3 horas, no hay dolor, signos vitales: TA: 130/80 mmHg, T: 37 °C, FC: 96 lpm, FCF: 148 lpm. A la valoración se observa presencia de hemorragia, por lo que se decide hospitalización para control, monitoreo y tratamiento. Diagnóstico Placenta previa. ¿Cuál de las siguientes estrategias de enfermería estaría contraindicada en este momento?

Respuestas:

- Realización de una exploración vaginal.

- Reposo absoluto en cama.
- Administración de betametasona.
- Preparación para un parto por cesárea.

Paciente con diagnóstico de trombosis venosa profunda, bajo tratamiento con Heparina 25000 UI + Solución salina al 0.9% 95cc. Durante la administración debe estar pendiente de las posibles complicaciones que se presente. ¿Cuál es el principal cuidado de enfermería durante la administración?

Respuestas:

- Vigilar la presencia de sangrado.

- Controlar los valores de laboratorio.
- Administrar vitamina K.
- Colocar medias de compresión.



Ordene las etapas del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) como método científico de la profesión:

1. Evaluación.
2. Valoración.
3. Planificación.
4. Diagnóstico.
5. Ejecución.

Respuestas:

- **2, 4, 3, 5, 1**
- 1, 2, 4, 3, 5
- 2, 3, 4, 5, 1
- 1, 3, 2, 4, 5

Paciente asmática y fumadora desde hace 15 años. Al realizar la Valoración como primera etapa del Proceso de Atención de Enfermería, presenta disnea, cianosis, ruidos respiratorios adventicios, produce esputo con frecuencia y tos inefectiva. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica que usted considera para la formulación del Diagnóstico real de Enfermería con formato PES?

Respuestas:

- **Limpieza ineficaz de vías aéreas.**
- Riesgo de aspiración.
- Riesgo de asfixia.
- Deterioro de la integridad tisular.

Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el valor considerado como sobrepeso, para el Índice de Masa Corporal en adultos es de:

Respuestas:

- **25 – 29.9**
- 18.5 – 24.9
- 30 – 34.9
- 35 – 40



Paciente de 68 años, con antecedentes de Diabetes Mellitus, tiene alto riesgo de trombosis venosa y será sometida a una Safenectomía. Entre los medicamentos administrados en el pre y transquirúrgico se encuentran: Insulina humana NPH 40 IU, Enoxaparina 40 mg, Bupivacaína pesada 10 mg y Ondasetron 8 mg PRN. Todos los medicamentos administrados son considerados de alto riesgo. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Ondasetron.**

- Bupivacaína pesada.
- Insulina humana NPH.
- Enoxaparina.

Dentro de las actividades previas al alta hospitalaria, el recién nacido recibe la primera vacuna contra la tuberculosis meníngea. Usted como profesional en enfermería. ¿Qué recomendaciones da a los padres del recién nacido para el cuidado post vacunal?

Respuestas:

- **Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 3 semanas después, no se debe manipular ni colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna.**

- Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 2 semanas después, no se debe manipular ni colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna.

- Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 3 semanas después, se debe manipular colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna.

- Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 4 semanas después, no se debe manipular ni colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna.

¿Cuál referente teórica es la indicada para brindar cuidados a pacientes que presentan dificultad en la movilización y déficit en el autocuidado?

Respuestas:

- **Dorothea E. Orem.**

- Hildegard Peplau.
- Nola Pender.
- Florence Nightingale.



Paciente de 69 años, es seleccionado para participar en un estudio sobre enfermedades respiratorias. El investigador le informa que solo necesita que le conteste varias preguntas, sin darle más explicación. De acuerdo con el código de ética sobre protección del derecho del participante. ¿Qué derecho del paciente ha sido vulnerado?

Respuestas:

- Derecho a una descripción completa.

- Derecho a no recibir daño.
- Derecho a la intimidad.
- Derecho a la confidencialidad.

Paciente 46 años va a hacer intervenido de una Colelitiasis durante la valoración pre quirúrgica el valor de la Hb es menor a 7 grs/dl, o Hto. (< 35%), indican transfundir paquetes globulares STAT, el tipo de suero que puede administrarse conjuntamente con la sangre y derivado es:

Respuestas:

- Suero Fisiológico al 0.9%

- Lactato de Ringer.
- Dextrosa al 5 %
- Dextrosa al 50 %

Mujer de 36 semanas de gestación sufrió un episodio de convulsiones tónico-clónicas generalizadas con TAS $\geq$ 160 mmHg y/o TAD $\geq$ 110 mmHg. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es la más adecuada?

Respuestas:

- Mantener la vía aérea permeable y administrar oxígeno.

- Proceder a intubación endotraqueal y asistencia respiratoria mecánica.
- Iniciar el uso de glucocorticoides para la maduración fetal.
- Interrumpir de inmediato el embarazo.

Paciente ingresa a emergencia aletargado, a la valoración de enfermería presenta vómitos y dolor abdominal en cuadrante superior derecho, los medios diagnósticos indican alteración en la función hepática y hepatomegalia, los resultados del análisis muestran una intoxicación por paracetamol. ¿Cuál es el antídoto que debe preparar para revertir la acción del medicamento?

Respuestas:

- N-Acetilcisteína.

- Naloxana.
- Flumazenil.
- Vitamina K.

Paciente de 28 años, se encuentra en sala de labor de parto con un embarazo de 39 semanas más labor de parto. Está recibiendo inducción con 10 unidades internacionales de oxitocina a 16 gotas por minuto. La frecuencia cardíaca fetal se ha mantenido estable; sin embargo, la administración de este fármaco podría llevar a la paciente a una hiperdinamia uterina. ¿De qué manera afectaría al feto?

Respuestas:

- Hipoxia fetal.

- Intoxicación hídrica.
- Alcalosis metabólica.
- Daño en la retina fetal.

Paciente de 25 años que cursa 6 días de hospitalización en UCI, con ventilación mecánica asistida, como enfermero de turno, al momento de manipular la vía aérea: realiza lavado de manos frecuente, higiene oral, aspira secreciones con técnica estéril y mantiene la cabecera de la cama en una posición de 30°, con estas intervenciones de enfermería. ¿Qué complicación se previene?

Respuestas:

- Neumonía asociada a la ventilación mecánica.

- Neumonía por aspiración.
- Traumatismo de la vía aérea por presión.
- Disincronía paciente- ventilador.

Las siguientes son soluciones que la OMS ha propuesto para garantizar la seguridad del paciente. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Preparación de materiales de uso clínico y quirúrgico.**

- Comunicación mediante el traspaso de pacientes.
- Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales.
- Control de las soluciones concentradas de electrolitos.

Del siguiente listado seleccione la respuesta que contenga todas las vacunas que se administran por vía subcutánea:

1. fIPV.
2. FA.
3. DPT.
4. SRP.
5. Varicela.
6. Pentavalente.

Respuestas:

- **2, 4, 5**

- 1, 4, 6

- 1, 3, 6

- 1, 3, 5

Según la Normativa de Atención Integral de las y los Adultos Mayores en el Ecuador, las enfermedades crónicas degenerativas han aumentado en los últimos tiempos, esto muestra un perfil epidemiológico de transición característico de los países en vías de desarrollo. ¿Cuáles son las patologías crónicas degenerativas con más prevalencia en el Ecuador?

Respuestas:

- **Cardiopatías isquémicas, Hipertensión arterial, Diabetes, tumores malignos, SIDA.**

- Anemia, Enfermedades diarreicas, Malaria, Infecciones respiratorias agudas, Desnutrición crónica.
- Enfermedades inmunoprevenibles, Desnutrición global, Anemia, Infecciones respiratorias agudas.
- Anemia, VIH, Desnutrición, Infecciones respiratorias agudas y crónicas, Malaria.



“Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”. Es una definición de:

Respuestas:

- **Dorothea Orem.**
- Calista Roy.
- Marjorie Gordon.
- Hildegard Peplau.

En lo relacionado a las insulinas comercializadas, en el caso de la insulina de acción prolongada, para un correcto manejo es importante saber su farmacocinética. ¿Cuál es la duración de acción de este tipo de insulina?

Respuestas:

- **Hasta 24 horas.**
- 2 a 4 horas.
- 4 a 6 horas.
- 16 a 20 horas.

Paciente de 50 años, es atendido en emergencia. Al examen físico TA= 130/70 mmHg, FC= 110X', FR= 36X', T° =38.5°C, se encuentra intranquilo, presenta dolor torácico pleurítico, disneico, tos con expectoración mucopurulenta que le es difícil eliminar y escalofríos. Según NANDA 2021-2023. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario en este caso?

Respuestas:

- **Despeje ineficaz de las vías respiratorias R/C mucosidad M/P disnea y taquipnea.**
- Riesgo de intolerancia a la actividad R/C desequilibrio entre el aporte y demanda de O₂.
- Temor R/C entorno desconocido M/P intranquilidad.
- Hipertermia R/C enfermedad M/P taquicardia.

¿Cuál de los elementos es una habilidad del pensamiento crítico para la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería?

Respuestas:

- Uso del conocimiento.

- Perseverancia.
- Independencia.
- Confianza.

¿A qué aislamiento corresponde un paciente que llega al servicio con diagnóstico de Celulitis?

Respuestas:

- Aislamiento por contacto.

- Aislamiento por aire.
- Aislamiento por gotas.
- Aislamiento estándar.

¿A qué hace mención el siguiente enunciado?: "Es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que al complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad – el entorno, permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud".

Respuestas:

- MAIS - FCI.

- Determinantes de Salud.
- Atención Primaria de Salud.
- Estrategia de Desarrollo Integral Infantil.



¿Cuáles son los cuidados de enfermería sobre signos de alarma que la madre debe conocer sobre su recién nacido y por los que debe regresar de inmediato a la unidad de salud?

Respuestas:

- Se mueve poco, no puede lactar, vomita todo lo que come, está muy caliente o frío, no respira o le cuesta respirar, tiene secreción purulenta en los ojos o el ombligo, hay sangre en las heces, esta irritable, presenta ictericia o cianosis.

- Presenta ictericia o cianosis, se mueve mucho, no puede lactar, vomita todo lo que come, está muy caliente o frío, no respira o le cuesta respirar, tiene secreción purulenta en los ojos o el ombligo, hay sangre en las heces, está irritable.

- Puede lactar, se mueve poco, vomita todo lo que come, está muy caliente o frío, no respira o le cuesta respirar, tiene secreción purulenta en los ojos o el ombligo, hay sangre en las heces, está irritable, presenta ictericia o cianosis

- Ausencia de secreción purulenta en los ojos o el ombligo, se mueve poco, no puede lactar, vomita todo lo que come. Está muy caliente o se pone frío, no respira o le cuesta respirar, hay sangre en las heces, está irritable, presenta ictericia o cianosis.

Según la normativa del MSP, seleccione las actividades que se realizan en el cuidado del recién nacido en alojamiento conjunto:

1. Alimentación inicial-lactancia materna.
2. Preparación del personal y equipos.
3. Profilaxis ocular.
4. Profilaxis con vitamina K.
5. Recepción del Recién nacido.
6. Examen físico.

Respuestas:

- 1, 3, 4, 6.

- 1, 2, 3, 5.

- 1, 4, 5, 6.

- 2, 3, 4, 6.

Para calentar a un recién nacido hipotérmico, se debe ajustar la temperatura de la incubadora por encima de la temperatura axilar del RN, en un máximo de:

Respuestas:

- **1 °C**
- 1.5 °C
- 2 °C
- 2.5 °C

Se debe administrar 500 ml en bolo, luego mantener a 40 ml/h hasta completar un volumen total de 1000 cc de la solución salina en 12 horas. Indique a cuántas gotas por minuto se debe administrar la solución indicada.

Respuestas:

- **14 gotas.**
- 12 gotas.
- 15 gotas.
- 16 gotas.

Al trasladar a un paciente de la cama a la silla usted percibe que el paciente presenta síntomas de mareo. ¿Qué se debe hacer en esta situación?

Respuestas:

- **Dejar al paciente sentado en la cama con los pies colgando por unos minutos antes de continuar.**
- Regresar el paciente a la posición inicial de decúbito y no movilizarlo más.
- Trasladar rápidamente al paciente para la silla y minimizar el traslado.
- Notificar al médico de los síntomas ocasionales de mareo en la movilización.



Padre viene a la unidad de salud con su hijo de 1 año 6 meses, para que le administren los refuerzos de las vacunas DPT y vacuna bivalente oral contra la Polio (bOPV). Al cabo de 24 horas presenta un evento supuestamente atribuible a la vacunación como es un ligero salpullido alérgico y congestión nasal. ¿Qué cuidados de enfermería debe realizar ante un ESAVI común?

Respuestas:

- **Verificar el sitio propio de colocación de la vacuna, observar si hay reacción local, dolor, edema y eritema, averiguar a los padres del niño si presentó fiebre, irritabilidad y malestar general.**

- Observar si hay reacción local, dolor, edema y eritema, averiguar a los padres del niño si presentó fiebre, irritabilidad, malestar general y enfermera prescribió medicación.

- Verificar el sitio propio de colocación de la vacuna, no se observa reacción local, dolor, edema y eritema, se averigua a los padres del niño si presentó fiebre, irritabilidad y malestar general.

- Verificar el sitio propio de colocación de la vacuna, observar si hay reacción local, dolor, edema y eritema, padres del niño manifestaron que no presentó fiebre, irritabilidad y malestar general.

De acuerdo con los criterios de valoración por patrones funcionales de salud. Identifique los aspectos que debe preguntar para valorar el patrón de percepción - manejo de la salud.

Respuestas:

- **Problemas con el alcohol, tabaco, drogas.**

- Problemas para conciliar el sueño o descansar.

- Problemas en su ingesta, condiciones de la piel.

- Problemas conductuales y en su imagen corporal.

Seleccione los cuidados de enfermería en un paciente colostomizado.

- 1. Evaluar la irritación de la piel periestomal con cada cambio de dispositivo.**
- 2. Comunicar al cirujano si el estoma tiene un color rojo.**
- 3. Cambiar la bolsa de ostomía cada 24 a 48 horas si la piel periestomal está eritematosa.**
- 4. Limpiar la piel periestomal utilizando yodopovidona y luego secar.**
- 5. Valorar la cantidad, color, olor y consistencia de las heces.**
- 6. Vaciar y cambiar la bolsa de ostomía en la cama del paciente.**

Respuestas:

- 1, 3, 5**
- 2, 4, 6
- 3, 4, 6
- 2, 3, 5

¿Cuáles de los siguientes aspectos debe tener en cuenta al valorar el riesgo de úlcera por presión según la escala de Braden?

- 1. Respuesta verbal.**
- 2. Percepción sensitiva.**
- 3. Nutrición.**
- 4. Apertura ocular.**
- 5. Fuerza de cizallamiento.**
- 6. Caída previa.**

Respuestas:

- 2, 3, 5.**
- 1, 2, 4.
- 1, 3, 6.
- 4, 5, 6.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Paciente que se confirma diagnóstico de Tuberculosis se decide iniciar tratamiento de TB Sensible. Seleccione la dosis de la fase inicial y la fase de consolidación para este caso:

Respuestas:

- **50 dosis HRZ (2 meses) y 100 dosis HR (4 meses).**
- 50 dosis HRZ (2 meses) y 80 dosis HR (4 meses).
- 55 dosis HRZE (3 meses) y 75 dosis HR (3 meses).
- 75 dosis HRZ (3 meses) y 175 dosis H (3 meses).

Señale el primer eslabón en la cadena de supervivencia en el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario.

Respuestas:

- **Reconocimiento del paro cardíaco y activación del sistema de emergencia.**
- RCP de alta calidad.
- Desfibrilación rápida.
- Soporte vital avanzado.

Leonor es una paciente de 27 años quien fue víctima de casi ahogamiento en agua salada, presenta la lengua seca, edema generalizado, pulso de 92 lpm y presión arterial de 140/90 mmHg. Al recibir los resultados del análisis de electrolitos en sangre, usted observa que el sodio se encuentra en 155 mEq/L. ¿Cuál de los siguientes desequilibrios electrolíticos tiene la paciente?

Respuestas:

- **Hipernatremia**
- Hiponatremia
- Hiperpotasemia
- Hipopotasemia

A qué reflejo corresponde el siguiente enunciado: Durante la valoración neurológica minuciosa del recién nacido, se espera como respuesta un estímulo propio de tres movimientos: extensión y aducción de los brazos, abertura de la mano y llanto que desaparecen hacia el tercer mes.

Respuestas:

- Reflejo del moro.

- Reflejo de Babinski.
- Reflejo de presión.
- Reflejo de puntos cardinales.

Con relación a las intervenciones de enfermería a un paciente que dispone de un catéter para monitoreo de la presión venosa central (PVC). Señale el enunciado correcto.

Respuestas:

- Valorar sitio de inserción del catéter para detectar signos de infección.

- Realizar limpieza y curación del sitio de inserción del catéter en cada turno.
- Confirmar la ubicación del catéter mediante tomografía computarizada.
- Realizar mediciones de PVC con la cabecera de la cama elevada a 90°.

Seleccione las características que corresponde al lavado de manos con agua y jabón antiséptico:

1. Se usa para reducir la flora residente y eliminar la flora transitoria presente en la piel.
2. Se usa para eliminar en forma significativa tanto la flora transitoria como la residente presente en las manos.
3. Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico por microorganismos presentes en las manos del equipo quirúrgico.
4. Remover la flora transitoria y la suciedad moderada de las manos. No tiene acción sobre la flora residente.
5. Duración de 20-30 segundos.
6. Duración de 40-60 segundos.

Respuestas:

- 2, 6

- 1, 5
- 3, 6
- 4, 5



Mujer de 60 años, acude a consulta externa, manifiesta que tras haber iniciado tratamiento para la hipertensión arterial, con fármaco que no especifica, presenta edema de miembros inferiores. ¿Cuál de los siguientes medicamentos, produce este efecto secundario?

Respuestas:

- **Amlodipino.**

- Enalapril.
- Labetalol.
- Losartán.

Paciente de 25 años, al realizar el control de las medidas antropométricas se determina un IMC de 28.6. ¿Cuál es su estado nutricional?

Respuestas:

- **Sobrepeso.**

- Obesidad.
- Normal.
- Obesidad mórbida.

"Un juicio clínico sobre las respuestas de una persona o grupo a procesos vitales, problemas de salud reales o potenciales que proporciona la base de los cuidados para el logro de los objetivos, de los que enfermería es la responsable". Esta definición pertenece a:

Respuestas:

- **Diagnóstico de Enfermería.**

- Proceso de Atención de Enfermería-PAE.
- Cuidado de Enfermería.
- Problema de Enfermería.



En sala de Centro Obstétrico se encuentra hospitalizada paciente de 23 años, cursa con embarazo de 30 semanas de gestación, por FUM; presenta un cuadro clínico de 3 horas de evolución, caracterizado por cefalea intensa. Signos vitales: PA: 150/110 mmHg FC: 92 lpm, SaO₂ 99% T: 36.7 °C GLASGOW 15/15 FR: 20 rpm, PROTEINURIA ++, SCORE MAMA 5. Se prescribe impregnación con sulfato de magnesio 4 gramos + 80ml de cloruro de sodio 0.9% intravenosa en 20 minutos, luego sulfato de magnesio 10 gramos+ 450ml cloruro de sodio 0.9% a 50ml/hora para mantenimiento. De acuerdo a la situación presentada ¿Qué acción prioritaria de enfermería aplicaría durante la vigilancia del uso de sulfato de magnesio?

Respuestas:

- **Controlar y registrar la diuresis.**
- Disminuir el consumo diario de sal.
- Control de score mama cada 12 horas.
- Valorar el estado de conciencia.

Seleccione las manifestaciones clínicas de la deshidratación grave en un niño de 3 años:

1. Letárgico o inconsciente.
2. Signo del pliegue vuelve lentamente.
3. Signo del pliegue vuelve muy lentamente.
4. Irritable e intranquilo.
5. Bebe ávidamente, con sed.
6. Bebe mal o no puede beber.

Respuestas:

- **1, 3, 6**
- 2, 4, 5
- 3, 5, 6
- 1, 2, 4

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

¿Cuál de los subsistemas del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), incluye los síndromes y enfermedades de alta capacidad de transmisión?

Respuestas:

- **SIVE - Alerta.**
- SIVE-Especializado.
- SIVE-Hospital.
- SIVE-Mortalidad.

Paciente de 26 años ingresa al servicio de terapia intensiva con diagnóstico de trauma craneoencefálico grave. Durante la valoración usted observa salida de líquido cefalorraquídeo por conducto auditivo externo. ¿Cuál es la alteración que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Otorraquia.**
- Otorrea.
- Otalgia.
- Otorragia.

Paciente con diagnóstico de esquizofrenia con tratamiento de Haloperidol, vía oral cada 8 horas. Durante su turno se presenta un error con el medicamento, al administrar en su lugar Alopurinol. Por lo tanto, usted decide libremente notificar este evento. ¿Cuál es el sistema de notificación que está aplicando en este caso?

Respuestas:

- **No punitivo.**
- Confidencial.
- Independiente.
- Capacidad de respuesta.



Las complicaciones que pueden presentar en el puerperio son la hemorragia y el shock hipovolémico, frente a esto los cuidados de enfermería que se deben realizar y que irán encaminados a vigilar para prevenirlos son: la monitorización de constantes vitales, administración de fármacos, palpación del fondo uterino, control de diuresis, valoración de las mamas y la aparición de loquios. ¿A qué clase de puerperio corresponden estos cuidados de enfermería?

Respuestas:

- **Puerperio inmediato.**

- Puerperio mediato.
- Puerperio tardío.
- Reacción psicológica.

Paciente de 54 años, sometida a una Cistopexia bajo anestesia raquídea hace 24 horas, ha permanecido en cama por temor a caerse. Al realizar la valoración de enfermería usted observa distensión abdominal y la paciente refiere dolor abdominal. En este caso. ¿Cuál de las siguientes intervenciones sería la primera opción para aliviar estas molestias y prevenir íleo posoperatorio?

Respuestas:

- **Iniciar la deambulación.**

- Aplicar enema evacuante.
- Administrar laxante.
- Colocar sonda rectal.

Al tomar los signos vitales como parte de la valoración de enfermería, usted se percata en la curva térmica que el valor de la temperatura del paciente ha estado con grandes oscilaciones durante el día, en ocasiones desciende a valores de hasta 36.7 °C para luego ascender nuevamente hasta 38.5 °C. Según la forma del patrón febril. ¿Qué tipo de fiebre tiene el paciente?

Respuestas:

- **Fiebre intermitente.**

- Fiebre continúa.
- Fiebre remitente.
- Fiebre recurrente.



Un niño de 4 años que al momento de bañarle su madre observa la presencia de manchas rojizas en todo el cuerpo, por lo que acude al centro de salud e indica fiebre, conjuntivitis, coriza, tos, manchas de Koplik. Usted como profesional de Enfermería debe identificar la alteración que presenta el niño. ¿Qué tipo de enfermedad eruptiva hace referencia el caso?

Respuestas:

- **Sarampión.**

- Tétanos.
- Tosferina.
- Varicela.

Una paciente con quemaduras de II grado en el 90 % de su cuerpo, incluido labios y hemicara izquierda, tiene mucho dolor por lo que resulta complicado hacerle cambio de posición. Presenta: taquipnea, diaforesis, se siente caliente, tiene escalofrío, es imperativo tomarle la temperatura. ¿Qué zona del cuerpo es más conveniente para tomar la temperatura, en este caso?

Respuestas:

- **Oído.**

- Oral.
- Rectal.
- Axilar.

Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables que se encuentran vinculadas. ¿A cuál hipótesis hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- **Correlacionales.**

- Descriptivas.
- De diferencia de grupos.
- De causalidad.



Paciente permanece en el servicio de ginecología con diagnóstico de Eclampsia bajo tratamiento con sulfato de magnesio, a la valoración de enfermería se observa alteraciones en la frecuencia respiratoria, bradicardia y disminución en la diuresis. El médico indica que se trata de una intoxicación por el medicamento administrado. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería prioritarios de acuerdo al caso?

Respuestas:

- **Gluconato de calcio, una ampolla de 1g IV lento y oxígeno a 4 L/min por catéter nasal o 10 L/min por máscara.**

- Preparar manejo de vía aérea con intubación y asistencia respiratoria.
- Monitorizar signos vitales y preparar solución salina para administrar el antídoto.
- Administrar el antídoto en bolo y monitorizar la frecuencia respiratoria.

Recién nacido que durante el examen físico presenta taquipnea, aleteo nasal, tiraje intercostal marcado y quejido respiratorio. Usted como personal de enfermería debe utilizar una escala de valoración para identificar alteración en el patrón respiratorio y realizar sus intervenciones. ¿Cuál es la escala que utiliza para este caso?

Respuestas:

- **Escala de Silverman - Anderson.**

- Escala de Apgar.
- Escala de Capurro.
- Escala de Sarnat.

De acuerdo al ciclo de manejo de la gestión de desechos sólidos en las instituciones de salud, existen algunos sitios de almacenamiento. ¿Cuál es la denominación del centro de acopio temporal de desechos hospitalarios?

Respuestas:

- **Almacenamiento intermedio.**

- Almacenamiento de generación.
- Almacenamiento primario.
- Almacenamiento final.



Durante la visita domiciliar a pacientes de la comunidad, usted detecta una familia con poco acceso a servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, lo que dificulta mantener un entorno saludable para su recuperación. Su intervención debe basarse en un modelo de Enfermería. ¿Qué teorizante utilizaría para este caso?

Respuestas:

- Florence Nightingale.

- Nola Pender.
- Virginia Herderson.
- Hildegart Peplau.

Paciente de 78 años, ingresado por neoplasia de pulmón en estadio final, se encuentra estuporoso, con oxígeno suplementario a 3 litros por minuto por bigotera. Los signos vitales muestran los siguientes datos: TA 50/40 mmHg, temperatura 37.2° C, respiración 32 rpm y saturación de oxígeno sin lectura en el oxímetro de pulso. ¿Cuál es la causa por la cual el oxímetro de pulso no registra la lectura de la saturación con base en los signos vitales del paciente?

Respuestas:

- Hipotensión arterial.

- Taquipnea.
- Disminución del estado de conciencia.
- Alteración de la frecuencia cardíaca.

El Primer Nivel de Atención tiene como objetivo ser reconocido por la población como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud y contar con servicios de salud articulados a la Red Pública y Complementaria de Salud. Identifique, ¿Cuáles son las Modalidades de Atención Integral en este Primer Nivel?

Respuestas:

- Atención extramural y atención intramural.

- Atención de promoción y atención de prevención.
- Atención a población priorizada y atención a población cautiva.
- Atención de curación y atención de rehabilitación.



Paciente de 35 años, tiene Rh negativo y ha dado a luz una niña con Rh positivo, por lo que está prescrita la administración de inmunoglobulina anti Rh. ¿Cuáles son las precauciones a seguir en la administración de este medicamento?

Respuestas:

- Utilizar siempre la vía venosa y administrar a la mamá.

- Administrársela a la mamá y al bebé por ser niña.
- Administrar simultáneamente con la vacuna de la rubéola.
- Las mismas que para transfundir sangre.

Al valorar al recién nacido, la piel está cubierta por una sustancia de color blanquecino, oleosa, que contiene células en descamación y grasa, además desaparece en 48 horas, se conoce como:

Respuestas:

- Vénix caseoso.

- Lanugo fetal.
- Millium facial.
- Mancha mongólica.

¿Cuál es la escala de valoración utilizada para medir el dolor?

Respuestas:

- Escala visual análoga.

- Escala de Aldrete.
- Escala de Cincinnati.
- Escala de Bromage.

Mujer gestante de 25 años, acude por primera vez al Centro de Salud para el control prenatal. Se dirige al área de estadística para la apertura de la historia clínica, durante la atención, el personal de enfermería prepara y educa sobre la importancia del uso del carnet prenatal como un documento que propicia el control de seguimiento durante el embarazo. ¿Cuáles son los datos que registra el personal de enfermería en el carnet prenatal?

Respuestas:

- **Datos generales de la mujer embarazada, registro de valores de presión arterial, peso, talla y vacuna antitetánica si tiene o no.**

- Registro de valores de presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y vacuna antitetánica si tiene o no.

- Datos generales de la mujer, registro de presión arterial, índice de masa corporal y vacuna antitetánica si tiene o no.

- Datos generales de la mujer embarazada, toma de peso, talla, índice de masa corporal y vacuna antitetánica si tiene o no.

En la valoración a un adulto mayor con disminución de agudeza auditiva, en la entrevista, usted debe preguntar sobre los siguientes aspectos, EXCEPTO:

Respuestas:

- **Valores de la audiometría.**

- Presencia de cerumen.

- Utilización de medicamentos ototóxicos.

- La frecuencia de limpieza del conducto auditivo.

De las siguientes opciones, seleccione las especificaciones técnicas del brazalete que se recomienda:

1. Fabricados en polipropileno, antialérgicos e inocuos para el paciente.

2. Rígido, con bordes bien acentuados.

3. Cierre de fácil manipulación.

4. Rotulado con cualquier tipo de tinta.

5. Resistente a la tensión y ruptura en cualquier dirección.

6. Imposibilidad de reutilización tras la rotura del cierre de seguridad.

Respuestas:

- **1, 5, 6**

- 2, 3, 5

- 1, 3, 4

- 2, 4, 6



Relacione los trastornos hipertensivos del embarazo con sus respectivos criterios de clasificación y definición:

TRASTORNO HIPERTENSIVO	CRITERIO
1. Hipertensión gestacional.	a. TAS $\geq$ 160 mmHg y/o TAD $\geq$ 110 mmHg y uno o más criterios de gravedad y/o afectación de órgano blanco.
2. Preeclampsia con signos de gravedad.	b. Desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas Y/o coma, no atribuibles a otras patologías, o condiciones neurológicas.
3. Eclampsia.	c. TAS $\geq$ 140 mmHg Y/O TAD $\geq$ 90 mmHg, presente a partir de las 20 semanas de gestación y ausencia de proteinuria.

Respuestas:

- 1c, 2a, 3b.
- 1a, 2b, 3c.
- 1b, 2c, 3a.
- 1c, 2b, 3a.

La extracción de sangre capilar en un niño de 6 meses debe realizarse en:

Respuestas:

- Las partes externas del talón.
- Los dedos de la mano.
- Los dedos de los pies.
- El lóbulo de la oreja.



Paciente ingresa al servicio de emergencia a causa de un accidente de tránsito, mientras viajaba como conductor, a la valoración de enfermería consciente álgico con presencia de aleteo nasal, disnea, uso de los músculos respiratorios y deformidad de la pared torácica. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería principal para este caso?

Respuestas:

- Patrón respiratorio ineficaz.

- Deterioro del intercambio de gases.
- Riesgo de confusión aguda.
- Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.

Señale la característica de la fase de evaluación del Proceso de Atención de Enfermería:

Respuestas:

- Determinar los objetivos y los resultados esperados.

- Identificar los problemas del paciente.
- Establecer los objetivos de los cuidados.
- Realizar las acciones de enfermería.

Indique la dosis, edad y vía de administración de la vacuna de la Fiebre Amarilla:

Respuestas:

- Una dosis, SC, a los 12 meses de edad.

- Dos dosis, SC, a los 6 y 12 meses de edad.
- Una dosis, IM, a los 6 meses de edad.
- Dos dosis, IM, a los 12 meses de edad.

Paciente de 48 años, en postoperatorio mediato de colostomía, en el examen físico se identifica: deterioro de la integridad cutánea relacionado con la irritación de la piel periestomática por el líquido intestinal. ¿Cuál es la intervención principal de Enfermería?

Respuestas:

- Cuidados de la piel circundante al estoma.

- Valorar las características del estoma.
- Educar sobre dieta postcolostomía.
- Controlar ingresos y egresos de líquidos.



Seleccione la respuesta correcta en base a los órganos internos del aparato reproductor femenino:

Respuestas:

- **Útero, trompas de Falopio, vagina, ovarios.**
- Útero, trompas de Falopio, ovario, clítoris.
- Útero, trompas de Falopio, labios mayores, ovarios.
- Útero, trompas de Falopio, vagina, periné.

¿Qué dispositivo de administración de oxígeno corresponde a un sistema de flujo alto?

Respuestas:

- **Mascarilla Venturi.**
- Sonda bucofaríngea.
- Mascarilla de reciclamiento parcial.
- Mascarilla simple.

En el tratamiento del dolor. ¿Cuáles son los medicamentos que conforman la tercera escala según la OMS?

Respuestas:

- **Fentanilo, morfina.**
- Paracetamol, acetaminofén.
- Diazepam, codeína.
- Metamizol, ibuprofeno.

Complete el enunciado:

Cuando las manos estén visiblemente sucias, la técnica de lavado tiene una duración mínima de ____ a ____ segundos y sigue ____ pasos estandarizados.

Respuestas:

- **40 - 60 - 11**
- 20 - 30 - 8
- 40 - 60 - 8
- 20 - 30 - 11

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Seleccione los cuidados que el paciente necesita para la preparación de la resonancia magnética.

- 1. Informar al paciente que no debe consumir alimentos durante al menos 1 hora antes del estudio.**
- 2. Después del examen tiene que ingerir abundantes líquidos para eliminar los agentes de contraste.**
- 3. Antes de que ingrese al examen se le indicará que debe retirarse todos los objetos metálicos.**
- 4. Informar al paciente que suspenda los medicamentos con complementos de hierro.**
- 5. Obtener información del paciente sobre antecedentes alérgicos o si tiene insuficiencia renal.**

Respuestas:

- 1, 3, 4
- 2, 3, 4
- 1, 3, 5
- 2, 4, 5

Seleccione los factores de riesgo de sepsis neonatal de inicio temprano:

- 1. Intubación endotraqueal del Recién Nacido.**
- 2. Fiebre materna.**
- 3. Colocación de catéter umbilical.**
- 4. Colonización de bacterias del tracto genital materno.**
- 5. Alimentación parenteral.**
- 6. Ruptura prematura de membranas mayor a 18 h.**

Respuestas:

- 2, 4, 6
- 2, 3, 5
- 1, 3, 4
- 1, 5, 6

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



El alojamiento conjunto favorece el contacto precoz y la lactancia materna exclusiva, por lo que los profesionales en Enfermería deberán estar atentos a complicaciones del recién nacido debido a la edad gestacional, estado nutricional, patología congénita, trauma, sospecha de infección, además de:

Respuestas:

- **Adaptación respiratoria y térmica.**

- Salida de meconio.
- Ictericia fisiológica.
- Vértex caseoso.

Paciente hospitalizado presenta picos febriles entre 39 °C y 40 °C a las 16 horas de su hospitalización la temperatura desciende a los 36.5 °C. ¿Cuál es el patrón de fiebre?

Respuestas:

- **Intermitente.**

- Continua.
- Remitente.
- Recurrente.

Relacione las teorizantes con sus correspondientes postulados:

TEORIZANTES	POSTULADOS
1. Florence Nightingale	a) Desarrollar la interacción entre la enfermera y el paciente.
2. Hildegard Peplau	b) Cuidar y ayudar al paciente a alcanzar autocuidado total.
3. Dorothea E. Orem	c) Ayudar al paciente a ganar independencia tan pronto como sea posible y a ganar fuerza cuando le falte.
4. Virginia Henderson	d) Facilitar el proceso recuperador del cuerpo manipulando el entorno del paciente.

Respuestas:

- **1d, 2a, 3b, 4c.**

- 1d, 2b, 3a, 4c.
- 1c, 2d, 3a, 4b.
- 1a, 2b, 3c, 4d.



Como profesional de enfermería usted atiende a un paciente con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II, con tratamiento de Insulina. ¿Cuál es el orden correcto de las actividades preprandiales?

Respuestas:

- **Análisis de glicemia capilar - inyección de insulina - ingerir alimentos.**
- Ingerir alimentos - análisis de glicemia capilar - inyección de insulina.
- Ingerir alimentos - inyección de insulina - análisis de glicemia capilar.
- Análisis de glicemia capilar - ingerir alimentos - inyección de insulina.

Debemos sospechar una Hemorragia digestiva alta ante todo paciente que presente:

Respuestas:

- **Hematemesis y melena.**
- Hiperémesis y diarreas.
- Hematemesis y diarrea.
- Hemoptisis y melena.

Los profesionales de enfermería tienen la mente abierta hacia la consideración de métodos diferentes de hacer diversas técnicas, no solo las que aprendieron en la facultad. No se ven influidos fácilmente por las opiniones de otros, sino que mantienen la responsabilidad sobre sus propios puntos de vista. ¿Cuál es la actitud al que se hace referencia?

Respuestas:

- **Independencia.**
- Imparcialidad.
- Integridad.
- Perseverancia.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Seleccione las manifestaciones sospechosas de sífilis congénitas tempranas en el recién nacido:

1. Rinorrea sanguinolenta.
2. Gomas en pie.
3. Queratitis intersticial.
4. Erupción maculopapular.
5. Nariz en silla de montar.
6. Linfadenopatía generalizada.
7. Trombocitopenia.

Respuestas:

- **1, 4, 6, 7**

- 2, 4, 5, 7

- 2, 3, 5, 6

- 3, 5, 6, 7

Usted como enfermero/ra, está aplicando inmunizaciones a niños menores de cinco años. Seleccione la acción para la salud de acuerdo al modelo de Leavell y Clark:

Respuestas:

- **Prevención primaria.**

- Prevención secundaria.

- Prevención terciaria.

- Prevención de riesgos.

Paciente adulto mayor es trasladado a urgencias en ambulancia por presentar caída de gran altura, producto del trauma presenta fractura abierta de pelvis. A su llegada se observa letargia, palidez, TA: 80/50mmHg, FC:150X', FR: 38X'. ¿Cuál es la principal intervención de enfermería en este caso?

Respuestas:

- **Canalizar vía periférica para transfundir líquidos.**

- Valorar el estado neurovascular del miembro afectado.

- Colocar inmovilización del miembro afectado.

- Colocar una sonda foley para medir gasto urinario.



¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?

Respuestas:

- Frecuencia cardíaca por volumen sistólico.

- Frecuencia cardíaca por volumen diastólico.
- Frecuencia cardíaca por volumen cardíaco.
- Frecuencia cardíaca por volumen sanguíneo.

Paciente de 86 años, acude a un centro de salud para control de la hipertensión. La enfermera que lo atiende, al observar que es un adulto mayor le mantiene en espera por más de 2 horas. En este caso. ¿Qué principio del Sistema Nacional de Salud se vulnera?

Respuestas:

- Solidaridad.

- Eficiencia.
- Universalidad.
- Participación.

Identificar los objetivos de una adecuada nutrición en la mujer durante el periodo preconcepcional y embarazo:

1. Promover la ganancia adecuada de peso.
2. Realizar ejercicio diariamente.
3. Reducir el riesgo de anomalías congénitas.
4. Planificar alimentos tres veces al día.
5. Prevenir deficiencias nutricionales.
6. Evitar el alto consumo de condimentos.

Respuestas:

- 1, 3, 5

- 2, 4, 6
- 3, 5, 6
- 1, 2, 4

Durante el examen físico del recién nacido se debe buscar signos que puedan indicar complicaciones en su salud, uno de los signos que se valora detenidamente es la ictericia. ¿Cuál de los siguientes signos puede ayudarnos a inferir si la ictericia es fisiológica o patológica?

Respuestas:

- **Tiempo de aparición y zonas afectadas.**

- Actividad motora e irritabilidad.
- Disminución del apego y rechazo a la lactancia materna.
- A mayor peso, menor riesgo de aparición.

Para establecer las causas de un evento centinela que ha ocurrido en el hospital, debe aplicar el diagrama causa-efecto o espina de pescado de Ishikawa. Ordene los pasos en forma secuencial que necesita para realizar este procedimiento:

1. Interpretar el diagrama.
2. Seleccionar el evento centinela.
3. Encontrar las causas de las causas.
4. Enumerar las posibles causas.

Respuestas:

- **2, 4, 3, 1**

- 1, 3, 4, 2
- 4, 1, 2, 3
- 3, 4, 1, 2

De las siguientes contraindicaciones para la administración de la vacuna BCG. ¿Cuál de ellas no corresponde?

Respuestas:

- **Recién nacido por cesárea.**

- Recién nacido o prematuros con peso menor 2500grs.
- Recién nacido con enfermedad infecciosa aguda grave.
- Recién nacido que tienen inmunidad comprometida por VIH.



Seleccione los cuidados de enfermería específicos en pacientes que reciben medicación diurética:

Respuestas:

- **Vigilar signos de desequilibrio electrolítico e hipotensión postural.**
- Vigilar presencia de disnea y edema periférico.
- Vigilar la presencia de latido cardíaco irregular y edema.
- Vigilar la presencia de lipotimias, náuseas y vómitos.

Según el registro estadístico de nacidos vivos y defunciones del INEC. ¿Cuál es la principal causa de muerte en niños menores de un año en el 2018?

Respuestas:

- **Dificultad respiratoria del recién nacido.**
- Neumonía.
- Sepsis bacteriana del recién nacido.
- Malformaciones congénitas del corazón.

Paciente primigesta de 6 semanas de gestación llega a la emergencia ginecológica del Hospital, por presentar cólico menstrual y hemorragia acompañada de coágulos, a la valoración de los exámenes de laboratorio se aprecia concentraciones séricas hCG elevadas. ¿Qué trastorno debe sospecharse en la paciente?

Respuestas:

- **Aborto incompleto.**
- Aborto recurrente.
- Aborto séptico.
- Óbito fetal.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Relacione las teorías del desarrollo con sus características en la atención de los pacientes.

Teorías del desarrollo	Características
1. Desarrollo biofísico.	a. El modelo de Piaget se basa en el desarrollo intelectual.
2. Desarrollo psicoanalítica /psicosocial.	b. Según la teoría de Lawrence se basa en una serie de dilemas.
3. Desarrollo cognitivo.	c. El modelo de Freud afirma que los individuos pasan por cinco etapas del desarrollo.
4. Desarrollo moral.	d. El modelo de Gesell es el patrón de crecimiento de cada niño.

Respuestas:

- 1d, 2c, 3a, 4b.
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1b, 2c, 3d, 4a.
- 1c, 2a, 3d, 4b.

La calidad es un concepto que ha evolucionado hasta nuestros días, existe un pensador que hace referencia a la calidad como la satisfacción del cliente. ¿Cuál es el autor que hace referencia al enunciado?

Respuestas:

- W. Edwards Deming.
- Joseph M. Juran.
- Walter A. Shewhart.
- Avedis Donabedian.

Paciente mujer de 52 años que llega al servicio de urgencias de un hospital, refiere que desde hace un día presenta fiebre con dolor en la parte baja del abdomen y espalda, disuria, malestar general. El médico le valora y solicita toma de muestra de orina limpia, en mitad de la micción. ¿Qué intervención corresponde a la fase de planificación del proceso de atención de enfermería, en este caso?

Respuestas:

- Explicar el procedimiento al paciente.

- Proporcionar intimidad al paciente cerrando la puerta o la cortina.
- Evaluar el estado miccional del paciente.
- Evaluar la comprensión del paciente sobre la finalidad de la prueba y el método de recogida.

¿Cuál es la primera causa de muerte infantil en el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 2016?

Respuestas:

- Dificultad respiratoria del recién nacido.

- Sepsis bacteriana del recién nacido.
- Neumonía, organismo no especificado.
- Otras malformaciones congénitas del corazón.

Mujer de 54 años, atendida en emergencia por dolor torácico de 1 hora de evolución. A la valoración: paciente álgica, presenta disnea, temor, ansiedad, TA= 150/90mmHg, FC= 110X', FR= 32 X', SaO2= 93 % con O2 3 litros x'. Se le realiza un electrocardiograma en el que se aprecian cambios en el segmento ST. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en este caso?

Respuestas:

- Aliviar el dolor.

- Monitorizar signos vitales.
- Mantener al paciente en decúbito dorsal.
- Controlar ingesta y excreta.

Identifique la manifestación clínica de la insuficiencia cardiaca izquierda aislada.

Respuestas:

- **Disnea.**
- Edema.
- Hepatomegalia.
- Ascitis.

Mujer gestante de 28 años, acude a control subsecuente de embarazo a una de las Unidades de salud. Dentro de las actividades obligatorias de enfermería en el control de embarazo, está el registro del Score MAMÁ. ¿Qué parámetros se deben registrar en este proceso?

Respuestas:

- **Frecuencia Cardíaca (FC), Presión arterial Sistólica-Diastólica (TA), Frecuencia Respiratoria (FR), Saturación de Oxígeno (Sat), Estado de Conciencia, Proteinuria.**
- Presión arterial dividida en Sistólica-Diastólica (TA), Saturación de Oxígeno (Sat), Estado de Conciencia, Proteína en orina, Frecuencia Cardíaca (FC).
- Frecuencia Cardíaca (FC), Presión arterial dividida en Diastólica-Sistólica (TA), Saturación de Oxígeno (Sat), Estado de Conciencia, Proteína en orina.
- Presión arterial dividida en: Sistólica-Diastólica (TA), Frecuencia Respiratoria (FR), Frecuencia Cardíaca (FC), Saturación de Oxígeno (Sat).

Seleccione una medida de control administrativo que se recomienda aplicar para la prevención de tuberculosis en el primer nivel de atención.

Respuestas:

- **En el momento de ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.**
- Ventilación adecuada, que permita el flujo natural de aire a través de ventanas abiertas.
- La recolección de la muestra de esputo debe realizarse en ambientes con luz y ventilación natural.
- Se recomienda el uso de respiradores N95 durante la atención a afectados en habitaciones de aislamiento para TB.

Señale los elementos del Código deontológico del CIE para la profesión de enfermería:

1. Enfermera y las personas.
2. Enfermera y el entorno.
3. Enfermera y la práctica.
4. Enfermera y sus compañeros.

5. Enfermera y Educación.

6. Enfermera y la profesión.

Respuestas:

- 1, 3, 4, 6
- 2, 4, 5, 6
- 1, 4, 5, 6
- 2, 3, 4, 5

Señale el término que corresponde a la siguiente definición: Cuando decimos que es un parámetro cualitativo más complicado de medir. Significa llegar a la plenitud de las capacidades mentales. En relación a lo biológico se refiere a la finalización del desarrollo orgánico general, es decir se ha llegado mediante transformaciones a la forma adulta.

Respuestas:

- **Maduración**
- Osmolaridad.
- Desarrollo.
- Crecimiento.

Paciente que durante el periodo de alumbramiento, empieza con signos y síntomas de hemorragia post parto inmediato, sangrado vaginal de 700 ml, causada por atonía uterina. En ese momento el médico solicita la intervención del equipo de salud. ¿Cuáles son las acciones secuenciales para controlar el sangrado vaginal de la paciente, en orden de importancia?

1. Reanimación de la paciente.
2. Monitorización de la paciente.
3. Comunicación al equipo competente.
4. Implementación de medidas.

Respuestas:

- 3, 1, 2, 4
- 1, 2, 3, 4
- 2, 3, 4, 1
- 4, 3, 2, 1

A la valoración de enfermería un paciente presenta los siguientes valores en los signos vitales: PA:150/100 mmHg, FC:120 latidos por minuto, de acuerdo al protocolo se realiza un electrocardiograma en el que se observa cambios que reflejan isquemia. ¿Cuál es el patrón funcional de Gordon que se encuentra alterado?

Respuestas:

- **Actividad - Ejercicio.**
- Nutricional - Metabólico.
- Cognitivo - Perceptivo.
- Eliminación.

Un paciente de 50 años postquirúrgico de hernioplastia inguinal, debe ser dado de alta de la unidad de recuperación postanestésica (URPA), en la valoración según la escala de Aldrete se encuentra lo siguiente: mueve las cuatro extremidades voluntariamente, respira profundo y tose libremente, TA: 120/80, FC: 80 lpm, Sat: O2 92 %, y responde cuando es llamado. Según sus conocimientos. ¿Cuál es el puntaje que tiene este paciente y según este puntaje puede ser dado de alta de la URPA?

Respuestas:

- **9 puntos, si puede ser dado de alta de la URPA.**
- 9 puntos, no puede ser dado de alta de la URPA.
- 10 puntos, si puede ser dado de alta de la URPA.
- 8 puntos, no puede ser dado de alta de la URPA.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Paciente primigesta de 16 años, tuvo un parto céfalo vaginal sin complicaciones, dando un recién nacido de 2700 gr de peso, talla 50 cm, perímetro cefálico 33 cm, perímetro braquial 9 cm y perímetro torácico 31 cm. La madre tiene mamas secretantes agrietadas, con pezones evertidos y siente mucho dolor al dar el seno. ¿Cuál es la técnica de agarre recomendada por el MSP para un correcto amamantamiento?

Respuestas:

- **La boca del recién nacido está bien abierta, el labio inferior está evertido, el mentón está tocando el pecho, areola y pezón dentro de la boca.**

- La boca del recién nacido está bien abierta, el labio superior está evertido, el mentón está tocando el pecho, areola dentro de la boca.

- La boca del recién nacido está abierta, el labio inferior está invertido, el mentón está tocando el pecho, pezón dentro de la boca.

- La boca del recién nacido está semi abierta, el labio inferior está invertido, el mentón está tocando el pecho, areola dentro de la boca.

Atendiendo los aspectos propios del proceso de envejecimiento, complete el siguiente enunciado:

La Neumonía en los adultos mayores es frecuente porque _____ la eficacia del reflejo _____ y el _____.

Respuestas:

- **disminuye - de deglución - tusígeno.**

- aumenta - de deglución - tusígeno.

- disminuye - nauseoso - tusígeno.

- aumenta - nauseoso - tusígeno.

En la enseñanza a personas con discapacidad de aprendizaje (del desarrollo), una de las estrategias de enseñanza indicada es:

Respuestas:

- **Usar explicaciones sencillas y ejemplos concretos con repetición.**

- Convertir la información a formatos de audio y táctiles.

- Utilizar videos subtítulos y materiales generados en computadora.

- Utilizar un discurso lento, claro y deliberado.



Relacione los tipos de datos en la valoración con sus respectivos problemas de salud:

Tipos de datos	Problemas de salud
1. Subjetivos.	a. Piel fría diaforética.
2. Objetivos.	b. Cirugías previas
3. Históricos.	c. Preocupación por la enfermedad.
4. Actuales.	d. Examen físico.

Respuestas:

- **1c, 2d, 3b, 4a.**

- 1a, 2d, 3c, 4b.

- 1b, 2a, 3d, 4c.

- 1d, 2c, 3a, 4b.

Un paciente ingresa a un servicio hospitalario. Como parte de su cuidado, Usted obtiene información durante la entrevista al paciente y al realizar el examen físico; luego, organiza, analiza y resume los datos obtenidos. ¿A qué etapa del proceso enfermero corresponden estas acciones?

Respuestas:

- **Valoración.**

- Diagnóstico.

- Planificación.

- Ejecución.

¿Cuál es la etiqueta diagnóstica en un paciente de 59 años, hipertenso sin tratamiento habitual, que es ingresado en el servicio de emergencia por referir dolor precordial intenso que se irradia al brazo izquierdo, presenta frialdad, palidez y vómitos?

Respuestas:

- **Perfusión tisular cardiaca ineficaz.**

- Perfusión tisular periférica ineficaz.
- Incumplimiento del régimen terapéutico.
- Déficit de volumen de líquidos.

Paciente con un embarazo de 8 semanas de gestación, acude a la consulta externa de un hospital de segundo nivel, al momento presenta fiebre de 38 grados C, taquicardia, vómito, refiere dolor lumbar, náusea, polaquiuria y disuria. Se realiza la valoración de enfermería a la paciente con la sintomatología presentada, se confirma que su diagnóstico corresponde a:

Respuestas:

- **Pielonefritis.**

- Cistitis.
- Insuficiencia renal.
- Uretritis.

Uno de los criterios para considerar la RCP como de alta calidad es la profundidad de las compresiones torácicas. ¿Cuál es la profundidad con la que se deben realizar las compresiones en un adulto?

Respuestas:

- **Al menos 5 cm.**

- Al menos 3 cm.
- Al menos 4 cm.
- Al menos 7 cm.

¿Cuál es el centro regulador de la respiración?

Respuestas:

- **Tronco encefálico.**

- Hipotálamo.
- Cerebelo.
- Médula espinal.



Identifique el mecanismo fisiopatológico de la disnea en la neumonía:

Respuestas:

- **Reacción inflamatoria a nivel alveolar.**
- Cuerpo extraño en la luz de los bronquios.
- Pérdida de la presión negativa en la cavidad pleural.
- Reacción de hipersensibilidad bronquial.

Niño de 7 meses 5 días de vida que acude al centro de salud para vacunación; usted analiza su carnet de vacunación y observa que el niño ha recibido las siguientes vacunas: BCG, HB, primera y segunda dosis de fIPV, y tercera dosis de OPV, una dosis de rotavirus, primera, segunda y tercera dosis de pentavalente y neumococo. ¿Qué vacuna debe administrar al niño?

Respuestas:

- **Segunda dosis de rotavirus.**
- Tercera dosis de fIPV (vacuna inactiva de la polio).
- DPT refuerzo.
- Primera dosis de SRP.



Relacione los modelos conceptuales con sus teorizantes.

Teorizantes	Modelo conceptual
1. Dorothea Orem	a. Modelo de relaciones interpersonales.
2. Hildegard Peplau	b. Déficit de autocuidado.
3. Nola Pender	c. Necesidades humanas.
4. Virginia Henderson	d. Modelo de la promoción de la salud.

Respuestas:

- **1b, 2a, 3d, 4c.**
- 1c, 2a, 3d, 4b.
- 1b, 2d, 3a, 4c.
- 1a, 2b, 3c, 4d.

Paciente varón de 75 años, hospitalizado en neurología desde hace 6 días, diagnosticado de hipertensión arterial y accidente cerebrovascular, presenta hemiplejía derecha. Hace 2 días sufre una caída al trasladarlo a exámenes radiológicos. Para brindar medidas de confort como el baño, es necesario valorar el riesgo de caídas del paciente. ¿Qué escala utiliza para valorar este riesgo?

Respuestas:

- **Escala de Morse.**
- Escala de Braden.
- Escala de Norton.
- Escala de Yesavage.



De acuerdo con la guía de atención de labor de parto, parto y posparto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el parto es:

Respuestas:

- **Un proceso fisiológico, el cual debe ser respetado y en el que se deben ofrecer los estándares más altos de calidad de atención, limitando a lo mínimo las intervenciones.**
- Un proceso de riesgo de vida para la madre y el niño/a, en que se recomienda tomar todas las medidas intervencionistas necesarias para evitar complicaciones.
- Una etapa en que la mujer requiere de apoyo de los profesionales de salud, ya que su vida y la de su hijo están en riesgo.
- Un proceso fisiológico en que madre e hijo saben qué hacer, por lo tanto no es necesario el acompañamiento y vigilancia durante todo el proceso.

Con relación a la aspiración de secreciones por traqueostomía sistema abierto. Señale el enunciado correcto:

Respuestas:

- **Hiperventilar al paciente previa a la aspiración.**
- Aspirar por 20 segundos en cada ocasión.
- Si el paciente está inconsciente colocarlo en semifowler.
- Indicarle al paciente que no tosa entre las aspiraciones.

Paciente ingresa al servicio de Emergencia por presentar parada cardiorrespiratoria, el equipo de salud se prepara para el inicio de soporte vital avanzado, usted como personal de enfermería es la responsable de administrar la medicación durante este procedimiento. ¿Cuál es el medicamento de elección y la dosis que usted administra bajo prescripción médica?

Respuestas:

- **Adrenalina 1mg IV cada 3 a 5 minutos.**
- Amiodarona 300 mg IV en 3 a 5 minutos.
- Lidocaína 1 a 1.5 mg/kg IV 5 a 10 minutos.
- Atropina 0.5 mg IV en bolo hasta 3 mg.



Para la prevención de venas varicosas en un paciente sin otras complicaciones. ¿Cuál es la recomendación en relación a la actividad física?

Respuestas:

- **Caminar un promedio de 1.6 a 3.2 km al día.**
- Utilizar calcetines apretados en el extremo superior.
- Cruzar las piernas en los muslos.
- Mantenerse de pie por períodos prolongados.

Al centro de salud llega un adulto joven de 33 años, quien es traído por su esposa en contra de su voluntad, debido a que presenta ideas suicidas y manifiesta que escucha voces y en varias ocasiones demuestra estados depresivos desde aproximadamente 24 días. ¿Qué tipo de valoración de enfermería es la más adecuada para este caso?

Respuestas:

- **Valoración urgente.**
- Valoración céfalo-caudal.
- Valoración repetida.
- Valoración por sistemas.

La enfermera está dando una charla sobre educación sexual y reproductiva a los adolescentes en la comunidad. ¿A qué método mecánico o de barrera se refiere cuando es un casquete en forma de domo que se coloca en el fondo de la vagina sobre el orificio cervical, evitando el ingreso de los espermatozoides en el útero?

Respuestas:

- **Diafragma.**
- Dispositivo intrauterino (DIU).
- Aro plástico.
- Espermicida.



Paciente adulto con resultados de un test de enzimoimmunoanálisis (EIA) en el que se detectan anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). ¿Cuál es la interpretación de los resultados de la prueba?

Respuestas:

- **Infectado por el VIH.**
- Tiene SIDA.
- Es inmune al VIH.
- El VIH está inactivo.

Relacione el nombre de las teorizantes con su respectiva teoría:

TEORIZANTE	NOMBRE DE LA TEORÍA
1. Florence Nightingale	a. Teoría del entorno
2. Virginia Henderson	b. Teoría del déficit del autocuidado
3. Dorothea Orem	c. Teoría de la promoción de la salud
4. Nola Pender	d. Teoría de las necesidades humanas

Respuestas:

- **1a, 2d, 3b, 4c.**
- 1a, 2d, 3c, 4b.
- 1d, 2c, 3b, 4a.
- 1d, 2a, 3b, 4c.



Relacione las zonas elegidas para la medición de la temperatura con las ventajas:

ZONA PARA MEDIR LA TEMPERATURA	VENTAJAS
1. Oral	a. Segura, utilizada en recién nacidos y pacientes inconscientes.
2. Membrana Timpánica	b. Fiable, a menudo es causa de ansiedad en el paciente.
3. Rectal	c. Lectura central precisa, medición rápida.
4. Axilar	d. Accesible, cómoda para el paciente.

Respuestas:

- 1d, 2c, 3b, 4a.
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1c, 2b, 3d, 4a.
- 1a, 2c, 3d, 4b.

Identifique la complicación aguda de la Diabetes Mellitus:

Respuestas:

- **Cetoacidosis Diabética.**
- Retinopatía diabética.
- Neuropatía diabética.
- Nefropatía diabética.



Paciente de 15 años, de sexo femenino con discapacidad intelectual, es atendida en la sala de Emergencias por sospecha de violencia sexual. ¿Qué indicador de sospecha corresponde a las manifestaciones directas?

Respuestas:

- Hemorragias o inflamación en áreas genital, anal y uretral.

- Dificultad para caminar o sentarse, para la micción, defecación, disuria, dolor o prurito génito-anal.
- Con conducta pseudomadura o provocativa.
- Cuerpo extraño en vejiga, uretra, vagina o ano.

Seleccione los factores de riesgo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

- 1. Fumar de manera pasiva.**
- 2. Patrón de respiración superficial.**
- 3. Contaminación del aire.**
- 4. Aspiración pulmonar.**
- 5. Exposición ocupacional al polvo.**
- 6. Reflejo tusígeno deprimido.**

Respuestas:

- 1, 3, 5.**
- 2, 4, 6.
- 1, 5, 6.
- 2, 3, 4.

Identifique el tipo de crisis familiar que se presenta en esta situación: “Familia que se encuentra atravesando por el cuidado hospitalario de uno de sus miembros, quien se encuentra en fase de agonía, tras varios años con diagnóstico de cáncer prostático avanzado”.

Respuestas:

- **Crisis por desmembramiento.**

- Crisis por incremento.
- Crisis por desmoralización.
- Crisis combinada.

Paciente femenina se encuentra en postoperatorio inmediato de una paratiroidectomía, manifiesta sentir adormecimiento de las extremidades y se muestra ansiosa. A la valoración presenta signo de Trousseau, los resultados de laboratorio determinan una concentración de calcio de 7.0 mg/dL. ¿Qué alteración electrolítica presenta la paciente?

Respuestas:

- **Hipocalcemia.**

- Hipercalcemia.
- Hipernatremia.
- Hiponatremia.

Paciente con antecedentes de Artritis Reumatoidea diagnosticada hace 2 semanas, acude al centro de salud por presenta dolor a nivel de articulaciones, refiere además quemazón, hormigueo y sensibilidad al frío en sus extremidades inferiores. De acuerdo a la valoración de enfermería. ¿Cuál es el tipo de dolor que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Dolor somático.**

- Dolor neuropático.
- Dolor continuo.
- Dolor irruptivo.

En la sala de Urgencia Obstétrica, usted atiende a una mujer de 20 años con un embarazo de 30 semanas que presenta tensión arterial de 160/110 mm Hg, visión borrosa y confusión. Luego de aplicar la herramienta SCORE MAMÁ, activa clave azul. De acuerdo al protocolo para preeclampsia y de acuerdo con la prescripción médica ¿Qué dosis de sulfato de magnesio administra para la impregnación?

Respuestas:

- **4 gr IV diluido en 80 ml de solución isotónica (SS 0.9%) en 20 minutos.**
- 6 gr IV diluido en 80 ml de solución isotónica (SS 0.9%) en 20 minutos.
- 2 gr / hora diluido en 80 ml de solución isotónica (SS 0.9%) en infusión continua.
- 2 gr IV diluido en 80 ml de solución isotónica (SS 0.9%) en bolo en 20 minutos.

Paciente femenina de 48 años con diagnóstico de cáncer de mama, se le está administrando morfina por vía intravenosa. Señale el cuidado de enfermería en este caso.

Respuestas:

- **Valorar signos de depresión respiratoria.**
- Observar la presencia de diarrea.
- Valorar la aparición de incontinencia urinaria.
- Observar signos de hipertensión arterial.

Entre las definiciones y conceptos básicos de la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal, se aplican diferentes técnicas para el logro de la preparación integral, teórica, física y psico-afectiva con enfoque familiar, comunitario e intercultural. ¿Cómo se define al conjunto de procedimientos organizados para la estimulación de los sensores fetales que permiten potencializar los sentidos intraútero?

Respuestas:

- **Técnicas de estimulación prenatal.**
- Técnicas de relajación.
- Técnicas de respiración.
- Técnicas de vinculación prenatal.

Como profesional de Enfermería en el área de Urgencias, atiende a un paciente con problemas respiratorios, la prescripción médica indica administrar oxígeno por cánula nasal 3 litros por minuto. ¿Qué concentración de FIO₂ está administrando con el volumen y dispositivo del caso?

Respuestas:

- **32%**
- 28%
- 40%
- 24%

Usted como líder de un servicio hospitalario, se encuentra demostrando el procedimiento de lavado de manos a un grupo de estudiantes de Enfermería que ingresan a realizar sus prácticas en el servicio. Al indicar que el procedimiento lo debe realizar antes de una tarea limpia o aséptica. ¿A qué momento de la higiene de manos se refiere?

Respuestas:

- **Momento 2.**
- Momento 1.
- Momento 4.
- Momento 5.

Mujer de 70 años diagnosticada con esclerosis múltiple, es ingresada en el servicio de medicina interna, al realizar la valoración de enfermería nota una pérdida parcial del grosor de la piel, afectando a la epidermis y dermis en región sacra, las cuales son características de úlceras por presión. ¿Qué grado de úlcera por presión tiene esta paciente?

Respuestas:

- **Úlcera por presión grado II.**
- Úlcera por presión grado IV.
- Úlcera por presión grado I.
- Úlcera por presión grado III.



En un paciente que ingresa al servicio de emergencia con traumatismo múltiple. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería en orden de prioridad?

- 1. Controlar la ventilación y respiración.**
- 2. Establecer vía aérea y control de columna cervical.**
- 3. Valorar déficit neurológico.**
- 4. Controlar circulación y hemorragia.**
- 5. Exposición con control de temperatura.**

Respuestas:

- **2, 1, 4, 3, 5**
- 3, 1, 2, 5, 4
- 5, 2, 3, 4, 1
- 4, 5, 1, 2, 3

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?

Respuestas:

- **Citostáticos, cloranfenicol, litio.**
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina

En un paciente con acúmulo de secreciones en los lóbulos pulmonares superiores, segmentos apicales. ¿Cuál es la posición para el adecuado drenaje postural de estas secreciones?

Respuestas:

- **Semisentado con la cabecera de la cama elevada a 45°.**
- Decúbito dorsal, con almohada bajo la cadera.
- Decúbito prono con almohada bajo la cadera.
- Decúbito lateral derecho con almohada entre las piernas.

Cuando una mujer gestante se acerca a su consulta prenatal y usted procede a pesar a la paciente para la respectiva consulta médica, el IMC tiene un valor entre 25 - 29.9, señale en que estado nutricional se encuentra :

Respuestas:

- **Sobre peso.**
- Bajo peso
- Peso normal.
- Obesidad.

Como profesional de enfermería del servicio de Pediatría, usted debe administrar una inyección intramuscular con un medicamento de origen biológico a un lactante. ¿Cuál es el sitio de administración?

Respuestas:

- **Vasto lateral.**
- Ventroglúteo.
- Deltoides.
- Glúteo mayor.



Adulto mayor con diagnóstico de diabetes acude a emergencia por presentar desorientación, disnea, vómitos, dolor abdominal y glicemia de 350 mg/dL. De los siguientes enunciados escoja la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente.

Respuestas:

- **Crisis.**
- Sintomática.
- Inestable.
- Declive.

De las siguientes afirmaciones, seleccione el cuidado de enfermería que se debe brindar a un paciente con Alzheimer.

Respuestas:

- **Promover la independencia en el cuidado personal.**
- Aplicar restricciones físicas en caso de agitación.
- Recomendar siestas diurnas prolongadas.
- Incrementar estímulos ambientales.

Un enfermero al auscultar los campos pulmonares de un paciente de 30 años ingresado en el área de medicina interna, detecta sonidos musicales, continuos, agudos, se escuchan mejor durante la espiración. ¿Qué ruido pulmonar anormal está auscultando?

Respuestas:

- **Sibilancias.**
- Crepitaciones (Estertores).
- Roncus (Gorgoteo).
- Roce de fricción.



Paciente con antecedentes de TB Pulmonar, acude al Centro de Salud por sus exámenes de control, en los resultados se observa una resistencia simultánea a la Isoniacida y Rifampicina. ¿Cuál es el tipo de resistencia que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Multidrogorresistencia**
- Monorresistencia
- Polirresistencia.
- Extensamente resistente.

¿Cuál de las siguientes estrategias contribuye a disminuir la Presión Intracraneal (PIC) en un paciente con hemorragia subaracnoidea?

Respuestas:

- **Conservar la elevación de la cabeza de 30 a 45o, a menos que esté contraindicada.**
- Despertar al paciente frecuentemente para vigilar el estado de conciencia.
- Realizar cambios frecuentes de posición para favorecer el drenaje venoso.
- Fomentar el pujo o uso de enemas para la evacuación de las heces fecales.

De las siguientes patologías. ¿Cuáles se previenen con la vacuna pentavalente?

1. Sarampión.
2. Difteria.
3. Rubeola.
4. Tosferina.
5. Hepatitis B.
6. Parotiditis.

Respuestas:

- **2, 4, 5.**
- 1, 3, 6.
- 2, 3, 5.
- 1, 4, 6.

Seleccione las modalidades de atención del equipo integral de salud, en los niveles del sistema nacional.

- 1. Atención extramural o comunitaria.**
- 2. Atención en establecimientos móviles de salud.**
- 3. Atención pre hospitalaria.**
- 4. Atención a grupos expuestos.**
- 5. Atención a la planificación estratégica.**
- 6. Atención intramural en un establecimiento de salud.**

Respuestas:

- 1, 2, 3, 6

- 1, 4, 5, 6

- 2, 3, 4, 5

- 2, 4, 5, 6

Con relación a la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de alta calidad, complete el siguiente enunciado:

Al realizar las compresiones torácicas en adultos, comprimir a una frecuencia de entre _____ cpm, con una profundidad de _____ como mínimo y permita que el tórax se expanda _____ después de cada compresión.

Respuestas:

- 100 a 120 - 5 cm - completamente.

- 60 a 80 - 5 cm - un tercio.

- 70 a 90 - 4 cm - completamente.

- 80 a 100 - 4 cm - un tercio.



Seleccione las situaciones en las que se debe realizar la monitorización fetal electrónica continua (MFEC) en labor de parto de bajo riesgo:

1. Alteración del latido cardiaco fetal por auscultación.
2. La FCF, oscila entre 120 y 160 latidos/min.
3. Uso de oxitocina.
4. Amniorresis clara y transparente.
5. Sangrado durante el parto.
6. Presencia de líquido amniótico teñido de meconio.

Respuestas:

- **1, 3, 5, 6**
- 1, 2, 4, 5
- 2, 4, 5, 6
- 2, 3, 4, 5

Paciente masculino que sufrió lesiones múltiples como consecuencia de un accidente de tránsito. ¿Cuál es la primera prioridad terapéutica en el paciente?

Respuestas:

- **Establecer la vía aérea y la ventilación.**
- Controlar la hemorragia.
- Prevenir y tratar el choque hipovolémico.
- Valorar las lesiones de cabeza y cuello.

En la valoración pos operatoria de una ostomía, incluye la determinación de su color y turgencia, a que característica se está refiriendo:

Respuestas:

- **Viabilidad de la ostomía.**
- Tipo de ostomía.
- Altura de la ostomía.
- Construcción de la ostomía.

Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, acude a la consulta de Medicina Interna por presentar: dificultad respiratoria, edema de miembros inferiores y oliguria. Para su diagnóstico, el médico le solicita exámenes de laboratorio donde se evidencia los siguientes datos: Na 135 mEq/L; K 3.5 mEq/L, Crea 1.8 mg/dL, Nitrógeno Ureico 10 mg/dl, Ca 9.0 mg/dl. ¿Cuál es el dato de laboratorio que se encuentra alterado en el paciente?

Respuestas:

- **Creatinina.**

- Sodio.

- Potasio.

- Nitrógeno Ureico.

¿Qué utilidad tiene el familiograma según el MAIS- FCI?

Respuestas:

- **Es un instrumento para valorar la estructura, dinámica, riesgos, roles y ciclo evolutivo de la familia en un momento determinado.**

- Es un sistema complejo de conocimiento de la dinámica familiar, sus enfermedades crónicas y sus relaciones sociales en la comunidad.

- Es una fotografía de la familia que permite visualizar su composición étnica, su nivel cultural y principales factores de riesgos ambientales.

- Es un recurso adicional de la ficha familiar que define la relación de la familia entre sus miembros y con la comunidad.

El Cáncer Cervical es considerado como el segundo cáncer más frecuente en las mujeres, se puede combatir con un adecuado tamizaje. De los siguientes identifique los factores de riesgo:

- a. Multiparidad
- b. Infecciones de transmisión sexual (ITS)
- c. Mujeres con antecedentes de Cáncer de mama
- d. Mujeres con múltiples compañeros sexuales
- e. Compañero sexual con múltiples compañeras sexuales
- f. Antecedentes familiares de Cáncer óseo

Respuestas:

- a, b, d, e.

- a, b, c, e.

- b, c, d, f.

- b, d, e, f.

Dentro de las estrategias del MSP, el tamizaje metabólico neonatal es un programa cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y oportuna de cuatro enfermedades metabólicas hereditarias. Para la realización del test de screening, se contará con una muestra sanguínea que será tomada al neonato:

Respuestas:

- Al cuarto día de su nacimiento y hasta el día número 28 de vida.

- Al segundo día de su nacimiento y hasta el día número 30 de vida.

- Al tercer día de su nacimiento y hasta el día número 27 de vida.

- Al quinto día de su nacimiento y hasta el día número 29 de vida.

Las manifestaciones clínicas: Dolor torácico de inicio súbito que persiste a pesar del reposo y la nitroglicerina; pulso irregular; piel fría, húmeda, diaforética y pálida. ¿A qué patología corresponden?

Respuestas:

- Infarto agudo de miocardio.

- Insuficiencia cardíaca.

- Trombosis venosa profunda.

- Edema pulmonar.



Profesional en enfermería atiende un infante de seis meses de edad, al revisar el carné de vacunación, tiene las siguientes vacunas: BCG, HB, primera dosis de Rotavirus, de Pentavalente y de fIPV. ¿Qué vacunas deberá empezar para completar el esquema según su edad?

Respuestas:

- Segunda dosis de Rotavirus, de Pentavalente y de fIPV, primera de Neumococo más Influenza.

- Segunda dosis de HB, de Rotavirus, de Pentavalente y de fIPV, primera de Neumococo, más Influenza.

- Segunda dosis de fIPV, bOPV, segunda dosis de Pentavalente y de Neumococo, más Influenza.

- Segunda dosis de Rotavirus, de Pentavalente, de fOPV, de fIPV y de Neumococo, más Influenza.

Señale una de las patologías que pertenece a las causas de sangrado o hemorragia durante la segunda mitad del embarazo:

Respuestas:

- Placenta previa.

- Aborto.

- Enfermedad trofoblástica.

- Embarazo ectópico.

El electrocardiograma es un método diagnóstico que registra la actividad eléctrica del corazón. En relación a este procedimiento, identifique cuál es la opción correcta:

Respuestas:

- Colocar al paciente en decúbito supino en el centro de la cama y los brazos a ambos lados del cuerpo.

- Rasurar el exceso de bello en el paciente que presente abundante bello en el tórax.

- Colocar las derivaciones V1, V2, V3, V4, V5 y V6 en las extremidades.

- Colocar electrodos por debajo de la escápula izquierda y a nivel del quinto espacio intercostal para diagnosticar infartos de cara anterior.



Al realizar la evaluación del adulto mayor, se identifica un deterioro de la memoria a corto y largo plazo, presenta gran esfuerzo para encontrar respuestas a preguntas referentes a su familia y de manera reiterada solicita retroalimentación sobre su trabajo. Señale con qué patología está asociada para gestionar los cuidados enfermeros:

Respuestas:

- Demencia.

- Delirio.
- Parkinson.
- Demencia vascular.

Como enfermera/o de la comunidad, usted atiende un paciente con Tuberculosis Pulmonar. Como dato significativo de su historia psicosocial se destacan las malas condiciones socioeconómicas del paciente. ¿En cuál de las filosofías, teorías o modelos de Enfermería, se destaca este factor dentro del entorno como supuesto principal?

Respuestas:

- Filosofía de Florence Nightingale.

- Filosofía de Virginia Henderson.
- Teoría de Hildegard E. Peplau.
- Teoría de Nola J. Pender.



El enfoque basado en procesos es un principio de gestión de la calidad de los Hospitales y fundamental para lograr la satisfacción de necesidades de los pacientes. Relacione los tipos de procesos hospitalarios con sus respectivas características:

TIPOS DE PROCESOS HOSPITALARIOS	CARACTERÍSTICAS
1. Operativos.	a) Sistema de comunicación.
2. De apoyo.	b) Estrategia corporativa.
3. Gerenciales.	c) Atención al paciente.
	d) Liderazgo estratégico.
	e) Aplicación de técnicas.
	f) Desarrollo de tecnología.

Respuestas:

- **1ce, 2af, 3bd.**

- 1bc, 2de, 3af.

- 1ad, 2cf, 3be.

- 1ae, 2bc, 3df.

Con relación al infarto agudo del miocardio, señale el enunciado correcto:

Respuestas:

- **En el electrocardiograma se aprecian ondas Q anormales.**

- Las manifestaciones clínicas incluyen disnea paroxística nocturna y ortopnea.

- Un examen específico para su diagnóstico es el ecocardiograma.

- En la fase temprana suele haber estertores en ambas bases pulmonares.



Adulto mayor ingresa al servicio médico por presentar hipertensión, debilidad muscular, vómitos deshidratación, al examen físico se observa reflejos osteotendinosos disminuidos, los resultados de laboratorio muestran los siguientes datos: Na: 135mEq/L; K: 3,5 mEq/L; Ca: 12.5mg/dL, seguidamente de un electrocardiograma que reporta bloqueos cardíacos. ¿Cuál es la alteración electrolítica que presenta el paciente?

Respuestas:

- Hipercalcemia.

- Hipocalcemia.
- Hipercalemia.
- Hipocalemia.

Cuando hablamos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna nos referimos a:

Respuestas:

- La normativa que regula la publicidad y la venta de leche de fórmula, biberones y chupones.

- La forma de codificar los sucedáneos de leche, según la edad del infante para la que están indicados.
- La regulación estricta sobre las fechas de elaboración y caducidad, que deben cumplir quienes fabrican leche de fórmula.
- El reglamento de transporte y almacenamiento que deben tener los sucedáneos de leche.

Florence Nightingale es reconocida como la impulsora de la Enfermería profesional organizada. ¿Cuál de los siguientes hitos históricos está relacionado con este personaje?

Respuestas:

- La Guerra de Crimea.

- Guerra Civil española.
- Las cruzadas de la Edad Media.
- Edad Antigua.

¿Cuál es la respuesta correcta con relación al alumbramiento?

Respuestas:

- Etapa de salida de la placenta, inicia desde el fin del expulsivo y termina con la salida completa de la placenta y membranas por el canal del parto.

- Aumento del diámetro del canal cervical medida en centímetros (0 a 10).
- Etapa comprendida desde la dilatación completa (10 cm) hasta la salida del producto. Se acompaña de pujos maternos.
- Actividad uterina regular e intensa. Dilatación del cuello mayor a 4 cm. y descenso de la presentación fetal.

De acuerdo a las precauciones basadas en la forma de transmisión, por vía aérea, se deben tomar las siguientes medidas:

Respuestas:

- Una habitación individual con presión negativa, uso de la mascarilla de alta eficiencia (N95).

- Dentro de la habitación no tocar los materiales sin guantes, uso de la mascarilla quirúrgica.
- Uso de mandil para entrar en contacto con el paciente, uso de la mascarilla de alta eficiencia (N95)
- Asignar en lo posible estetoscopio y tensiómetro para el paciente, uso de mascarilla de alta eficiencia (N95).

Usted asiste a un parto en compañía del médico, se obtiene un producto vivo de sexo masculino de 30 semanas de gestación, presencia de líquido claro; mientras se espera la transferencia se observa: taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y quejido audible. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos corresponde a esta sintomatología?

Respuestas:

- Enfermedad de membrana hialina.

- Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial.
- Neumonía neonatal.
- Hipertensión pulmonar persistente.

En el área de Pediatría, usted educa a los padres que es recomendable e ideal que los niños tengan de 12 a 15 horas de sueño. ¿A qué grupo de edad se refieren las horas recomendadas de sueño?

Respuestas:

- **4 - 11 meses.**
- 0 - 3 meses.
- 1 - 2 años.
- 3 - 5 años.

Ordene los componentes del Apgar neonatal:

1. Calor.
2. Tono muscular.
3. Frecuencia cardíaca.
4. Irritabilidad refleja.
5. Respiración.

Respuestas:

- **3, 5, 2, 4, 1**
- 3, 1, 4, 5, 2
- 2, 3, 5, 4, 1
- 1, 3, 4, 5, 2

Paciente de 21 años, que ingresa en el Servicio de emergencia por presentar un golpe en la cabeza producto de realizar una instalación eléctrica, siendo atendido por el especialista evidenciando un hematoma a nivel del hipotálamo, a la valoración de enfermería en el turno de la mañana evidenciándose al examen físico presión arterial 120/70 mm Hg; frecuencia cardíaca 82 latidos/min, frecuencia respiratoria 20/min y saturación de oxígeno arterial en 98%, temperatura 36°C, en el turno de la tarde, presión arterial 110/70 mm Hg; frecuencia cardíaca 80 latidos/min, frecuencia respiratoria 20/min y saturación de oxígeno arterial en 98%, temperatura 38°C, en la exploración complementaria una analítica normal. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- **00008 Termorregulación ineficaz**
- 00006 Hipotermia
- 00007 Hipertermia
- 00217 Riesgo de reacción alérgica.



Durante la visita a la comunidad, se identifica un adulto mayor de 78 años que vive solo y en precarias condiciones. Al interrogatorio el paciente refiere comer una sola vez al día. Al examen físico presenta dificultad para caminar. Signos vitales: PA: 90 /60 mmHg, FC: 100 lpm, T° 36 °C, IMC: 15. ¿Qué factor influye en la alteración de la temperatura corporal de este paciente?

Respuestas:

- **Edad.**
- Hormonas.
- Estrés.
- Entorno.

Paciente de 35 años, se encuentra hospitalizado, a la valoración pulmonar se auscultan ruidos de tono bajo, áspero y rasposos, como al frotar dos trozos de cuero. Se escucha durante la inspiración y espiración. En ocasiones puede sentirse a través del tórax. Señale qué tipo de ruido pulmonar adventicio se describe:

Respuestas:

- **Roce por fricción pleural.**
- Estridor.
- Crepitaciones.
- Sibilancias.

Paciente ingresa al servicio de Emergencia por presentar agitación, piel fría y pálida, presión arterial de 80/40mmHg, frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 por minuto; de acuerdo al diagnóstico médico le indican que el paciente presenta un Shock Hipovolémico. ¿Cuál sería la intervención de enfermería principal para este caso?

Respuestas:

- **Administrar oxigenoterapia y reposición de líquidos para mejorar la perfusión.**
- Apoyar la acción del bombeo del corazón y administración de medicamentos.
- Valorar el estado de conciencia y la disminución o ausencia de gasto urinario.
- Monitorizar la frecuencia respiratoria y mejorar la capacidad del sistema vascular.



La hipertensión arterial es una de las principales causas desencadenantes de las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y renales, por lo que el profesional de enfermería debe tener los conocimientos básicos de la clasificación por estadios de la presión arterial, que le permitan realizar una prevención, un diagnóstico enfermero precoz, control y un seguimiento correcto. Teniendo en cuenta la Guía Práctica Clínica de Ecuador del año 2019. ¿Cuál es la clasificación según los estadios de la presión arterial en un paciente que acude al centro de salud y se constata 160/100 mmHg?

Respuestas:

- Hipertensión grado 2

- Normal alta.
- Hipertensión grado 1
- Hipertensión grado 3

Los indicadores de salud de una población basados en las interacciones, entre las características individuales, los factores sociales y económicos, y los entornos físicos en estrecha relación con la distribución de la riqueza en la población y no solo con su producción. ¿A qué definición se está refiriendo el enunciado?

Respuestas:

- Determinantes de la salud.

- Estilos de vida saludables.
- Gestores comunitarios.
- Promoción de la salud.



Paciente acude al centro de salud en labor de parto, el profesional de enfermería le informa sus derechos sobre el parto en libre posición; la parturienta escoge dar a luz en posición vertical. Seleccione las ventajas del parto vertical que informará a la madre:

1. Las fuerzas de gravedad favorecen el encaje y descenso fetal.
2. Menor riesgo de pérdida de sangre intraparto y hemorragias post parto.
3. Ausencia de compresión de grandes vasos.
4. Favorece la revisión médica.
5. Mejor equilibrio ácido-base fetal tanto en el período dilatante como en el expulsivo.
6. Proporciona beneficios psicoafectivos y disminuye el dolor.

Respuestas:

- **1, 3, 5, 6**
- 1, 3, 4, 5
- 2, 4, 5, 6
- 2, 3, 5, 6

En el área de triage de urgencias obstétricas, usted atiende a una mujer de 40 años con embarazo de 32 semanas, con una tensión arterial de 160/110 mm Hg, a los 20 minutos del ingreso presenta convulsiones tónico clónicas. ¿A qué patología de los trastornos hipertensivos del embarazo corresponde el caso?

Respuestas:

- **Eclampsia.**
- Hipertensión arterial crónica.
- Preeclampsia leve.
- Preeclampsia grave.

Seleccione los métodos indirectos utilizados para el diagnóstico de VIH:

Respuestas:

- **Pruebas de tamizaje: pruebas rápidas, ensayo de inmunoanálisis enzimático.**
- Pruebas confirmatorias: detección molecular del material genético del virus.
- Técnicas cuantitativas: carga viral del VIH, PCR, amplificación de ácidos nucleicos.
- Técnicas cualitativas: reacción en cadena de la polimerasa o tiempo real (PCR).

En el área de triage de un centro de salud, usted recibe a un niño de 2 años, al graficar la curva de crecimiento observa que el puntaje Z del indicador peso/talla se encuentra entre -2 y -3 desviación estándar (DE). ¿A qué tipo de malnutrición hace referencia?

Respuestas:

- **Desnutrición aguda moderada.**

- Desnutrición aguda severa.
- Desnutrición crónica.
- Bajo peso.

La tercera etapa del parto es:

Respuestas:

- **La expulsión de la placenta y se conoce como alumbramiento.**

- La salida del feto. Inicia cuando se ha logrado 10 cm de dilatación y 100% de borramiento y termina con la salida del feto.
- La ruptura de las membranas amnióticas. La cual puede ser espontánea o puede ser artificial, esto aumenta la actividad y acelera el proceso.
- El puerperio. Esta etapa se divide en: puerperio inmediato, mediato y tardío.

Al desplazar un paciente en su cama con la ayuda de otro profesional, usted debe considerar la posición del paciente para la movilización. ¿Cuál de las siguientes posiciones es la indicada en este caso?

Respuestas:

- **Brazos cruzados sobre el tórax y cabeza flexionada.**

- Brazos extendidos al lado del cuerpo y cabeza extendida.
- Piernas extendidas y pies en posición vertical.
- Paciente girado sobre el lado opuesto al enfermero.



Usted como profesional de Enfermería, administra espironolactona de 25mg VO a un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial; conoce que el medicamento baja la presión arterial reduciendo la reabsorción del sodio y agua por lo riñones, disminuyendo así el volumen del fluido circulatorio. ¿Qué tipo de antihipertensivo está administrando en este caso?

Respuestas:

- **Diuréticos.**

- Bloqueantes de los canales de calcio.
- Bloqueantes beta adrenérgicos.
- Vasodilatadores.

Al realizar el manejo de material estéril con pinzas aro con las puntas húmedas. ¿Cuál sería el principio en la manipulación de la misma?

Respuestas:

- **Mantener las puntas hacia abajo.**

- Mantener las puntas hacia arriba.
- Mantener las puntas separadas.
- Mantener las puntas semi abiertas.

Al controlar los signos vitales, usted encuentra que el paciente NN de 35 años tiene: de pulso 39 por minuto, frecuencia respiratoria de 26 por minuto, temperatura rectal 37.5 grados centígrados y una tensión arterial de 115/70. ¿ Cuáles son las constantes vitales del paciente, de acuerdo al enunciado,?

Respuestas:

- **Normotérmico, normotenso, taquipneico, bradicárdico.**

- Hipotenso, bradicárdico, normotérmico, taquipnéico.
- Normotenso, hipertérmico, bradipneico, taquicárdico.
- Hipertenso, bradipneico, bradicárdico, hipertérmico.



Como enfermera/o del servicio de emergencias recibe un paciente con fractura abierta de tibia. ¿Cuál es la acción inmediata que se realiza?

Respuestas:

- Cubrir la herida con apósito estéril.

- Intentar reducir la fractura.
- Retirar la ropa sólo del lado afectado.
- Movilizar la extremidad fracturada.

¿Cuáles son las vacunas que se le aplica a un niño de 4 meses y la vía de administración?

Respuestas:

- Pentavalente intramuscular, Neumococo conjugada intramuscular, Rotavirus oral, fIPV intradérmica.

- Pentavalente intramuscular, Neumococo conjugada intramuscular, Rotavirus oral, fIPV intramuscular.
- Pentavalente intradérmica, Neumococo conjugada oral, Rotavirus oral, fIPV intradérmica.
- Pentavalente intramuscular, Neumococo conjugada intramuscular, Rotavirus oral, OPV oral.

Indique cuáles son los hallazgos que se encuentran en una paciente hospitalizada con distocia en un proceso insatisfactorio en la fase activa de la primera etapa del parto:

- a. Contracciones irregulares e infrecuentes después de la fase latente.**
- b. Dilatación de cuello uterino lenta 1 cm. por hora.**
- c. Ecografía que confirme embarazo múltiple.**
- d. Cuello uterino mal adosado a la presentación.**
- e. Útero macrosómico con presencia de atonía y sangrado.**
- f. No descenso de la presentación fetal con dilatación avanzada o en periodo expulsivo.**

Respuestas:

- a, b, d, f.

- b, c, e, f.
- a, c, d, e.
- b, c, e, f.

Como profesional de enfermería de un servicio hospitalario, usted debe identificar los medicamentos considerados de alto riesgo para realizar prácticas asistenciales seguras, garantizar la seguridad del paciente y la calidad de la atención. ¿Cuál de los siguientes medicamentos pertenece a este grupo?

Respuestas:

- **Insulina.**
- Dexametasona.
- Hidroxicloroquina.
- Haloperidol.

Señale la posición adecuada para una paciente que será intervenida de histerectomía vaginal:

Respuestas:

- **Litotomía.**
- Trendelenburg invertida.
- Decúbito dorsal.
- Navaja sevillana.

La verdad en lo relacionado a lactancia materna es:

Respuestas:

- **La mujer no es la única responsable de la lactancia materna.**
- El tamaño de los senos influye en la producción de la leche materna.
- Si la mujer tiene disgustos no debe amamantar a su hijo/a.
- Las madres embarazadas no deben amamantar.



Seleccione las actividades de las prestaciones de promoción dentro de la atención integral en el ciclo de vida al adulto mayor:

1. Envejecimiento activo.
2. Participación social y exigencia de derechos.
3. Salud mental.
4. Demencia senil.
5. Fomentar espacios saludables.
6. Vacunación.
7. Depresión y ansiedad.

Respuestas:

- **1, 2, 3, 5**

- 1, 4, 6, 7

- 2, 5, 6, 7

- 3, 4, 5, 6

Seleccione el ruido respiratorio adventicio que corresponde a un ruido fuerte, continuo de tono grave que se escucha mejor en la espiración.

Respuestas:

- **Roncus.**

- Roce de fricción.

- Sibilancias.

- Estertores crepitantes.

Paciente de 45 años, se encuentra hospitalizado en el área de medicina interna por insuficiencia renal aguda. En la visita médica es diagnosticado de conjuntivitis bacteriana aguda y se le prescribe instilación oftálmica de gentamicina 2 gotas cada 8 horas. Antes de la aplicación se debe preparar el medicamento. ¿Cuál es el primer paso para realizar la aplicación de la instilación oftálmica?

Respuestas:

- **Comprobar el Registro de Administración de Medicamentos.**

- Razón del medicamento.

- Preparar al paciente.

- Limpiar el párpado.



Paciente de 17 años cursa un embarazo de 15 semanas de gestación, acude a su segundo control prenatal al Centro de Salud más cercano, con los siguientes resultados: Hemoglobina de 10.2 mg/dl y un hematocrito de 32 %. La prescripción médica es hierro; 30 a 60 mg y ácido fólico: 400 ug (0.4 mg). ¿Que recomienda usted como enfermero/a en la postconsulta?

Respuestas:

- Alimentación saludable rica en hierro en cinco tomas al día, ingerir el hierro prescrito 1 hora antes de las comidas, consumir frutas cítricas, no ingerir antiácidos, advertir la coloración de las heces.

- Dieta hiper calórica, cinco tomas al día, ingerir el hierro prescrito 1 hora después de las comidas, consumir frutas cítricas, ingerir antiácidos, advertir la coloración de las heces.

- Dieta rica en proteínas vegetales, en tres tomas al día, ingerir el hierro prescrito 1 hora antes de las comidas, consumir frutas cítricas, ingerir antiácidos, advertir presentara deposiciones blandas.

- Alimentación rica en calcio, tres tomas al día, ingerir el hierro prescrito 2 horas después de las comidas, consumir lácteos, ingerir antiácidos, advertir que presentará estreñimiento.

El Sulfato de Magnesio tiene una presentación: ampolla de 10 ml al 20 %. ¿Cuál es la concentración en gramos de la ampolla?

Respuestas:

- 2 g
- 1 g
- 3 g
- 4 g

Señale la técnica correcta para la administración de gotas óticas en un paciente adulto:

Respuestas:

- Traccionar el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás.

- Traccionar el pabellón auricular hacia atrás.

- Traccionar el pabellón auricular hacia atrás y abajo.

- Traccionar el pabellón auricular hacia arriba.



¿Cómo se transmite el virus de la Hepatitis C?

Respuestas:

- Por vía hemática.

- A través de la leche materna.
- Ingestión de alimentos contaminados.
- Contaminación por aguas residuales.

Niño de 8 meses es traído por su madre al centro de salud para ser vacunado. La madre refiere que no lo pudo traer a los 6 meses porque estaba enfermo, y luego se olvidó. El profesional en enfermería al revisar el carné de vacunas constata que solo se le han administrado las vacunas correspondientes hasta los 4 meses. En este momento ¿Qué vacunas y qué número de dosis le corresponde administrar al niño?

Respuestas:

- Pentavalente (3era. Dosis), Neumococo (3era. Dosis), OPV (1era. Dosis).

- Pentavalente (3era. Dosis), Neumococo (3era. Dosis), OPV (2da. Dosis).
- Pentavalente (3era. Dosis), Neumococo (3era. Dosis), Varicela (1era. Dosis).
- Pentavalente (3era. Dosis), Neumococo (3era. Dosis), Rotavirus (3era. Dosis).

De acuerdo con la siguiente hipótesis: a mayor exposición de los adolescentes a violencia familiar, mayor manifestación de alteraciones emocionales que llevarán al suicidio. De acuerdo con lo antes descrito, identifique. ¿Qué tipo de hipótesis hace referencia?

Respuestas:

- Hipótesis correlacional.

- Hipótesis nula.
- Hipótesis causales multivariadas.
- Hipótesis alternativas.



Seleccione en qué dimensión de enfermería existen problemas o situaciones cuya prescripción y tratamiento requieren la colaboración de otros profesionales de la Salud para un tratamiento conjunto definitivo.

Respuestas:

- **Interdependiente.**

- Dependiente.
- Curativa.
- Independiente.

Paciente ingresa al servicio de emergencia por presentar somnolencia. A la valoración de Enfermería se observa fasciculaciones, piel seca e hiporreflexia, el médico solicita exámenes de laboratorio y se encuentra los siguientes datos: Na=130mEq/l, K=5,0mEq/l, Ca=9,0mEq/l, Mg=3,5mEq/l. De acuerdo con estos valores de electrolitos, indique. ¿Cuáles son las alteraciones que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hiponatremia, hipermagnesemia.**

- Hipernatremia, hipomagnesemia.
- Hiperkalemia, hipercalcemia.
- Hipokalemia, hipocalcemia.

Adulto mayor de 70 años, ingresa al servicio de neurología en estado inconsciente, se observa una delgadez extrema, familiares manifiestan que tiene algunos días sin comer, al realizar la valoración clínica se detecta buena función intestinal. Según su criterio. ¿Cuál sería la vía de acceso más adecuada para iniciar la alimentación?

Respuestas:

- **Por vía naso entérica.**

- Por vía oral.
- Por vía parenteral.
- Por vía mixta (enteral y parenteral).



Paciente masculino de 78 años, asiste al servicio de emergencia del Hospital Básico por presentar trastornos en la micción, aumento de volumen en región suprapúbica y dolor. El familiar que lo acompaña manifiesta antecedentes de salud que lo han llevado al encamamiento prolongado, incontinencia urinaria y tratamiento con sondaje vesical permanente. Luego de la valoración realizada al usuario, el especialista indica al profesional de enfermería el cambio de la sonda vesical para evacuar vejiga y mejorar los síntomas que presenta. ¿Cuál es la sonda vesical indicada para este paciente?

Respuestas:

- **Tamaño 40 cm, # 18 Fr, dos vías.**
- Tamaño 22cm, #20 Fr, tres vías.
- Tamaño 30cm, #18 Fr, dos vías.
- Tamaño 15 cm, # 10Fr, dos vías.

El personal de enfermería proporciona los cuidados necesarios a un paciente en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según la teoría de los sistemas planteada por Dorothea E. Orem. ¿Cuál de los sistemas se aplica en este caso?

Respuestas:

- **Sistema totalmente compensador.**
- Sistema parcialmente compensador.
- Sistema de apoyo educativo.
- Sistema de autocuidado.

Paciente acude al Centro de Salud por presentar dificultad para dormir, manifiesta que no puede descansar por problemas emocionales los cuales interfieren su estilo de vida. ¿Cuál es la teorizante que se pone de manifiesto?

Respuestas:

- **Virginia Henderson.**
- Nola Pender.
- Martha Rogers.
- Callista Roy.



¿Cuál de las siguientes arritmias es considerada un ritmo de paro letal?

Respuestas:

- **Fibrilación ventricular.**

- Taquicardia sinusal.
- Flutter auricular.
- Fibrilación auricular.

Relacione las actividades de enfermería con la fase correcta del Proceso de Atención:

Fase del Proceso	Actividades de Enfermería
1. Valoración	a. Análisis e interpretación de datos.
2. Diagnóstico	b. Determina el logro de los objetivos propuestos.
3. Planificación	c. Realización de una exploración física.
4. Ejecución	d. Determina las prioridades inmediatas.
5. Evaluación	e. Práctica del plan de cuidados.

Respuestas:

- **1c, 2a, 3d, 4e, 5b.**

- 1b, 2a, 3d, 4e, 5c.
- 1c, 2d, 3a, 4e, 5b.
- 1b, 2a, 3e, 4d, 5c.

¿Qué tipo de aislamiento requiere un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar?

Respuestas:

- **Aislamiento por aire.**
- Aislamiento por gotas.
- Aislamiento por contacto.
- Aislamiento por cohorte.

En el tratamiento de la tuberculosis sensible infantil con drogas de primera línea, es importante considerar todos los aspectos inherentes a la farmacoterapia con isoniácida (H). Señale. ¿Cuál de las siguientes complicaciones indican toxicidad por el uso de esta droga?

Respuestas:

- **Convulsiones.**
- Nefritis intersticial.
- Hiperuricemia.
- Neuritis óptica.

Paciente femenina de 56 años es ingresada en el servicio de Medicina Interna con sospecha de insuficiencia renal aguda; al realizarle exámenes de laboratorio se observa: creatinina de 0.8mg/dL, sodio de 135 mEqL, potasio de 6 mEqL, BUN 8mg/dL. Para la confirmación de su diagnóstico, el médico solicita un estudio que le permita visualizar cortes transversales del riñón y de las vías urinarias, así como la presencia de masas y alteraciones en tejidos blandos. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de imagen que permita evaluar estas alteraciones?

Respuestas:

- **Tomografía.**
- Gammagrafía.
- Urografía.
- Cistografía.



Paciente de 1 mes, acude con su madre al control de niño sano para valorar su crecimiento y desarrollo. Durante el examen físico se mantiene alerta, activo y sin alteraciones. Como parte de la valoración es necesario tomar signos vitales. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca en esta edad del paciente?

Respuestas:

- 100-190.

- 60-100.

- 98-140.

- 80-120.

Adulto mayor, residente en asilo de ancianos desde hace 5 años, es transferido a un hospital por presentar disnea de mínimos esfuerzos, bradipnea, cefalea, presencia de roncus y estertores. Identifique el patrón funcional alterado:

Respuestas:

- Actividad y Ejercicio.

- Autopercepción-autoconcepto.

- Adaptación-Tolerancia al estrés.

- Percepción y manejo de la salud.

Según prescripción médica le piden administrar 250 mg de ibuprofeno a un paciente pediátrico, la presentación que usted dispone en el servicio es de 200 mg/5ml. ¿Cuál es la dosis que corresponde administrar en el paciente?

Respuestas:

- 6.25 ml.

- 10 ml.

- 6.75 ml.

- 4 ml.

¿Cuál es el concepto que corresponde a salud sexual?

Respuestas:

- **Estado de bienestar relacionado con los aspectos físicos, psicológicos, socioculturales y la sexualidad del ser humano, los cuales deben encontrarse libres de coerción, discriminación y violencia.**

- Se refiere al estado de bienestar bio-psico-social de la madre y el niño en todo momento, tomado en cuenta sus necesidades según su condición.

- Estado relacionado con muchos factores: características biológicas propias, estilos de vida, hábitos nutricionales, nivel socio económico, cultural, estado civil y acceso a espacios de salud.

- Es el estado de equilibrio mental, social, psicológico, físico, la ausencia de enfermedad y todos los otros aspectos relacionados con la capacidad reproductiva de la mujer y el hombre.

Al servicio de vacunas llega una madre con un niño de 11 meses, por primera vez a vacunarle. Seleccione las vacunas que se debe aplicar según el esquema de inmunizaciones que exige la Estrategia Nacional de Inmunizaciones del Ecuador:

1. **Pentavalente.**
2. **Rotavirus.**
3. **Influenza pediátrica.**
4. **BCG.**
5. **Neumococo Conjugada.**
6. **FIPV.**
7. **SRP.**

Respuestas:

- **1, 3, 4, 5, 6**

- 2, 4, 5, 6, 7

- 1, 2, 3, 5, 6

- 1, 2, 3, 5, 7



Relacione las etapas del ciclo vital familiar con momentos de crisis o riesgos que correspondan:

ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR	MOMENTOS DE CRISIS O RIESGOS
1. Familia que comienza. 2. Familia en nido vacío.	a. Falta de acuerdos. b. Jubilación no planificada. c. Pareja sin planes ni generatividad. d. Falta de límites claros.

Respuestas:

- 1ad, 2bc.

- 1ab, 2cd.
- 1bd, 2ac.
- 1cd, 2ab.

¿A qué función del proceso administrativo se refiere las siguientes acciones: guiar, orientar, conducir, encaminar, llevar al logro de los objetivos, tomar decisiones, mando y liderazgo?

Respuestas:

- Dirección.

- Planificación.
- Organización.
- Control.

Un paciente de 58 años hospitalizado, con diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca Congestiva, presenta un paro cardíaco. ¿Qué acción inmediata se realiza en este caso?

Respuestas:

- Reconocimiento del paro cardíaco y activación del sistema de respuesta a emergencias.

- Reanimación Cardiopulmonar precoz con énfasis en las compresiones torácicas.
- Desfibrilación rápida con desfibrilador externo automático.
- Brindar cuidados posparo cardíaco multidisciplinarios.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Paciente femenino 38 años, acude al servicio de emergencia por presentar cuadro clínico de 72 horas de evolución, caracterizado por: distensión abdominal progresiva, dolor abdominal tipo cólico, vómito, ausencia de gases y deposiciones. Según indicaciones prescriben realizar un enema evacuante. Al momento de insertar el tubo del enema se produce una resistencia en el esfínter interno del ano. ¿Qué acción aplicaría para realizar el correcto procedimiento?

Respuestas:

- **Pedir al paciente que respire profundo.**
- Colocar al paciente en posición semifowler.
- Insertar el tubo hacia el recto, en dirección lumbar.
- Realizar la inserción del tubo de 11-14 cm.

Complete el siguiente enunciado:

La hepatitis A se transmite a través de la vía _____, el período de incubación del virus varía de _____ días y dentro de las manifestaciones se encuentra la _____.

Respuestas:

- **fecal oral - 15 a 45 - ictericia.**
- parenteral - 15 a 45 - leucopenia.
- fecal oral - 7 a 45 días - leucopenia.
- parenteral - 15 a 30 días - ictericia.

Tras ser diagnosticada de cáncer de colon, una paciente de 68 años ha sido intervenida quirúrgicamente y se le ha practicado una resección intestinal con colostomía sigmoidea. La vigilancia del estoma durante las primeras 48h es fundamental para detectar precozmente la presencia de complicaciones. ¿Cuál de las siguientes constituye un signo de alarma en este periodo?

Respuestas:

- **Sangrado moderado.**
- Ligero edema.
- Secreción continua de pequeña cantidad de líquido.
- Dehiscencia.



¿En qué orden descendente se colocan las vacunas consideradas sensibles a bajas temperaturas?

Respuestas:

- **DPaT, hexavalente, DPwT, Pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, HPV, meningococo, Neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea y rotavirus.**
- DPaT, pentavalente, hepatitis A, hexavalente, DPwT, pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, HPV, meningococo, neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea y rotavirus.
- HPV, meningococo, neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea, rotavirus, hepatitis B, HPV, DPaT, hexavalente, DPwT, pentavalente y hepatitis A.
- Pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, DPaT, DPwT, HPV, meningococo, neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea, rotavirus y hexavalente.

¿Qué acción ejerce el Primer Nivel de atención del Sistema Nacional de Salud?

Respuestas:

- **Garantiza una referencia y contrarreferencia adecuada.**
- Resuelve los problemas de salud de alta complejidad.
- Atención ambulatoria y hospitalización.
- Experimentación Clínica en Centros de Diagnóstico.

La frecuencia respiratoria de un adulto sano que oscila entre 12 a 20 respiraciones por minuto, se denomina:

Respuestas:

- **Eupnea.**
- Bradipnea.
- Taquipnea.
- Apnea.



Mujer de 57 años acude a un centro de salud por presentar cefalea intensa y epistaxis, el resultado de la toma de presión arterial es 170/90, con antecedentes familiares de hipertensión arterial, no está medicada. Sin tratamiento respectivo y control adecuado de la presión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones a mediano y largo plazo?

Respuestas:

- **Hipertrofia ventricular izquierda, daño cardíaco extenso, cambios patológicos en los riñones, compromiso vascular cerebral que puede desencadenar ataque isquémico transitorio.**

- Disminución de la elasticidad de los vasos sanguíneos importantes, por lo que la aorta y las grandes arterias tienen menos capacidad para alojar el volumen de sangre bombeado por el corazón.

- Hipotensión postural, pérdida de sodio, potasio o magnesio, hiperpotasemia, letargo, mialgias, resequedad de la boca, sed, debilidad, así como diarrea y otros síntomas digestivos.

- Edema dérmico, disnea paroxística nocturna, ortopnea, ganancia ponderal, ingurgitación yugular, disminución de la tolerancia a la actividad, gastritis congestiva.

Indique a qué patología hace referencia la definición: Síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de sobrecarga hídrica o de perfusión tisular inadecuada, como resultado de la incapacidad del corazón para bombear una adecuada cantidad de sangre para cubrir las demandas del organismo.

Respuestas:

- **Insuficiencia cardíaca.**

- Angina de pecho.

- Arritmia cardíaca.

- Infarto agudo de miocardio.

Una paciente de 38 años, con talla de 1.53 mts y un peso de 62 kg. De acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC). ¿Qué estado nutricional tiene la paciente?

Respuestas:

- **Sobrepeso.**

- Normal.

- Obesidad.

- Obesidad extrema.



Paciente femenina de 60 años, diagnosticada con cáncer de mama, que posterior a recibir radioterapia presenta alteraciones en la piel. ¿Qué intervención de enfermería usted realizaría en esta paciente?

Respuestas:

- Valorar las vesículas que se formen.

- Aplicar talco, lociones y ungüentos.
- Lavar frecuentemente la zona.
- Aplicar apósitos térmicos o hielo.

Paciente hospitalizada con diagnóstico de diabetes mellitus, al realizar la valoración física de enfermería se observa erupciones cutáneas en todo su cuerpo, exudado con secreción purulenta, prurito y zona eritematosa. Identifique el patrón funcional alterado de acuerdo al enunciado:

Respuestas:

- Patrón nutricional metabólico.

- Patrón rol relaciones.
- Patrón eliminación.
- Patrón actividad -ejercicio.

La capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en una persona infectada se denomina:

Respuestas:

- Patogenicidad.

- Inmunogenicidad.
- Infectividad.
- Virulencia.

¿Qué examen de laboratorio se utiliza para evaluar el grado de control de glucemia en un paciente diabético durante los tres últimos meses?

Respuestas:

- Hemoglobina glucosilada.

- Glucosa plasmática en ayuno.
- Prueba de tolerancia oral a la glucosa.
- Examen aleatorio de glucosa en sangre.



Relacione las enfermedades inmunoprevenibles con la puerta de entrada y de salida en la cadena epidemiológica:

Enfermedades inmunoprevenibles	Puerta de entrada y salida.
1. Poliomielitis aguda	a. Puerta de entrada: Lesiones cutáneas Puerta de salida: Vía digestiva
2. Tétanos	b. Puerta de entrada: Vía digestiva Puerta de salida: Vía digestiva
3. Hepatitis B	c. Puerta de entrada: Vía respiratoria Puerta de salida: Vía respiratoria
4. Meningitis Meningocócica	d. Puerta de entrada: Lesiones en piel, o mucosas. Puerta de salida: Líquidos corporales: sangre y derivados

Respuestas:

- **1b, 2a, 3d, 4c.**
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1c, 2d, 3b, 4a.
- 1d, 2c, 3a, 4b.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Mujer de 65 años, acude por presentar despistes en la recepción de mensajes (olvidaba recados que le dejaban o los transmitía a destiempo, a veces de forma reiterada a la misma persona). En varias ocasiones, regresaba de las compras olvidando artículos básicos; optó por llevar un listado para recordar comprar todo pero tenía problemas con los vueltos, guardaba y se olvidaba el sitio. En una ocasión no pudo regresar a la casa, habiéndose perdido y precisando de ayuda para volver. Esto causaba sentimientos de inutilidad, frustración y tristeza en la paciente. ¿Qué test se debe usar para medir este tipo de trastorno?

Respuestas:

- **Test Mini Mental-State.**

- Test de Rorschach.
- Test de Wais.
- Test de Wechsler.

La función de la gestión de enfermería comunitaria, que trata de asegurar que su trabajo responda en forma sistemática, racional y ordenada a las necesidades de la comunidad asegurando el uso adecuado de los recursos, corresponde a:

Respuestas:

- **Función administrativa.**

- Función investigadora.
- Función asistencial.
- Función educador.

Indique el factor relacionado en pacientes con discapacidad de acuerdo a la violencia sexual:

Respuestas:

- **La falta de conocimiento, oportunidades sociales, credibilidad, aislamiento, dependencia de familiares.**

- Excesivamente dóciles, agresivos y rebeldes.
- Enfermedades psicosomáticas, depresión.
- Trastornos del sueño, sentimientos o intentos de suicidio.



Paciente de 50 años, diagnosticado de Cirrosis hepática alcohólica, es atendido en el servicio de Medicina Interna. En el momento de la valoración se encuentra en reposo, presenta ascitis, ictericia generalizada, debilidad, anorexia, IMC= 16, TA= 100/60 mmHg. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en esta situación?

Respuestas:

- Evaluar el estado nutricional.

- Controlar ingesta y excreta.
- Valorar el nivel de tolerancia a la actividad.
- Valorar la integridad de la piel.

¿En qué consiste el Proceso de Atención de Enfermería?

Respuestas:

- Aplicación del método ordenado y científico en la práctica asistencial de enfermería.

- Aplicación de habilidades y destrezas para el ejercicio de la práctica.
- Proceso que se orienta a mejorar y resolver los problemas de salud.
- Proceso que al ejecutarse humaniza la atención e integra el cuidado.

La enfermera/o por prescripción médica en caso de convulsión tiene que administrar diazepam 8 mg, vía intravenosa; cuenta en el servicio con la presentación de diazepam en ampollas de 10 miligramos en 2 mililitros. ¿Qué cantidad de mililitros le administra al paciente para que reciba la dosis correcta?

Respuestas:

- 1.6 ml

- 0.8 ml
- 2.2 ml
- 1.3 ml



Paciente post-quirúrgico de Apendicetomía, en su fase de recuperación presenta un dolor severo de 9/10 de intensidad, el médico prescribe un analgésico opioide por la intensidad del dolor. Usted como personal de enfermería debe conocer del medicamento para evitar efectos adversos. ¿Cuál es el medicamento que pertenece a este grupo farmacológico?

Respuestas:

- **Fentanilo.**
- Paracetamol.
- Ketorolaco.
- Diclofenaco.

¿Cómo se integra la promoción de la salud en una estrategia de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles?

Respuestas:

- **Participación de los actores clave y la comunidad en la planificación, implementación y evaluación de programas e iniciativas.**
- Aumento de la publicidad del Ministerio de Salud Pública, como estrategia principal para modificar los comportamientos individuales que resultan en enfermedades crónicas.
- Fortalecimiento de los servicios de rehabilitación para discapacidades resultantes de las enfermedades crónicas no transmisibles.
- Ampliación de los horarios en centros especializados para atención a pacientes con patologías crónicas.

Indique qué es distocia dinámica:

Respuestas:

- **Conjunto de alteraciones de las contracciones uterinas que dificultan el progreso normal del parto.**
- Alteraciones de la posición fetal que dificultan o imposibilitan el parto normal.
- Alteración de la forma, dimensión, o inclinación de la pelvis materna que dificulta el parto normal.
- Falta de relación apropiada entre los componentes cefálicos y pélvicos.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Al momento de atender a sus pacientes que acuden a la consulta prenatal, una de las pacientes luego de una anamnesis y examen físico exhaustivo es diagnosticada con diabetes gestacional que se trata de un trastorno de intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Qué factores de riesgo identifica usted a la patología?

- a. Edad materna mayor de 30 años.
- b. Embarazo múltiple.
- c. Sobrepeso al inicio con IMC de 26.
- d. Anemia con tratamiento.
- e. Ganancia excesiva de peso durante el embarazo.
- f. Polihidramnios a repetición.

Respuestas:

- **a, c, e, f.**

- a, b, c, d.

- b, c, d, e.

- b, d, e, f.

Señale la opción de respuesta que contiene 3 métodos anticonceptivos que tienen efecto anovulatorio:

Respuestas:

- **Pastillas, parches, inyecciones.**

- Parches, inyecciones, ligadura.

- Píldora, dispositivo intrauterino DIU, inyecciones.

- Método de Billings, método del ritmo y parches.

Seleccione la respuesta que corresponde a la definición de bienestar fetal:

Respuestas:

- Estado de homeostasis fetal que se traduce clínicamente en presencia de movimientos fetales, aceleraciones de la FCF y bioquímicamente en pH de cuero cabelludo > 7.10

- Sospecha o confirmación de perturbación del estado metabólico basal del feto. Disminución del intercambio materno fetal de oxígeno que se expresa con disminución de movimientos fetales, alteraciones de la FCF y acidosis fetal.
- Compromiso permanente o transitorio del bienestar fetal que se evidencia durante el trabajo de parto. Bioquímicamente se traduce en hipoxia, hipercapnia y acidosis, manifestándose clínicamente con alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal
- Término inespecífico e inadecuado utilizado para designar un “riesgo de pérdida o compromiso del bienestar fetal”.

Paciente adulto que necesita un seguimiento de su estado nutricional para disminuir riesgos de adquirir enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el indicador preciso que nos permite identificar estos riesgos?

Respuestas:

- Índice cintura cadera del paciente.**
- Mediciones bioquímicas en sangre.
- Patrones de alimentación individuales.
- Valoración clínica del estado del paciente.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Ordene en forma secuencial los cuidados de enfermería a un recién nacido que está recibiendo nutrición enteral por sonda nasogástrica.

1. Posición del recién nacido.
2. Lavado de manos.
3. Prevención de exclusión de la sonda.
4. Higiene Oral.
5. Manejo de la fórmula enteral en caso de no contar con leche materna.

Respuestas:

- 2, 1, 4, 5, 3
- 2, 4, 1, 5, 3
- 1, 3, 4, 2, 5
- 1, 2, 3, 4, 5

¿Qué acción se debe realizar para prevenir infecciones en el paciente con sonda urinaria a permanencia?

Respuestas:

- Usar técnica aséptica durante la inserción de la sonda.
- Irrigar la sonda con jeringa de manera sistemática.
- Vaciar la bolsa de recolección al menos cada 24 horas.
- Realizar cambio sistemático de la sonda vesical.

¿Cuáles son los conceptos descritos por Florence Nightingale en la teoría del entorno, que se deben manejar en la atención a pacientes?

Respuestas:

- Ventilación, temperatura, silencio, dieta e higiene.
- Temperatura, confort, silencio, dieta y desinfección.
- Desinfección, esterilización, descanso, temperatura y dieta.
- Silencio, climatización, energía, dieta y temperatura.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Con relación a los siguientes resultados de laboratorio: Na. 140 mEq/L; K. 2.7 mEq/L; Ca. 8.9 mg/dL; Mg: 2.1 mg/dL ¿Qué trastorno electrolítico se evidencia?

Respuestas:

- **Hipopotasemia.**
- Hipernatremia.
- Hipocalcemia.
- Hipermagnesemia.

Al momento de realizar la visita domiciliaria, se identifica a un hombre quien fue diagnosticado de Diabetes mellitus tipo II hace un año; señala que su esposa prepara la misma dieta para toda la familia, su hijo mayor aporta con las compras de medicamentos y su hijo menor le dedica una hora diaria para hacer ejercicios. Todo esto ha permitido que se sienta muy satisfecho y pueda mejorar su estado de salud. ¿Según la prueba de Apgar Familiar que parámetro estamos midiendo?

Respuestas:

- **Participación.**
- Adaptación.
- Gradiente de recursos.
- Afecto.

Al atender el parto de una gestante de 35.5 semanas, se le asigna el cuidado inmediato del recién nacido. ¿Cuál es el tiempo oportuno para realizar el pinzamiento del cordón umbilical cuando no existen peligros para la vida?

Respuestas:

- **Entre 30 y 60 segundos.**
- En los primeros 10 segundos.
- Entre 20 y 30 segundos.
- Después de los 60 segundos.



Paul de 50 años, llega al servicio de urgencias quejándose de dolor abdominal generalizado que se irradia a la espalda, más ascitis, a nivel de la inspección presenta ictericia a nivel de las escleras, anurico, hipotenso, taquipneico y disnea, edema periférico con signo de godet grado II realizan exámenes de electrolitos séricos los cuales indican un sodio de < 275 mosm/kg, entre los cuidados de enfermería tendríamos que realizar:

Respuestas:

- **Restricción de agua libre más el uso de diuréticos de asa de Henle, diálisis, o ambas, para corregir el incremento del agua y el sodio corporal total.**

- Reposición de Volumen con suero fisiológico a una velocidad lenta, para disminuir el estímulo de ADH
- Solo restricción de agua libre evoluciona adecuadamente
- Suero Salino Hipertónico NaCl 3% y se debe evaluar cada 4 a 5 horas en bolo de 200 ml /h.

Luego de la valoración del adulto mayor, el profesional en Enfermería comprueba que tiene un índice de Barthel de 40 – 55. ¿Qué nivel de dependencia tiene el paciente?

Respuestas:

- **Dependencia moderada.**

- Dependencia leve.
- Dependencia severa.
- Dependencia total.

Al realizar el examen físico de las extremidades, usted encuentra una zona edematosa al presionar durante varios segundos y después de soltar tiene una profundidad de 6 mm. Identifique el grado de edema que corresponde.

Respuestas:

- **Edema 3+**

- Edema 1+
- Edema 2+
- Edema 4+



Personal de enfermería con experiencia de 2 años, planifica sus intervenciones con base a protocolos, sin embargo, identifica que existe limitaciones para cumplir las actividades, por lo que coordina y diseña planes de mejora para el cuidado del paciente. De acuerdo a la teoría de Patricia Benner. ¿Cuál es el nivel de experiencia que demuestra el profesional?

Respuestas:

- Competente.

- Experta.
- Eficiente.
- Principiante.

Como profesional del Servicio de Emergencias, usted recibe en su turno de trabajo a un hombre de edad desconocida (se estiman unos 65 años), atropellado en una vía de alta velocidad. El paciente presenta un traumatismo frontal con herida que sangra profusamente, al realizar la valoración aplicando la escala de Glasgow, usted encuentra un paciente con apertura ocular ante estímulos dolorosos, con lenguaje incomprensible que sólo emite gruñidos y suspiros, y al evaluar la respuesta motora se percibe una flexión anormal de los miembros. Atendiendo estas características. ¿Qué puntuación usted asignaría a este paciente?

Respuestas:

- 7 puntos.

- 10 puntos.
- 3 puntos.
- 12 puntos.

Para participar con acciones que contribuyan a la satisfacción de necesidades y solución de problemas inherentes al equilibrio hidroelectrolítico, el personal de enfermería realiza los siguientes cuidados: observar la alimentación, vigilar ingesta de líquidos, estado de piel y mucosas, eliminación urinaria e intestinal y sus alteraciones, y control de signos vitales. ¿Qué acción aplicaría para el control de la ingesta y excreción de líquidos?

Respuestas:

- Medir los líquidos que egresan de cualquier parte del organismo.

- Medir los líquidos que ingresan al organismo solamente administrados por vía oral.
- Hacer balance correspondiente en 6 horas, anotando horario de inicio y final.
- Medir los líquidos que ingresan al organismo por vía parenteral.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



En relación al sistema de conducción cardíaco (sistema eléctrico del corazón). Ordene la secuencia del impulso eléctrico:

1. Nódulo auriculoventricular (AV).
2. Nódulo sinoauricular (SA).
3. Fibras de Purkinje.
4. Haz de His.

Respuestas:

- 2, 1, 4, 3.
- 3, 2, 1, 4.
- 1, 2, 3, 4.
- 4, 1, 2, 3.

Paciente gestante de 23 años ingresa al servicio de centro obstétrico por sentir contracciones uterinas que se asemejan a calambres menstruales, con un dolor en la parte baja de la espalda que aparecen y desaparecen en intervalos de 20 a 30 minutos. Al ser valorada por el médico establece que la dinámica uterina es regular, con una dilatación de 3-4 cm encontrándose en fase activa de labor, por lo que se indica la admisión de la embarazada a trabajo de parto del centro obstétrico. Pero falta un criterio para la admisión que es el borramiento cervical. ¿Usted cómo profesional de enfermería, que porcentaje considera adecuado para un borramiento cervical en esta etapa?

Respuestas:

- **Borramiento cervical > 50%**
- Borramiento cervical > 10%
- Borramiento cervical ausente
- Borramiento cervical del 100%



Con relación a la prevención y control de la tuberculosis. ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención se debe aplicar para evitar su contagio y transmisión?

Respuestas:

- Una persona afectada con TB, bacteriológicamente positiva, debe usar mascarilla quirúrgica.

- Una persona afectada con TB, debe hospitalizarse para un mejor control de la enfermedad.
- Informar sobre sus contactos después de los 7 días posteriores al tratamiento para establecer el control.
- Realizar control de contactos dentro de los primeros seis meses de iniciado el tratamiento.

En la educación para la salud el profesional enfermero/ra utiliza la técnica discusión de grupo. Seleccione las condiciones básicas para la aplicación de esta técnica:

1. El grupo debe tener un previo conocimiento sobre el tema.
2. Modificar en el grupo conductas negativas, relacionadas con la promoción y restauración de la salud.
3. Aplicar la técnica a grupos de entre 10 a 12 personas.
4. Intercambiar las ideas y opiniones de sus miembros.
5. Ayudar al grupo a adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades para mantener un estilo de vida saludable.
6. El educador debe tener experiencia en técnicas grupales.

Respuestas:

- 1, 3, 4, 6

- 1, 2, 5, 6

- 2, 3, 4, 5

- 1, 2, 3, 5

El profesional de enfermería para el cuidado integral de la persona, familia o comunidad; utiliza la implementación de las etapas del proceso de atención de enfermería que se interrelacionan entre sí para el logro del objetivo alcanzado. ¿A qué característica del proceso hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- Sistemático.

- Dinámico.
- Interactivo.
- Flexible.



Señale cuáles son las causas fetales para la realización de una cesárea:

- a. Compromiso de bienestar fetal.
- b. Tumor benigno o maligno del canal de parto.
- c. Distocias de presentación.
- d. Cirugía uterina previa, plastia vaginal.
- e. Embarazo múltiple con distocia de presentación o patología obstétrica.
- f. Malformaciones fetales o gemelos siameses que supongan distocias.

Respuestas:

- a, c, e, f.

- a, c, d, f.

- b, d, e, f.

- b, c, e, f.

Una mujer nulípara, gestante de 38 semanas con los siguientes síntomas: hace 2 horas le salió de su vagina una secreción mucosa, sanguinolenta, abundante, en forma espontánea, después de lo cual ha tenido unas contracciones uterinas que ha ido registrando en las últimas horas de una duración de 30 a 40 segundos con una frecuencia de cada 20 minutos. Según estas características la paciente se encuentra en la etapa:

Respuestas:

- Primera etapa del parto.

- Segunda etapa del parto.

- Tercera etapa del parto.

- Cuarta etapa del parto.



Seleccione las características de la participación comunitaria:

1. Organizada.
2. Inducida.
3. Sostenida.
4. Consciente.
5. Espontánea.
6. Deliberada.

Respuestas:

- 1, 3, 4, 6.
- 2, 4, 5, 6.
- 2, 3, 4, 5.
- 1, 2, 4, 5.

Tomando como referencia los diagnósticos de enfermería con estructura NANDA. ¿Cuál es la formulación correcta del diagnóstico con etiqueta "Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos"?

Respuestas:

- **Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos relacionado con obstrucción intestinal, ascitis, sepsis, lesión traumática, quemaduras.**
- Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, relacionado con cirugía abdominal, manifestado por ascitis.
- Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, relacionado con cirugía abdominal, manifestado por obstrucción intestinal.
- Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, relacionado con lesión traumática, manifestado por la evolución de la fractura de cadera.

Florence Nightingale, indica que, dentro de los principios bioéticos, los profesionales de enfermería deben “abstenerse de todo lo que sea perjudicial o maligno y de tomar o administrar drogas sabiendo que puedan ser nocivas a la salud”. ¿A qué principio bioético se refiere?

Respuestas:

- **Principio de No maleficencia.**
- Principio de autonomía.
- Principio de beneficencia.
- Principio de justicia.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



¿Cuál es la dosis en la administración de mantenimiento del sulfato de magnesio en la preeclampsia para prevención de eclampsia?

Respuestas:

- **50 ml/h.**
- 90 ml/h.
- 80 ml/h.
- 70 ml/h

Paciente de postparto inmediato con diagnóstico de choque séptico. Durante el manejo de la patología, el médico le solicita que administre un antibiótico de amplio espectro beta-lactámico que actúe inhibiendo la síntesis de la pared celular. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene este mecanismo de acción?

Respuestas:

- **Ampicilina/Sulbactam.**
- Clindamicina.
- Metronidazol.
- Gentamicina.

Dentro de la institucionalización del cuidado enfermero, surgen mujeres encargadas de brindar la atención a los enfermos, entre ellas las matronas romanas. ¿Cuál matrona se destacó en esa época?

Respuestas:

- **Fabiola.**
- Febe.
- Peplau.
- Henderson.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Paciente acude al servicio de Consulta Externa por presentar incapacidad para ingerir alimentos, diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso importante. Seleccione la etiqueta diagnóstica prioritaria según la NANDA-I.

Respuestas:

- **Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades.**

- Déficit de autocuidado: alimentación.
- Disposición para mejorar la nutrición.
- Patrón de alimentación ineficaz.

Los siguientes enunciados tienen relación con la ictericia fisiológica en el recién nacido. EXCEPTO:

Respuestas:

- **El abandono definitivo de lactancia materna es idóneo para disminuir la ictericia.**

- El meconio contiene abundante bilirrubina.
- El mayor consumo de leche y agua incrementa el nivel sérico de bilirrubina.
- En el aumento de bilirrubina en el recién nacido está indicado el uso de fototerapia.

¿Cuál es la dosis de administración para maduración pulmonar fetal?

Respuestas:

- **Betametasona 12 mg intramuscular glútea, cada 24 horas, por un total de 2 dosis.**

- Gluconato de calcio al 10 %, 1 gramo por vía intravenosa en 10 minutos.
- Nifedipino 10 miligramos vía oral cada 20 minutos a 30 minutos según respuesta.
- Dexametasona 4 miligramos intramuscular, cada 24 horas por 4 dosis.

Usted como coordinador de Enfermería quiere evaluar la producción del personal de los servicios críticos, para lo cual debe basar su actuación en una teoría administrativa que mida la eficiencia y la productividad, dando como resultado un pago a los trabajadores. ¿Cuál autor menciona dicho enfoque?

Respuestas:

- **Frederick Winslow Taylor.**

- Elton Mayo.
- Douglas McGregor.
- Henry Laurence Gantt.



¿Cómo se denomina a la respiración que se caracteriza por la sucesión de ciclos respiratorios en los que aumenta gradualmente tanto la frecuencia como la profundidad de la respiración para después descender de la misma manera y que se intercalan con cortos períodos de apnea?

Respuestas:

- Cheyne-Stokes.

- Kussmaul.
- Biot.
- Eupnea.

El profesional en Enfermería tiene un paciente con nutrición parenteral total (NPT) y debe monitorizar su nivel de glucosa en sangre. ¿Por qué debe hacerlo si el paciente no tiene diabetes?

Respuestas:

- La NPT puede causar hiperglucemia, por eso se debe mantener su nivel de glicemia dentro de un rango aceptable.

- La NPT tiene niveles altos de dextrosa, lo que puede provocar diabetes, por eso debe controlarse regularmente.
- Verificar el nivel de glucosa en sangre es importante porque se debe administrar insulina siempre que se hace NPT.
- Monitorizar el nivel de glucosa en sangre es importante porque con eso se verifica si la NPT es efectiva o no.

Una persona que se encuentra en la Fase Final de la Vida, al ser valorada presenta: valores de Hb de 10 g/dL, disminución de la fuerza muscular, disminución del índice de masa grasa corporal y pérdida de peso del 10 % en el último año. Seleccione el criterio mayor para el diagnóstico de caquexia:

Respuestas:

- Pérdida de peso del 10 % en el último año.

- Disminución del índice de masa grasa corporal.
- Disminución de la fuerza muscular.
- Hemoglobina de 10 g/dl.



En un centro de salud ubicado en una ciudad que se encuentra a una altura superior a 2 500 metros sobre el nivel del mar. Usted prepara a una mujer de 36 años con embarazo de 28 semanas, presenta los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca 98 por minuto, frecuencia respiratoria 22 por minuto, tensión arterial 130/85 mm Hg, temperatura axilar 36 °C, Sat O2 93 %. ¿Cuál es el parámetro de la herramienta SCORE MAMÁ que dependiendo de la altura sobre el nivel de mar en la que se encuentre la usuaria, le asigna un puntaje de cero?

Respuestas:

- **Saturación de Oxígeno.**

- Frecuencia respiratoria.
- Temperatura.
- Frecuencia cardíaca.

Mujer embarazada acude a consulta y es diagnosticada con anemia. ¿Qué alimentos sugiere usted que aumente a su dieta?

- a. Carnes rojas.
- b. arroz integral.
- c. Visceras.
- d. Pescado.
- e. Frutos rojos.
- f. Lentejas.

Respuestas:

- **a, c, d, f.**

- b, c, e, f.
- a, d, e, f.
- b, c, e, f.

Paciente ingresa al servicio de quemados por presentar lesiones térmicas en el tórax anterior y posterior; el médico indica reposición de líquidos para el manejo. Se debe iniciar el tratamiento utilizando la regla de los 9 para definir la superficie corporal quemada. ¿Cuál es la extensión de la quemadura que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Superficie corporal quemada 36%**

- Superficie corporal quemada 18%
- Superficie corporal quemada 9%
- Superficie corporal quemada 45%



En el servicio de Pediatría, usted prepara para la consulta de control de niño sano a un niño de 23 meses, inicia con la toma de medidas antropométricas, colocando en posición de cúbito supino y midiendo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies (talones). ¿Qué medida antropométrica está tomando en relación con la edad del niño?

Respuestas:

- **Longitud.**

- Talla.
- Peso.
- IMC.

¿En el recién nacido de hasta 48 horas, que catéter se debe utilizar?

Respuestas:

- **Catéter umbilical.**

- Catéter percutáneo.
- Catéter central.
- Catéter intraóseo.



Seleccione las medidas de prevención de la Hepatitis B.

- 1. Vacunación a los grupos de riesgo según la normativa del M.S.P. Ecuador.**
- 2. Abastecimiento de agua potable segura y evacuación apropiada de aguas residuales.**
- 3. Monitoreo regular de las coberturas de vacunación en cada distrito de salud.**
- 4. Aplicación de medidas de higiene básicas y lavado meticuloso de las manos.**
- 5. Prácticas de bioseguridad y manejo de materiales cortopunzantes y biológicos.**
- 6. Cuidado en la preparación de alimentos y eliminación sanitaria de las heces.**

Respuestas:

- **1, 3, 5**
- 2, 3, 6
- 4, 5, 6
- 5, 1, 6

Paciente masculino de 38 años, llega al servicio de emergencia con sangrado profuso con herida por arma blanca en miembro inferior derecho. A la valoración presenta: confusión, TA= 85/60 mmHg, FC= 110 X', FR= 32 X', mucosas orales secas y oliguria. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario en este caso?

Respuestas:

- **Déficit del volumen de líquidos R/C pérdida activa de líquidos M/P oliguria.**
- Patrón Respiratorio Ineficaz R/C hiperventilación M/P taquipnea.
- Riesgo de disminución del gasto cardíaco R/C alteración de la FC.
- Confusión aguda R/C deshidratación M/P alteración en el nivel de conciencia.



Usted como líder del servicio de Emergencia debe orientar al personal de nuevo ingreso para evitar dificultades, a pesar de su experiencia en otras áreas. La inducción es necesaria para orientar al personal de enfermería ya que se enfrenta a un área desconocida. Este enunciado a qué teorizante hace referencia.

Respuestas:

- **Patricia Benner.**

- Madeline Leininger.
- Jean Watson.
- Kristen Swanson.

En el recién nacido prematuro el mantener la temperatura corporal depende del grado de madurez del centro termorregulador, por lo tanto debe realizarse una monitorización de la Temperatura. Para realizar el control de la temperatura. ¿Qué tipo de monitorización aplicaría?

Respuestas:

- **Monitorización continua no invasiva.**

- Monitorización con infrarrojos.
- Monitorización intermitente.
- Monitorización continua invasiva.

El ensayo y error se define como:

Respuestas:

- **Un enfoque con resultados desconocidos.**

- Enfoque que adquiere conocimientos por implicación personal.
- Enfoque que incluye verdades o creencias basadas en costumbres.
- Estilo de aprendizaje que se basa en aprender por imitación.

¿Cuáles son los cambios esperados que pueden observarse conforme avanza la enfermedad de Alzheimer?

Respuestas:

- **Incapacidad para nombrar los objetos, apraxia y alexia**

- Rigidez – Bradicinesia – Inestabilidad Postural
- Labilidad emocional, sialorrea y disfagia
- Marcha festinante, disminución de la sensibilidad y déficit motor.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Como profesional de Enfermería de sala de partos al atender a un recién nacido, para controlar la oxigenación del mismo, debe realizar oximetría de pulso. De acuerdo a la saturación de oxígeno esperable en el recién nacido durante la reanimación post parto descrita en el Normograma de Dawson. ¿Cuánto de Sat O2 se espera a los 4 minutos?

Respuestas:

- **75 - 80%**
- 65 - 70 %
- 70 -75%
- 80 - 85%

Paciente de 65 años, durante el examen físico presenta: PA:150/100mmHg, FC:130 X', se realiza un electrocardiograma y se evidencia arritmias. Para la valoración de enfermería utiliza la tipología de Marjory Gordon. ¿Cuál es el patrón funcional que se encuentra alterado?

Respuestas:

- **Patrón actividad-ejercicio.**
- Patrón nutricional-metabólico.
- Patrón eliminación.
- Patrón percepción manejo de salud.

Durante su práctica habitual debe iniciar el proceso enfermero para el cuidado de un paciente, establecer prioridades, elaborar objetivos y determinar los cuidados de enfermería. ¿Cuál es la etapa del proceso de atención de enfermería que hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- **Planeación.**
- Valoración.
- Diagnóstico.
- Ejecución.

Paciente que ingresa al servicio de Emergencia por presentar trauma craneoencefálico. A la valoración de enfermería se observa que no abre los ojos bajo ningún estímulo, al preguntar su nombre responde con palabras inapropiadas y al evaluar la respuesta motora observa una flexión anormal (GLASGOW 7/15). ¿Cuál es el principal objetivo de enfermería en el manejo de este paciente?

Respuestas:

- **Mantener la vía respiratoria.**

- Vigilar la Función Neurológica.
- Vigilar el Equilibrio Hidroelectrolítico.
- Proveer la Nutrición Adecuada.

De acuerdo a la longitud de la aguja, ¿cuál es el ángulo correcto de administración de medicamentos por vía subcutánea?

Respuestas:

- **45° o 90°**
- 5° o 15°
- 15° o 45°
- 5° o 90°

Indique el trastorno hemorrágico que se caracteriza por la expulsión de sangre por la boca, precedido de tos y procedente del aparato respiratorio subglótico, pulmones y bronquios principalmente.

Respuestas:

- **Hemoptisis.**
- Hematemesis.
- Epistaxis.
- Melena.

Seleccione una medida de control ambiental que debe aplicar para la prevención de tuberculosis en las unidades de salud:

Respuestas:

- Instalación de sistema de ventilación con presión negativa en laboratorios y salas donde se efectúan procedimientos que induzcan tos.

- Evitar la circulación de personas con TB bacteriológicamente positiva fuera de sus habitaciones.
- Colocar mascarilla quirúrgica a los afectados con TB cuando se tengan que trasladar al interior o exterior del establecimiento de salud.
- Usar respiradores N95 durante la realización de broncoscopias u otros procedimientos que inducen tos o generan aerosoles.

Paciente femenina de 28 años quien recibe terapia con digoxina, al observar el Electrocardiograma usted identifica acortamiento del segmento ST y del intervalo QT, la paciente tiene bradicardia y disminución de los reflejos osteotendinosos, los niveles de calcio en sangre se encuentran en 11 mg/dL. ¿Cuál de las siguientes alteraciones electrolíticas es más probable que experimente la paciente?

Respuestas:

- Hipercalcemia.

- Hipocalcemia.
- Hiperpotasemia.
- Hipopotasemia.

El profesional en Enfermería debe aplicar 1 000 ml de NaCl al 0.9 % (IV), durante 6 horas. ¿Con cuánta solución se debe programar la bomba de infusión?

Respuestas:

- 167 ml/h.

- 200 ml/h.
- 600 ml/h.
- 800 ml/h.



Paciente de 66 años, hospitalizado desde hace 15 días en el área de UCI con ventilación mecánica invasiva. Durante el turno se observa que el paciente presenta mal olor y presencia de secreción blanquecina a nivel bucal. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es prioritaria para realizar la higiene oral al paciente?

Respuestas:

- **Aplicar solución antiséptica de clorhexidina al 0.12%**

- Cepillar primero las superficies exteriores de los dientes.
- Evitar realizar aspiraciones durante el procedimiento.
- Un enfermero se encarga del cuidado de un paciente.

Según el modelo de causalidad, a las acciones u omisiones, incluyendo errores y violaciones, que tienen consecuencias adversas inmediatas, se les denomina:

Respuestas:

- **Fallas activas.**

- Fallas recurrentes.
- Fallas latentes.
- Fallas inactivas.

Para estimar la edad gestacional de una recién nacido debe realizar un examen físico. A la valoración se identifica: glándula mamaria no palpable, el pezón apenas visible, no se observa pliegues plantares y la piel fina y lisa. ¿Cuál de las siguientes escalas de valoración está utilizando en ese momento?

Respuestas:

- **Escala de Capurro.**

- Escala de Silverman.
- Escala de Apgar.
- Escala de Ballard.

Existen casos especiales en los que no se debe administrar vacunas porque tienen contraindicaciones definitivas, identifique cuáles son:

Respuestas:

- **Niños con VIH/SIDA no administrar vacunas de virus vivos atenuados.**

- Niños que tienen bajo peso al nacer no administrar la vacuna HB0.
- Niños con alergia al huevo no administrar la vacuna antineumocócica.
- Niños con convulsión post vacunal no administrar la vacuna DT.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Indique a que término corresponde lo siguiente: “Se define como un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una visión previa de lo que va a ocurrir”.

Respuestas:

- **Teoría.**

- Modelo.
- Rol.
- Paradigma.

¿A qué alteración de la respiración corresponde la siguiente definición? Tipo de respiración que se caracteriza por cambios de ritmo en la intensidad respiratoria y presenta un período de apnea más o menos largo seguido de una serie de respiraciones que van aumentando de amplitud y otra serie de respiraciones de amplitud decreciente hasta un nuevo período de apnea.

Respuestas:

- **Respiración de Cheyne Stokes.**

- Respiración de Kussmaul.
- Respiración de Biot.
- Respiración de Apneusis.

Mujer con 32 semanas de embarazo, presenta sangrado vaginal abundante de color rojo rutilante, con frecuencia cardíaca fetal 140 latidos por minutos, frecuencia cardíaca materna 100 latidos por minutos, presión arterial 120/70 mmHg, no presenta contracciones uterinas. ¿Cuál de las siguientes opciones es el diagnóstico?

Respuestas:

- **Placenta previa.**

- Aborto.
- Rotura uterina.
- Hematoma retroplacentario.



En el servicio de Neonatología, usted valora a un RN de 37 semanas que presenta: síndrome de dificultad respiratoria con taquipnea, cianosis, quejido, aumento del esfuerzo con retracciones intercostales, saturación de O₂ 89 %, en la radiografía de tórax se puede evidenciar una discreta opacidad y resultado de gasometría alterado. ¿Cuál es la patología que presenta el RN?

Respuestas:

- **Membrana Hialina.**

- Hipertensión pulmonar persistente.
- Síndrome de aspiración de líquido meconial.
- Taquipnea transitoria.

En relación a los métodos de diagnóstico del VIH-SIDA, complete el siguiente enunciado:

La prueba de laboratorio que determina la presencia de anticuerpos contra VIH en la sangre es _____ y los resultados positivos se validan con la prueba _____.

Respuestas:

- **ELISA - Western blot.**

- Western blot - Antígeno p24.
- ELISA – Carga viral.
- Carga viral – Antígeno p24.

Paciente de 58 años que acude a la consulta por presentar cuadro clínico de 72 horas de evolución caracterizado oliguria, hipercoluria y leve edema bi-maleolar bilateral que cede con cambios posicionales; el personal de enfermería valora los signos vitales encontrando una presión arterial de 160/90 mmHg y al analizar el resultado del Examen de orina se reflejan Proteínas= + Hematíes= campo lleno. ¿Qué síndrome clínico presenta el usuario?

Respuestas:

- **Síndrome nefrítico.**

- Síndrome nefrótico.
- Síndrome de Insuficiencia renal aguda.
- Síndrome de Insuficiencia renal crónica.



La presión arterial promedio durante el ciclo cardíaco se denomina **Presión Arterial Media (PAM)**, y se calcula con la siguiente fórmula:

Respuestas:

- **Presión Sistólica + (2 Presión Diastólica) / 3**

- Presión Sistólica + (1 Presión Diastólica) / 2

- Presión Sistólica + (Presión Diastólica) / 3

- Presión Diastólica + (2 Presión Sistólica) / 3

Identifique el reflejo del recién nacido que se examina al desplazar nuestra mano a lo largo de la cara lateral de la planta del pie, cuya respuesta normal será la hiperextensión del dedo gordo y la separación del resto de los dedos.

Respuestas:

- **Reflejo de Babinski.**

- Reflejo de Moro.

- Reflejo de prensión.

- Reflejo de succión.

¿Cuál es el orden de las actividades inmediatas de enfermería en la recepción del recién nacido?

1. Control de signos vitales.
2. Medidas antropométricas, apego precoz.
3. Apgar al minuto y a los cinco minutos.
4. Aspirar secreciones.
5. Administración de credé y vitamina k.

Respuestas:

- **1, 2, 5**

- 3, 4, 2

- 1, 3, 4

- 2, 5, 3



En la exploración de genitales de un neonato de 7 días de nacido, se encuentra ausencia de uno de los testículos en la bolsa escrotal, la madre refiere que el neonato nació de 35 semanas. ¿A qué tipo de anomalía congénita se refiere este caso?

Respuestas:

- **Criptorquidia.**

- Hidrocele.
- Hipospadias.
- Micropene.

Seleccione las funciones del CONE comunitario a nivel operativo:

1. **Provisión de ácido fólico y asesoría, con el fin de prevenir defectos del tubo neural.**
2. **Fortalecen las capacidades de las parteras para identificar señales de peligro.**
3. **Promoción de la adecuada nutrición y el mantenimiento de ambientes saludables**
4. **Actualizan mensualmente en forma participativa el mapa parlante para identificar a las embarazadas y recién nacidos.**
5. **Identificación de embarazadas y recién nacidos a través de visitas domiciliarias**
6. **Aplica y vigila el cumplimiento de los programas de prevención y atención prenatal.**

Respuestas:

- **1, 3, 5, 6**

- 1, 3, 4, 5

- 2, 4, 5, 6

- 2, 3, 5, 6



Una paciente de 17 años solicita orientación sobre la aplicación de la nueva vacuna para VPH. Según la teoría de los sistemas planteada por Dorothea E. Orem. ¿Cuál se aplica en este caso?

Respuestas:

- Apoyo educativo.

- Parcialmente compensador.
- Totalmente compensador.
- Autocuidado.

Usted debe tomar la presión arterial de un paciente que ingresa al servicio de Medicina Interna, durante la auscultación se identifica un ruido tipo golpeteo rítmico claro y aumenta gradualmente en intensidad. De acuerdo a los ruidos de Korotkoff ¿Cuál es el ruido que se ausculta?

Respuestas:

- Primer ruido.

- Segundo ruido.
- Tercer ruido.
- Cuarto ruido.

¿Cuál es la secuencia de la aspiración de secreciones en pacientes con traqueostomía?

1. Verificar el funcionamiento del equipo y preparar al paciente.
2. Aspirar las secreciones según el protocolo y evaluar la oxigenación.
3. Explicar al paciente el procedimiento y mantener normas de bioseguridad.
4. Dejar al paciente limpio, cómodo, seguro y documentar los datos relevantes.
5. Hiperventilar al paciente si no tiene muchas secreciones.

6. Dejar los materiales listos y ordenados para la siguiente aspiración.

Respuestas:

- 3, 1, 5, 2, 6, 4

- 1, 3, 2, 5, 4, 6

- 1, 2, 3, 6, 4, 5

- 3, 4, 1, 2, 5, 6

De acuerdo con el MSP del Ecuador. ¿Cuál es el esquema que se debe aplicar a un niño de 24 meses que no ha recibido ninguna vacuna?

1. Difteria Tétano Tosferina.
2. Rotavirus.
3. Influenza Pediátrica.
4. Varicela.
5. Hepatitis pediátrica.
6. FIPV.
7. Pentavalente.

Respuestas:

- 1, 3, 5, 6.

- 1, 2, 4, 7

- 2, 3, 4, 5

- 2, 3, 6, 7

El parto culturalmente adecuado se lleva a cabo en algunas unidades de salud, en este tipo de parto, una de las posiciones en el periodo expulsivo es mantener las piernas hiper flexionadas y separadas para mejorar la amplitud de los diámetros transversos de la pelvis, y el familiar es el soporte de la gestante. ¿Cuál es el nombre de la posición descrita anteriormente?

Respuestas:

- **Cuclillas variedad anterior.**

- Sentada o semisentada.
- Cogida de la sogá.
- De manos y pies.

Se ha presentado un brote de gastroenteritis, en el análisis de los indicadores por lugar, tiempo y persona; los más afectados son los preescolares y la población entre los 25 a 39 años. La curva epidémica denota presencia de casos con frecuencia baja y con intermitencia de picos en la frecuencia de casos. ¿Cuál es el modo de transmisión que se ha dado según la curva epidémica?

Respuestas:

- **Fuente común continua.**

- Fuente común.
- Fuente común puntual.
- Propagadas.

Paciente de 70 años acude al servicio de emergencia por presentar dificultad respiratoria, ortopnea, mucosidad excesiva y tos con expectoración viscosa. ¿Cuál etiqueta diagnóstica el enfermero prioriza en este caso clínico?

Respuestas:

- **Limpieza ineficaz de las vías aéreas.**

- Perfusión tisular periférica ineficaz.
- Deterioro del intercambio de gases.
- Patrón respiratorio ineficaz.



Paciente femenina, de 37 años, refiere disminución progresiva de peso, aumento del apetito, diarrea, sudoración, amenorrea, intolerancia al calor, temblor fino en las manos. Al examen físico se observa paciente irritable, con piel caliente y húmeda, exoftalmos, FC:120 x min. ¿A qué patología corresponde el caso descrito ?

Respuestas:

- **Hipertiroidismo.**
- Hipotiroidismo.
- Diabetes mellitus.
- Síndrome de Cushing.

Un niño de 2 años 3 meses vive a 2800 metros sobre el nivel del mar, al realizar la prueba de hemoglobina tiene una concentración de 13 g/dl. ¿Cuál es la concentración real de hemoglobina, de acuerdo a los ajustes, en función de la altitud sobre el nivel del mar?

Respuestas:

- **11.7 g/dl**
- 12.5 g/dl
- 12.8 g/dl
- 11.1 g/dl

Ordene las secciones anatómicas de las trompas de Falopio desde la porción proximal a la distal:

1. Intersticial

2. Ampollar

3. Ístmica

4. Infundibular

Respuestas:

- **1, 3, 2, 4**
- 1, 2, 3, 4
- 3, 4, 1, 2
- 3, 1, 2, 4

En el centro de salud, el equipo de mejoramiento continuo de la calidad liderado por el personal de Enfermería, debe realizar cada mes la revisión de estándares de calidad en insumos de verificación existentes en la sala de preparación, según el componente normativo materno-neonatal. ¿Cuáles son los insumos indispensables para la preparación de la usuaria?

Respuestas:

- **Fonendoscopio, tensiómetro, tallímetro o cinta métrica, balanza de adulto, termómetros.**
- Corneta de Pinard, fonendoscopio, tensiómetro, tallímetro, balanza de adulto, termómetros.
- Estetoscopio, tensiómetro, tallímetro, balanza de adulto, termómetros, camilla ginecológica.
- Tensiómetro, tallímetro, balanza de adulto, termómetros, lámpara cuello de ganso.

El líder de enfermería del servicio en que usted labora, se destaca por su constante preocupación por el estado de salud de los pacientes del servicio, además se puede observar como está al pendiente del bienestar de todos los miembros del equipo de trabajo. ¿Qué valor esencial se pone de manifiesto en esta situación?

Respuestas:

- **Altruismo.**
- Autonomía.
- Justicia social.
- Integridad.

Paciente con diagnóstico de eclampsia recibe dosis de impregnación con sulfato de magnesio. Usted debe estar pendiente de una posible intoxicación durante la administración del fármaco prescrito. ¿Cuáles son las alteraciones que puede presentar la paciente?

Respuestas:

- **Disminución de frecuencia respiratoria, diuresis, bradicardia y paro cardiorrespiratorio.**
- Reacciones de calor, cefalea, náuseas, taquicardia y edemas en miembros inferiores.
- Presencia de cefalea, palpitaciones, taquicardia, anorexia, vómitos y angina de pecho.
- Presencia de mareo, latidos cardíacos irregulares, vómitos, sudoración y hormigueo.



Relacione los tipos de prácticas seguras y sus procedimientos, que debe aplicar en la unidad hospitalaria, con respecto a la seguridad del paciente.

Tipo de práctica segura	Procedimiento
1. Prácticas seguras administrativas. 2. Prácticas seguras asistenciales.	a. Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo. b. Mantenimiento preventivo correctivo de equipos biomédicos. c. Prevención de úlceras por presión. d. Identificación correcta del paciente.

Respuestas:

- **1bd, 2ac.**

- 1ab, 2cd.

- 1cd, 2ab.

- 1ad, 2bc.

De los siguientes enunciados. ¿Cuál corresponde al pensamiento crítico en Enfermería?

Respuestas:

- **Proceso de indagación continua y perseverancia combinada dirigido al logro de un objetivo que permite emitir juicios basados en evidencia.**

- Proceso permanente de crecimiento intelectual y emocional que implica aprender nuevos conocimientos, resolver problemas, hacer juicios.

- Modelo sistemático y ordenado de pasos para recoger datos y resolver problemas, utilizado por los profesionales del equipo sanitario.

- Implica evaluar la solución en un cierto plazo de tiempo para cerciorarse si es efectiva, realizando diversas opciones si se repite un problema.



¿Cuál es la manifestación que pueden presentar comúnmente los recién nacidos diagnosticados con Fenilcetonuria?

Respuestas:

- Alteraciones mentales.

- Alteraciones del crecimiento.
- Alteraciones en su desarrollo.
- Alteraciones en su lenguaje.

Seleccione las modalidades de atención de los equipos integrales de salud según lo establecido por el MAIS-FCI:

- 1. Atención prehospitalaria.**
- 2. Atención individual.**
- 3. Atención extramural o comunitaria.**
- 4. Atención en un establecimiento de salud.**
- 5. Atención en establecimientos móviles de salud.**
- 6. Atención al ambiente.**

Respuestas:

- 1, 3, 4, 5**
- 1, 2, 3, 4
- 2, 3, 4, 6
- 3, 4, 5, 6

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Paciente femenina de 40 años que padece de Diabetes Mellitus tipo II, al recibirla en el servicio de Emergencia, se encuentra con una presión arterial de 90/50 mmHg, pulso de 55 lpm, respiración de 18 rpm y temperatura de 36 °C, la concentración de glicemia es de 215 mg/dL. Al analizar los resultados de electrolitos, usted identifica que el sodio se encuentra en 129 mEq/L; además, la paciente se muestra confundida, débil y con la boca seca. Considerando los factores contribuyentes y las manifestaciones clínicas. ¿Cuál de los siguientes trastornos del equilibrio electrolítico considera que presenta la paciente?

Respuestas:

- **Hiponatremia.**

- Hipernatremia.
- Hipopotasemia.
- Hiperpotasemia.

Paciente ingresa al hospital por presentar hormigueo en dedos de las manos, pies y región peribucal; el médico solicita exámenes de laboratorio donde se evidencian los siguientes datos: Sodio 140mEq/L; Calcio 6,0mg/dl, Potasio 4,5mEq/L; Magnesio 2,0 mg/ dl, Fósforo 4,0mg/d ¿Cuál es el electrolito que se encuentra alterado en este caso?

Respuestas:

- **Calcio**

- Sodio
- Potasio
- Magnesio

Usted como líder de Enfermería del servicio de consulta externa, debe efectuar el cálculo de personal de Enfermería para la atención directa a pacientes de este servicio. Teniendo presente que la categoría de tratamiento es de cuidados mínimos. ¿Cuáles son las horas necesarias de atención de enfermería directa en 24 horas de acuerdo a los indicadores por categoría de tratamiento?

Respuestas:

- **1 a 2 horas.**

- 5 a 6 horas.
- 3 a 4 horas.
- 7 a 8 horas.

Paciente acude al hospital por presentar irritabilidad muscular, anorexia, vómitos y aumento de reflejos tendinosos, según electrocardiograma se evidencia alteraciones y en los datos de laboratorio se determina magnesio sérico $< 1.8 \text{ mg/dL}$, la prescripción médica indica administrar 2 gr de sulfato de magnesio. ¿En qué presentación del fármaco se debe administrar lo prescrito?

Respuestas:

- **20% en 10ml**
- 8.4% en 10ml
- 10% en 10ml
- 2% en 10ml

Seleccione las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo:

1. **Fatiga extrema.**
2. **Nerviosismo e irritabilidad.**
3. **Pérdida de cabello.**
4. **Intolerancia al calor.**
5. **Estreñimiento.**
6. **Taquicardia.**

Respuestas:

- **1, 3, 5**
- 2, 3, 4
- 2, 4, 6
- 1, 5, 6

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

¿A qué fase de las enfermedades crónicas corresponde a la siguiente descripción?

“Ocurre la aparición de síntomas detectables relacionados con el trastorno crónico; incluye el período de estudio diagnóstico y la corroboración del diagnóstico; puede acompañarse de falta de certeza conforme el paciente espera y empieza a descubrir su enfermedad y afrontar las implicaciones.”

Respuestas:

- **Sintomática.**
- Asintomática.
- Estable.
- Inestable.

En una comunidad rural, fallecen al año, 10 de cada 1000 habitantes. El profesional en Enfermería de la unidad de salud ingresa estos datos en los indicadores de salud correspondiente al área. De las siguientes opciones determine. ¿Cuál indicador refleja el dato ingresado?

Respuestas:

- **Tasa.**
- Razón.
- Proporción.
- Porcentaje.

El recién nacido cuando tiene signos y síntomas de dificultad respiratoria, la enfermera/o, valora el funcionamiento del sistema respiratorio a través de la aplicación del Test de Silverman. Identifique que parámetros valora este test:

Respuestas:

- **Aleteo nasal, quejido espiratorio, movimientos toraco-abdominal, tiraje intercostal y retracción xifoidea.**
- Coloración de la piel, respiración diafragmática, aleteo nasal, quejido espiratorio, tono muscular y tiraje intercostal.
- Respiración torácica, disnea, respuesta motora, tiraje intercostal, retracción xifoidea, y aleteo nasal.
- Respiración abdominal, tono muscular, movimientos toraco-abdominal y tiraje intercostal.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

El recién nacido en el momento del nacimiento puede sufrir complicaciones en la función neurológica por un parto prolongado. Una de las complicaciones son las convulsiones, caracterizado como un movimiento involuntario, brusco y rápido que se expresa como una sacudida súbita de un miembro superior. ¿Cuál es el tipo de convulsión al que se refiere?

Respuestas:

- **Mioclónicas.**

- Clónica.
- Sutil.
- Tónica.

Un usuario diagnosticado de Tb pulmonar con Bk+, refiere haber recibido tratamiento 15 días, hace 10 meses. ¿Cómo se considera el caso?

Respuestas:

- **Nuevo.**

- Recaída.
- Pérdida en el seguimiento.
- Fracaso.

El refuerzo de los buenos hábitos dietéticos, encaminado a evitar las temperaturas elevadas de los alimentos, el consumo de café, alcohol, elevar la ingesta de leche, así como la adherencia del tratamiento médico consistente en antiácidos y antagonista de los receptores H2, son orientaciones que el profesional en enfermería debe proporcionarle al paciente con:

Respuestas:

- **Úlcera péptica.**

- Síndrome de intestino irritable.
- Estreñimiento.
- Enfermedad de mala absorción.



¿En qué etapa del proceso de Enfermería: organiza, analiza, sintetiza y resume los datos recogidos?

Respuestas:

- Valoración.

- Diagnóstico.
- Planeación.
- Evaluación.

La OMS, plantea varios objetivos esenciales para la cirugía segura y evitar eventos adversos en los pacientes. Seleccione los objetivos de la cirugía segura para minimizar los efectos adversos quirúrgicos:

1. Operar el paciente correcto.
2. Comunicar efectivamente.
3. Preparar al paciente.
4. Inducción anestésica.
5. Minimizar el riesgo de infección.
6. Recuperación post anestésica.
7. Impedir la retención de compresas.

Respuestas:

- 1, 2, 5, 7**
- 3, 5, 6, 7
- 1, 4, 5, 6
- 2, 3, 4, 6

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Niño de 2 meses de edad que llega con su madre al centro de salud. La madre refiere que hace 6 horas, el niño vomita todo lo que come y hace 4 horas no toma el seno. La madre informa haber observado movimientos anormales en todo el cuerpo del niño con una duración de menos de un minuto; Ud observa al niño, el niño no responde esta inconsciente. Ordene. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en este caso según el AIEPI clínico 2017?

1. Referir urgentemente al hospital aplicando medidas de estabilización.
2. Completar de inmediato la evaluación y examen físico y administrar medicamentos indicados antes de referir.
3. Si esta convulsionando administrar diazepam intrarectal.

Respuestas:

- 2, 3, 1.
- 1, 3, 2.
- 3, 2, 1.
- 3, 1, 2.

Recién nacido pretérmino de 36SG, sexo masculino, pequeño para la edad gestacional, obtenido mediante parto eutócico, APGAR 8 al minuto, rosado, llanto fuerte. Se lo mantiene en observación con control térmico y luego de 5 horas de vida presenta temblores finos en miembros inferiores, acompañado de taquipnea, uno de los antecedentes maternos, es diabetes gestacional. ¿Qué patología metabólica se relaciona este caso clínico?

Respuestas:

- **Hipoglicemia.**
- Hiperglicemia.
- Hipocalcemia.
- Hipotiroidismo congénito.



Al recibir el turno identifica un paciente poco colaborador con el equipo de salud, el personal no logra establecer una relación empática lo que dificulta proporcionarle una atención adecuada para su recuperación. ¿Cuál es la teorizante que usted aplicaría para este caso?

Respuestas:

- **Hildegard Peplau.**

- Betty Neuman.
- Callista Roy.
- Jean Watson.

Seleccione los conceptos que usted debe aplicar para fomentar el pensamiento crítico en su práctica diaria:

1. Dirección.
2. Sistemática.
3. Búsqueda de la verdad.
4. Organización.
5. Capacidad de análisis.
6. Autoconfianza.
7. Negociación.
8. Control.

Respuestas:

- **2, 3, 5, 6**

- 1, 3, 6, 8
- 2, 4, 6, 7
- 1, 2, 4, 7

Un paciente con tratamiento con Morfina presenta depresión respiratoria. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se utiliza para revertirla?

Respuestas:

- **Naloxona.**

- Fentanilo.
- Bromuro de Rocuronio.
- Propofol.



Según el cuestionario de APGAR familiar y de acuerdo con la Guía de Supervisión: la Salud de adolescentes MSP. ¿Qué punto de corte debe tener una familia para ser catalogada como disfuncional grave?

Respuestas:

- 3
- 4
- 5
- 6

En el centro de salud se ha identificado un incremento de problemas de salud prevenibles. Como profesional de Enfermería va a realizar un programa educativo para la promoción de la salud, utilizando la técnica que, desde la acción-reflexión-acción, analiza una problemática de salud que afecta a la comunidad, para la construcción colectiva de conocimientos que combinan teoría y práctica y dan lugar a aprendizajes significativos. ¿Cuál es la técnica de aprendizaje cooperativo descrita?

Respuestas:

- **Talleres.**
- Murgas por la salud.
- Casa abierta.
- Ferias de la salud.



Seleccione las funciones principales de una comunidad:

1. Proveedores del cuidado

2. Control social

3. Socialización

4. Responsabilidad individual

5. Inter participación social

6. Apoyo mutuo

Respuestas:

- **2, 3, 5, 6**
- 1, 2, 4, 5
- 2, 4, 5, 6
- 3, 4, 5, 6

Paciente acude al centro de salud para solicitar asesoramiento sobre lactancia materna, indica que por motivos de trabajo debe dejar a su hijo de tres meses al cuidado de un familiar y desea mantener la leche materna en el refrigerador. ¿Cuál es la temperatura y tiempo de conservación conveniente?

Respuestas:

- **$\leq 5^{\circ}\text{C}$ tres días.**
- $\leq 26^{\circ}\text{C}$ tres horas.
- -15°C dos semanas.
- -18°C tres meses.

El personal de salud debe identificar el modo de transmisión de enfermedades infecto contagiosas y los tipos de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión. ¿Qué patología es transmitida por gotas?

Respuestas:

- **Neumonía.**
- Tuberculosis.
- Rubeola.
- Sarampión.

Seleccione la modalidad de atención del componente Provisión de Servicios del MAIS-FCI que presta un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes:

Respuestas:

- **Atención Prehospitalaria.**
- Atención Individual.
- Atención al ambiente.
- Atención Comunitaria.

Identifique los elementos que corresponden a la adecuación cultural del parto.

Respuestas:

- **El trato interpersonal hacia la usuaria y sus familiares.**
- El acompañamiento en el momento del parto se le debe realizar cuando se considere necesario.
- La posición del parto debe ser ginecológica.
- Abrigo / vestimenta es inapropiado en el parto.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



La cetoacidosis diabética es un efecto de un déficit de insulina disponible en el organismo, que produce trastornos del metabolismo de carbohidratos proteínas y lípidos. Seleccione las principales manifestaciones clínicas de esta entidad:

1. Hiperglicemia

2. Pérdida de peso

3. Poliuria

4. Polidipsia

5. Deshidratación con pérdida de electrolitos

6. Polifagia

7. Acidosis

Respuestas:

- 1, 5, 7

- 1, 6, 7

- 1, 4, 6

- 2, 6, 7

Paciente con diagnóstico de Shock Hipovolémico, en las intervenciones de enfermería debe monitorizar su estado hemodinámico para obtener una perfusión tisular adecuada; durante los cuidados se determina con prioridad establecer el gasto cardíaco. ¿Cómo se calcula este parámetro hemodinámico?

Respuestas:

- **Volumen Sistólico por la frecuencia cardíaca.**

- Presión sistólica menos la presión diastólica.

- Dos presiones diastólicas más una sistólica dividida por tres.

- Presión arterial media menos la presión intracraneal.

Durante la guerra civil (1861-1865), hubo la participación de una notable líder enfermera, quien se preocupó de las relaciones entre culturas y razas, dio luz a una conciencia de la diversidad cultural y respeto por la persona, sin tener en cuenta su procedencia, raza, color o religión. ¿A cuál de las siguientes enfermeras se le atribuye este enunciado?

Respuestas:

- **Mary Mahoney.**

- Isabel Hampton.
- Dorothea Dix.
- Harriet Tubman.

Seleccione los cuidados de Enfermería que se relacionan con la diabetes gestacional:

1. Control de glicemia.
2. Dieta hipoproteica.
3. Control de cetonuria.
4. Administración de insulina.
5. Control de tensión arterial.
6. Control de test de Sullivan.
7. Administrar multivitamínicos orales.

Respuestas:

- **1, 3, 4, 5**

- 2, 5, 6, 7

- 1, 2, 5, 7

- 2, 3, 6, 7

En el centro de salud tipo B, que se encuentra trabajando gestiona el programa de inmunizaciones, al aplicar las vacunas a la población en general, está garantizando una atención integral durante todo el ciclo vital. ¿Qué componente del MAIS-FCI está aplicando?

Respuestas:

- **Componente de Provisión de Servicios.**

- Componente de Organización.
- Componente de Gestión.
- Componente de Financiamiento.



Luego de administrar un medicamento, el profesional de enfermería debe evaluar el efecto esperado del medicamento en el paciente. ¿A qué correcto, en la administración de medicamentos corresponde esta acción?

Respuestas:

- Respuesta correcta.

- Forma correcta.
- Registro correcto.
- Acción correcta.

Seleccione las recomendaciones para la transfusión de componentes en hemorragia masiva:

- 1. Transfundir concentrado de glóbulos rojos cuando se estime una pérdida de la volemia que supere el 30%**
- 2. Utilizar equipos de presión externa con accesos venosos de pequeño diámetro.**
- 3. Prevenir hipotermia.**
- 4. Completar la transfusión sanguínea en un tiempo máximo de ocho horas desde su colocación.**
- 5. Administrar cristaloides como primera línea de tratamiento para corregir el déficit de volumen.**
- 6. Tomar y registrar los signos vitales del paciente luego de treinta minutos del inicio de la transfusión.**

Respuestas:

- 1, 3, 5

- 1, 4, 6
- 2, 4, 5
- 2, 3, 6

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



En la Unidad de Cuidados Intensivos se encuentra un paciente, que a la valoración de enfermería se observa respiraciones alternantes profundas y rápidas seguidas por periodos de apnea. ¿Cuál de los patrones de respiración corresponde con la descripción?

Respuestas:

- **Respiración de Cheyne-Stokes.**

- Respiración de Biot.
- Respiración de Kussmaul.
- Respiración Atáxica.

El determinante de la salud en donde hay una interacción entre elementos naturales y sociales que contribuyen a la generación de condiciones de protección o riesgo para la salud se refiere a:

Respuestas:

- **Ambientales.**

- Sistema sanitario.
- Sociales.
- Biológicos.

Adulto joven con diagnóstico de trauma cráneo encefálico grave de 48 horas de evolución, causado por un accidente automovilístico. Al momento se encuentra inconsciente, no responde a estímulos dolorosos, sin respuesta verbal y ocular nula; además, pupilas no reactivas a la luz. Durante la valoración del paciente, el enfermero de turno identifica una respiración de Cheyne-Stokes. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde al patrón respiratorio mencionado?

Respuestas:

- **Ciclos respiratorios intercalados por cortos períodos de apnea.**

- Periodos de cuatro-cinco respiraciones de idéntica profundidad.
- Respiración superficial con frecuencias altas y volúmenes bajos.
- Respiración con una frecuencia y una profundidad aumentada.



Paciente que acude al servicio de emergencia con cuadro de debilidad muscular y arritmia cardíaca, en el electrocardiograma presenta ondas T altas y picudas, ensanchamiento del QRS. Teniendo en cuenta el cuadro descrito y los resultados de laboratorio: Na 138 mEq/l, K 6.0 mEq/l, Ca 9.0 mEq/l, Mg 2.0 mEq/l. ¿Qué trastorno electrolítico presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hiperpotasemia.**

- Hipernatremia.
- Hipomagnesemia.
- Hipocalcemia.

En la valoración del desarrollo psicomotor mediante el test de Denver se observa que el crecimiento del niño es algo lento y se mantiene el lenguaje desarrollado, el desarrollo motor, sensorial y psicosocial; además, se educa a la madre sobre prevención de accidentes. ¿En qué etapa de la vida se encuentra el niño?

Respuestas:

- **Primera infancia.**

- Segunda infancia.
- Período de lactancia.
- Tercera infancia.

Usuario de 53 años, durante la anamnesis manifiesta sentir dolor persistente, sensación de quemadura a nivel de la boca del estómago; refiere vómito y que las heces son oscuras. ¿A qué patología corresponden estas manifestaciones clínicas?

Respuestas:

- **Úlcera gástrica.**

- Gastritis aguda.
- Pancreatitis aguda.
- Cirrosis hepática.



¿Cuáles son las Modalidades de Atención del Modelo Integral de Salud?

Respuestas:

- Atención extramural, atención intramural, atención en unidades móviles y atención pre hospitalaria.

- Promoción, prevención, curación, rehabilitación, cuidados paliativos e integración social.
- Atención individual, atención familiar, atención a la comunidad y atención al ambiente o entorno natural.
- Aparentemente sano, con riesgo, con patología, con deficiencia y discapacidad o secuela.

El trabajo de parto, es un proceso mediante el cual, el personal de salud debe tener en consideración aspectos a valorar, la monitorización materno fetal es una de ellas, la monitorización fetal electrónica es un proceso que se realizará en casos específicos. ¿Cuál de las siguientes situaciones se debería realizar?

- Presencia de líquido amniótico teñido de meconio.
- Madre con diabetes gestacional.
- Alteración del latido cardíaco fetal por auscultación.
- Fiebre materna.
- Madre adolescente.
- Uso de oxitocina.

Respuestas:

- a, c, d, f.

- a, c, d, e.
- b, d, e, f.
- b, c, d, f.

Paciente de 28 años internada en el servicio emergencia después de golpear la cabeza con el parabrisas tras chocar su auto con un poste de la luz. ¿Qué tipo de lesión encefálica recibió la paciente?

Respuestas:

- Lesión de desaceleración.

- Lesión Rotacional.
- Lesión de contragolpe.
- Lesión de aceleración.

Cuando usted valora al paciente NN de 50 años y le pregunta sobre la limitación del movimiento independiente para cambiar de postura en la cama. ¿Según los datos subjetivos a que Dominio corresponde?

Respuestas:

- Dominio Actividad/Reposo.

- Dominio Principios vitales.
- Dominio Seguridad/protección.
- Dominio Confort.

¿A qué nivel de atención corresponde un centro clínico quirúrgico ambulatorio?

Respuestas:

- II Nivel.

- I Nivel.
- III Nivel.
- IV Nivel.

Paciente que ingresa en el Servicio de Urgencias en contra de su voluntad, presenta los siguientes síntomas: Náuseas, vómitos, disnea, hipertensión arterial y edemas. Además, se encuentra obnubilado, con diagnóstico de síndrome de Alport hace cinco años, presenta un claro déficit de autocuidado de naturaleza alta. Se adopta un sistema compensatorio total. El objetivo prioritario es salvar la vida del paciente y estabilizar las funciones vitales. Presenta dificultad para tomar decisiones y llevar a cabo acciones de auto cuidado. No hace uso de los recursos sanitarios adecuadamente, déficit a nivel de juzgar/actuar, no se posiciona en necesidad de ayuda, negación de su estado actual, patrón de eliminación inadecuado, déficit de conocimiento sobre la ingesta apropiada y gran desvío de su estado de salud: no diferencia salud ideal/salud real. ¿Cuál de las teorizantes se pone de manifiesto en el caso anterior?

Respuestas:

- Dorothea Orem.

- Virginia Henderson.
- Hildegard E. Peplau.
- Imogene M. King.



Paciente que acude al centro de salud para que le administren medicamentos prescritos por el médico. Antes de administrar la medicación, el profesional en Enfermería le pregunta ¿Cómo se siente?, ¿Tiene algún dolor?, ¿Tiene algún otro síntoma?. ¿Qué área de valoración orientan estas preguntas en la anamnesis?

Respuestas:

- Problema principal.

- Antecedentes patológicos personales.
- Antecedentes familiares.
- Manejo de la salud.

Paciente ingresa al servicio de emergencia por presentar crisis de asma. A la valoración de Enfermería se observa confusión, aleteo nasal, disnea, en la gasometría se obtienen: pH 7.35, PCO₂>50mmHg y además un desequilibrio en la ventilación-perfusión. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería principal para este caso?

Respuestas:

- Deterioro del intercambio de gases.

- Riesgo de confusión aguda.
- Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.
- Deterioro de la ventilación espontánea.

A las mujeres que se realizan una cesárea bajo anestesia regional, requieren de una sonda vesical. ¿Cuál de las siguientes razones fundamenta esta intervención de enfermería?

Respuestas:

- Evitar el exceso de distensión de la vejiga.

- Medir diuresis cada una hora.
- Facilitar la toma de muestra para cultivo de orina.
- Favorecer la contractilidad uterina.

En el área de preparación del centro médico, la enfermera realiza la valoración nutricional de un usuario de 35 años, que mide 1.70m y pesa 70 Kg. ¿Cuál es el índice de masa corporal (IMC) de este usuario?

Respuestas:

- 24.
- 26.
- 28.
- 30.

En relación al uso de MgSO₄ en el manejo de las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, entre los cuidados de enfermería destacan:

Respuestas:

- **Valoración de los niveles séricos de magnesio, neurológica y diuresis.**
- Valoración de los niveles séricos de magnesio, reflejo patelar y esquistocitosis.
- Valoración de las pruebas de laboratorio, DHL, presión arterial y niveles séricos de magnesio.
- Valoración de los niveles séricos de magnesio, AST, ALT, y microalbuminuria.

Paciente primigesta de 20 años, cursa un embarazo de 39 semanas, ingresa al hospital acompañada del familiar, quien refiere que hace 6 horas antes de su ingreso, presentó: dolor abdominal tipo contracción uterina, lentas y constantes; eliminación de moco cervical teñido de sangre; está ansiosa. Es valorada por un médico de turno, reporta: dilatación de 2 centímetros, borramiento de 40%, membranas integra, eliminación de moco cervical sanguinolento en moderada cantidad, frecuencia cardíaca fetal 160 latidos por minutos, pulso 96 por minuto, presión arterial 120/70, temperatura de 36.5 grados centígrados, respiración 20 por minuto. Se le envía a casa con indicaciones. ¿En qué momento de su periodo de maternidad se encuentra la paciente?

Respuestas:

- **Primera etapa del trabajo de parto, fase latente de la labor de parto.**
- Primera etapa del trabajo de parto, fase activa de la labor de parto.
- Segunda etapa de trabajo de parto (periodo expulsivo).
- Tercera etapa de trabajo de parto o alumbramiento.



Como profesional de Enfermería en el área de Urgencias, atiende a un paciente con problemas respiratorios, la prescripción médica indica administrar oxígeno por cánula nasal 4 litros por minuto. ¿Qué concentración de FIO₂ está administrando con el volumen y dispositivo del caso?

Respuestas:

- **36%**
- 32%
- 40%
- 24%

La ficha familiar como instrumento esencial del MAIS-FCI, tiene dos objetivos fundamentales. Seleccione la opción que corresponde a uno de estos objetivos:

Respuestas:

- **Medir las condiciones de vida.**
- Elaborar el mapa de riesgo.
- Conocer el perfil epidemiológico.
- Clasificar las familias según el riesgo.

En el plan de egreso que entrega el profesional de enfermería a la puérpera, explica sobre la importancia que tiene el mantener al recién nacido con un gorrito en la cabeza para evitar la pérdida de calor. ¿Qué mecanismo de termorregulación está indicando para prevenir el enfriamiento?

Respuestas:

- **Evaporación.**
- Radiación.
- Conducción.
- Convección.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Paciente de 35 años ingresa al área de emergencia manifestando dolor intenso en hemitórax derecho acompañado de disnea por esfuerzo, la cual progresa hasta convertirse en una disnea tipo trepopnea. ¿En qué posición se dificulta la respiración del sujeto de cuidado?

Respuestas:

- Decúbito lateral.

- Bipedestación.
- Decúbito ventral.
- Decúbito dorsal.

Con relación a la Hepatitis A. Señale el enunciado correcto:

Respuestas:

- El modo de transmisión es a través de la vía fecal oral.

- Las manifestaciones clínicas son: fiebre, diarrea, cefalea, dolor abdominal tipo cólico, escalofrío, náusea y en ocasiones vómito.
- El período de incubación suele ser de 6 semanas a 6 meses, con un promedio entre 60 y 90 días.
- El modo de transmisión es a través de la transfusión sanguínea.

Un paciente que recibe metotrexato para el tratamiento de cáncer digestivo presenta un recuento de plaquetas de 745.000/mm³. De las siguientes acciones de enfermería ¿Cuál se debe evitar?

Respuestas:

- Administrar enemas, supositorios o laxantes.

- Transfusión de plaquetas según prescripción.
- Indicar al paciente que el cepillado de dientes sea con un cepillo de cerdas suaves.
- Indicar al paciente que se suene la nariz sin hacer demasiada fuerza.



De las siguientes opciones, seleccione los efectos fisiológicos que tiene la aplicación de frío:

1. Reducción de la permeabilidad capilar.
2. Efecto sedante.
3. Efecto anestésico local.
4. Vasoconstricción.
5. Vasodilatación.
6. Aumento de la permeabilidad capilar.

Respuestas:

- 1, 3, 4

- 1, 5, 6

- 2, 3, 5

- 2, 4, 6

Paciente de 85 años es llevada al hospital por su hija, quien refiere que desde hace 4 días su mamá se encuentra débil y decaída con poco apetito y muy poca ingesta de líquidos. En la urgencia es valorada por un médico, quien verifica la presencia de mucosas orales secas, sin dificultad respiratoria, por lo que solicita exámenes de laboratorio. Los resultados de la gasometría arterial son: Na 142 meq/L, K 2.9 meq/l, Cl 88 meq/l, Ph 7.50; PaCO₂ 24 mmHg; HCO₃ 34 meq/l. Interprete los datos de laboratorio e identifique. ¿Qué alteraciones del equilibrio ácido básico y electrolítico tiene la paciente?

Respuestas:

- **Alcalosis metabólica mixta, hipopotasemia e hipocloremia.**

- Acidosis metabólica, hiponatremia, hipopotasemia.

- Alcalosis respiratoria, hiperpotasemia, hipocloremia.

- Acidosis respiratoria, hipernatremia, hipocloremia.

En la unidad neonatal se encuentra hospitalizado un Recién Nacido de 48 horas de nacido con antecedentes de Rotura Prematura de membranas. Presenta dificultades con la regulación de la temperatura corporal la cual se expresa en fiebre/hipotermia, se muestra hipoactivo y presenta una frecuencia cardiaca de 180 lpm. Atendiendo a la sospecha de una sepsis neonatal se decide realizar exámenes complementarios. ¿Cuál de los siguientes exámenes se considera el estándar de oro para la detección temprana de la sepsis?

Respuestas:

- **Hemocultivo.**

- Proteína C reactiva.
- Procalcitonina (PCT).
- Urocultivo.

Un niño de 2 años vive a 1 200 metros sobre el nivel del mar, al realizar la prueba de hemoglobina tiene una concentración de 12 g/dl. ¿Cuál es la concentración real de hemoglobina, de acuerdo a los ajustes, en función de la altitud sobre el nivel del mar?

Respuestas:

- **11.8 g/dl**

- 11.5 g/dl
- 11.2 g/dl
- 10.7 g/dl

De los siguientes enunciados, señale en qué situación se utiliza el monitoreo electrónico fetal:

Respuestas:

- **Presencia de líquido amniótico teñido de meconio.**

- Contracciones rítmicas, regulares e intensas.
- Presencia en fase activa prolongada.
- Período expulsivo.



Señale el campo de acción que tienen los Equipos de Atención Integral de Salud (E.A. I.S).

Respuestas:

- **Nivel familiar y comunitario.**

- Nivel de complejidad del paciente.
- Nivel de atención de Salud.
- Nivel de organización de los escenarios de atención.

En el hospital que labora va a realizar una investigación de campo para evaluar los cuidados de enfermería que reciben los pacientes que presentan úlceras de presión y realizar un plan de mejora. ¿Cuál de los siguientes instrumentos es el más útil para su investigación?

Respuestas:

- **Entrevista.**

- Diario.
- Mapeo.
- Registros.

La fase lútea del ciclo menstrual inicia después de la ovulación. ¿Cuál de los cambios que se mencionan ocurre en esta fase?

Respuestas:

- **El endometrio, grueso y congestionado, se vuelve hemorrágico.**

- El endometrio alcanza la vascularización y el espesor máximos.
- Aumenta la producción de la hormona luteinizante (LH).
- Aumenta la producción de hormona estimulante del folículo (FSH).

Cuál de las siguientes opciones corresponde con las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética:

Respuestas:

- **Hiperglucemia - deshidratación - acidosis metabólica.**

- Hipoglucemia - deshidratación - acidosis metabólica
- Normoglucemia - sobrehidratación - alcalosis metabólica.
- Hipoglucemia - deshidratación - alcalosis metabólica.

Como profesional de Enfermería de un servicio hospitalario, al valorar la función respiratoria de un paciente de 50 años, se observa que la respiración es anormalmente profunda, regular y con frecuencia aumentada. En su informe. ¿Cómo reporta esta alteración del patrón respiratorio?

Respuestas:

- **Respiración de Kussmaul.**

- Respiración de Biot.
- Hipoventilación.
- Respiración de Cheyne-Stokes.

De acuerdo con el Manual de Seguridad del Paciente - usuario del MSP, las prácticas seguras se clasifican en:

Respuestas:

- **Prácticas seguras administrativas, asistenciales y administrativas-asistenciales.**

- Prácticas seguras en medicamentos de riesgo, abreviaturas y prevención de caídas.
- Prácticas seguras en la notificación, higiene de manos y seguridad del paciente.
- Prácticas quirúrgicas, conciliación de medicamentos y manejo de bombas de infusión.

En el servicio de emergencias, usted atiende a un paciente con antecedentes de Insuficiencia Cardíaca que recibe tratamiento con Digoxina y que presenta cuadro de náuseas, vómitos, malestar general, cambios electrocardiográficos y niveles séricos superiores a los niveles terapéuticos. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos del medicamento corresponde a este caso?

Respuestas:

- **Reacción tóxica.**

- Efecto colateral.
- Reacción alérgica.
- Idiosincrasia.

Paciente de 35 años con antecedentes de hipertensión arterial, presenta un embarazo de 20 semanas de gestación, acude al control prenatal y monitoreo de la tensión arterial porque en los últimos meses ha presentado cifras altas de presión. ¿Cuáles son las recomendaciones durante la toma de este procedimiento?

Respuestas:

- Paciente sentada, tensiómetro aerobio con manguito que cubra 1.5 veces de la circunferencia del brazo.

- Paciente sentada, tensiómetro digital con manguito grande y apropiado que cubra la circunferencia del brazo.

- Paciente sentada, con el brazo por debajo del nivel del corazón, tensiómetro digital con manguito que cubra el brazo.

- Paciente acostada, tensiómetro aerobio con manguito que cubra 2.5 veces de la circunferencia del brazo.

Al experimentar con dos antipsicóticos nuevos en pacientes diagnosticados de esquizofrenia, con la finalidad de identificar el es más eficaz y seguro, se trabaja con tres grupos de individuos de instituciones diferentes. Los individuos del primer grupo experimental (antipsicóticos 1), se encuentran internados en un hospital psiquiátrico; los del segundo grupo experimental (antipsicóticos 2), son tratados en otro hospital; y, los del grupo de control son pacientes de una tercera institución. ¿Qué tipo de estudio se está utilizando para este caso?

Respuestas:

- Estudios cuasiexperimentales.

- Estudios experimentales de laboratorio.

- Estudios experimentales de campo.

- Estudios pre experimentales.




Identifique los pasos para la investigación por brotes:

1. Organizar el trabajo de campo.
2. Investigar la enfermedad prioritaria.
3. Confirmar la ocurrencia del caso.
4. Realizar un ensayo comunitario.
5. Realizar la búsqueda activa del caso.
6. Evaluar medidas de control.

Respuestas:

- 1, 3, 5, 6
- 1, 2, 4, 5
- 2, 3, 4, 6
- 3, 4, 5, 6



Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Seleccione las percepciones de riesgo del sector prioritario que corresponde a la promoción de derechos, prevención de ITS/VIH SIDA y desarrollo de habilidades para el sexo seguro en personas que ejercen el trabajo sexual:

1. Diagnósticos de vulnerabilidad.

2. Procesos de educación para cambio de actitudes y comportamientos que reduzcan el riesgo.

3. Promoción del marco legal y derechos de las personas Trans con la población en general.

4. Acceso y control de condones masculinos y femeninos.

5. Reducción del riesgo en usuarios de drogas intravenosas.

6. Capacitación a dueños de lugares de trabajo sexual.

Respuestas:

- 1, 2, 4, 6

- 1, 3, 4, 5

- 2, 4, 5, 6

- 3, 4, 5, 6



¿Cuáles son los medios de diagnóstico específicos, para detectar problemas cardiacos en adultos mayores?

1. Prueba de esfuerzo.
2. Broncoscopia.
3. Estudio electrofisiológico.
4. Monitor Holter.
5. Toracocentesis.
6. Gammagrafía.

Respuestas:

- **1, 3, 4, 6**
- 2, 4, 5, 6
- 1, 2, 3, 4
- 1, 3, 4, 5

Paciente con antecedentes de diabetes, acude al hospital por presentar niveles de glicemia elevados, además indica vómito y dolor abdominal; durante el examen físico se identifica hipotensión, bradicardia, respiraciones profundas, regulares y aumentadas. ¿Cuál es la alteración del patrón respiratorio que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Respiración de Kussmaul.**
- Respiración de Biot.
- Respiración de Cheyne-Stokes.
- Respiración atáxica.



Paciente masculino de 57 años, acude a control subsecuente de salud después de 6 meses por presentar diagnóstico de Hipertensión arterial crónica. Registra antecedentes de fumador crónico desde hace 10 años: 20 cigarrillos diarios. No cumple el tratamiento según indicaciones establecidas. Se proporciona información sobre los riesgos y complicaciones que se pueden presentar en su salud si no deja el hábito de fumar, pero se niega a dejar el consumo de tabaco. El paciente no está interesado en información sobre la conducta. ¿En qué etapa del cambio de conducta de salud está el paciente?

Respuestas:

- **Precontemplación.**

- Contemplación.
- Preparación.
- Acción.

Paciente hipertensa ingresa a emergencia para recibir tratamiento intravenoso, a la valoración de enfermería identifica la presencia de coágulos de sangre dentro de la vía como resultado del enroscamiento del equipo de venoclisis. ¿Cuál es el cuidado oportuno que se aplica para este caso?

Respuestas:

- **Suspender la solución y colocar en otro sitio el catéter.**

- Irrigar u ordeñar para mejorar la permeabilidad del catéter.
- Aumentar la velocidad de infusión y limpiar el área del catéter.
- Aspirar el coágulo del equipo y purgar el equipo de venoclisis.

¿Qué vacunas deben recibir los lactantes de 12 a 23 meses con esquema de vacunación completo?

Respuestas:

- **DPT, bOPV, SRP, FA, Varicela, Triv. Pediátrica.**

- DPT, SRP, Rubéola, FA, Triv. Pediátrica, BCG.
- SR, FA, Varicela, Influenza Estacional, Triv. Pediátrica, DPT, bOPV.
- Neumococo conjugado, bOPV, SRP, FA, Varicela, Triv. Pediátrica.

¿Cuál debe ser la ganancia de peso de una gestante con un IMC entre 20 – 24.9 kg /m²?

Respuestas:

- **10 kg a 13 kg.**
- 12 kg a 18 kg.
- 7 kg a 10 kg.
- 6 kg a 7 kg.

Paciente de 60 años sin antecedentes personales, acude a la consulta por presentar palpitaciones, mareos y desmayos de origen desconocido, para el manejo del paciente es necesario realizar un procedimiento que permita evaluar la actividad eléctrica del corazón durante las actividades de la vida diaria. ¿Cuál es la prueba diagnóstica que le permite evaluar esta alteración?

Respuestas:

- **Monitor Holter.**
- Electrocardiograma.
- Estudio electrofisiológico.
- Cateterismo cardíaco.

Ingresa al servicio de quemados un paciente con lesiones térmicas producida por el derrame de líquido caliente. Al examen físico se observa al paciente consciente, signos vitales en parámetros normales se identifica una quemadura de tercer grado en abdomen y miembro inferior derecho con una superficie corporal quemada del 27%. ¿Cuál es la intervención de enfermería principal en este caso?

Respuestas:

- **Administrar líquidos para la reanimación y control de gasto urinario.**
- Establecer una vía aérea y la ventilación del paciente.
- Valorar el nivel de conciencia y control de signos de alarma.
- Controlar la gasometría arterial y monitorización cardíaca.

Al realizar la valoración de enfermería a un paciente con fracturas costales tras sufrir un accidente de tránsito presenta: disnea, deformidad en la pared torácica, uso de los músculos accesorios para respirar, falta de aliento y aleteo nasal. ¿A qué diagnóstico enfermero corresponde este caso?

Respuestas:

- Patrón respiratorio ineficaz.

- Deterioro del intercambio de gases.
- Limpieza ineficaz de las vías aéreas.
- Deterioro de la ventilación espontánea.

Como profesional de enfermería, líder del servicio de cirugía debe planear y controlar las acciones. La gráfica del calendario de operaciones sobre el que se indican tiempos para la realización de cada actividad de quirófano se refiere a:

Respuestas:

- Diagrama de Gantt.

- Diagrama de Pert.
- Diagrama de flujo.
- Diagrama de Pareto.

¿Cuál de los siguientes estudios carece de formulación de hipótesis?

Respuestas:

- Exploratorio.

- Descriptivo.
- Correlacional.
- Explicativo.



¿Cuál es el principal cuidado de enfermería que se debe realizar al administrar gluconato de calcio por vía intravenosa?

Respuestas:

- **Valorar con frecuencia infiltración por el riesgo de extravasación, celulitis o necrosis.**

- Administrar directo el medicamento para evitar las complicaciones como arritmias.
- Educar al paciente sobre la ingesta de alimentos con vitamina D para mejorar la absorción.
- Valorar los niveles de electrolitos para evaluar la presencia de hipocalcemia.

Relacione los niveles del pensamiento crítico con sus características:

Niveles del pensamiento crítico	Características
1. Básico.	a. Las personas comienzan a separarse de los expertos.
2. Complejo.	b. Las personas toman las decisiones sin la ayuda de otras.
3. Compromiso.	c. Las personas piensan que los expertos tienen las respuestas.

Respuestas:

- **1c, 2a, 3b.**

- 1a, 2b, 3c.

- 1c, 2b, 3a.

- 1a, 2c, 3b.



Como profesional de enfermería del centro de salud, debe realizar visitas domiciliarias. La etapa de la visita que le ayuda para continuar o modificar la planificación de los cuidados, detectar las dificultades, revisar los objetivos, planificar otros nuevos, corresponde a:

Respuestas:

- **Evaluación de la visita.**

- Preparación de la visita.
- Planificación de la visita.
- Ejecución de la visita.

Paciente acude a la emergencia por presentar: disnea, dolor precordial de 10/10 de intensidad, en el electrocardiograma se observa una alteración del segmento ST. Para confirmar el diagnóstico, el médico le solicita exámenes de laboratorio. ¿Cuál es la prueba de laboratorio específica que necesita el paciente?

Respuestas:

- **Troponina.**

- Hemoglobina.
- Tromboplastina.
- Hematocrito.

Paciente masculino de 45 años, que presenta una úlcera duodenal. ¿Qué características clínicas presenta esta patología?

Respuestas:

- **El dolor ocurre cuando el estómago está vacío.**

- Existe una secreción normal o baja de ácido clorhídrico.
- Se presentan flatulencias.
- Es improbable que la úlcera se perfora.



Señale los hallazgos de gravedad o afectación de órgano blanco en una embarazada que presenta preeclampsia:

1. Trombocitopenia.
2. Septicemia.
3. Enzimas hepáticas elevadas.
4. Hemólisis.
5. Implantación baja de placenta.

Respuestas:

- **1, 3, 4**
- 2, 3, 5
- 2, 4, 5
- 1, 3, 5

El primer nivel de atención es la puerta de entrada a los servicios de salud, en donde las necesidades de salud se deben resolver en un porcentaje del:

Respuestas:

- **80 %**
- 70 %
- 50 %
- 20 %

Seleccione el problema de salud mental del adulto mayor que corresponde al Síndrome clínico caracterizado por irritabilidad, ansiedad, anhedonia, alteraciones en el sueño y el apetito.

Respuestas:

- **Depresión.**
- Demencia.
- Delirio.
- Alzheimer.



¿Qué patrón respiratorio se describe a continuación?

Ciclo regular en el que se incrementa la frecuencia y la profundidad de la respiración, después decrece hasta ocurrir apnea.

Respuestas:

- Respiración de Cheyne-Stokes.

- Respiración de Kussmaul.
- Respiración de Biot.
- Respiración eupneica.

En el SCORE mamá está indicado el uso de un medicamento en caso de toxicidad por sulfato de magnesio. ¿Cuál es el medicamento, concentración, dosis, tiempo y vía correcta de administrar?

Respuestas:

- Gluconato de calcio al 10 %, 1 g por vía intravenosa en 10 minutos.

- Gluconato de calcio al 10 %, 4 g por vía intravenosa en 20 minutos.
- Gluconato de calcio al 10 %, 2 g por vía intravenosa en 10 minutos.
- Gluconato de calcio al 20 %, 2 g por vía intravenosa en 20 minutos.

La trombosis venosa profunda es una potencial complicación post quirúrgica de prótesis de cadera y rodilla. Indique. ¿Cuál de las siguientes medidas no está encaminada a la prevención?

Respuestas:

- Incentivar la inmovilidad por temor a la hemorragia.

- Incentivar la deambulación.
- Colocar medias de compresión elásticas o vendaje compresivo.
- Deambulación temprana.

Paciente femenina de 38 años, a la valoración presenta exoftalmos; nerviosismo; sudoración; pulso 110 por minuto; refiere disminución progresiva de peso y mala tolerancia al calor. ¿Esta valoración a qué patología corresponde?

Respuestas:

- Hipertiroidismo.

- Hipotiroidismo.
- Crisis tiroidea.
- Hipoparatiroidismo.

Al realizar la valoración de Enfermería a un paciente de 45 años, el mismo refiere que desde hace más de 15 minutos presenta dolor agudo intenso en el pecho, localizado a nivel subesternal que irradia al cuello, brazos y espalda que no cede con reposo. Este dolor se acompaña de sudoración, fatiga y náuseas. Estas manifestaciones corresponden a un cuadro de:

Respuestas:

- Síndrome coronario agudo.

- Angina de pecho.
- Pericarditis.
- Trastornos de ansiedad.

Paciente femenino de 25 años, llega al Triage hospitalario para recibir atención médica. El enfermero de la sala de Triage, le realiza el control de los signos vitales los mismos que están dentro de los límites normales y valora el motivo por el que acude al hospital. El médico diagnostica que la paciente se encuentra en el estadio II del VIH. ¿Qué condiciones clínicas corresponde a este estadio?

Respuestas:

- Pérdida de peso moderada.

- Asintomático.
- Fiebre persistente.
- Anemia.



De las siguientes opciones, seleccione las que corresponden a las necesidades básicas de salud descritas por Virginia Henderson, utilizadas en la valoración de enfermería:

1. Eliminación de desechos del organismo.

2. Sexualidad reproducción.

3. Participar en actividades recreativas.

4. Valores y creencias.

5. Tolerancia al estrés.

6. Evitar los peligros del entorno.

Respuestas:

- 1, 3, 6

- 2, 4, 5

- 1, 3, 4

- 2, 5, 6

Identifique los signos y síntomas del desprendimiento placentario.

a. Dolor en areolas.

b. Reaparición de las contracciones.

c. Cambia la forma del útero disminuye su tamaño.

d. Amenorrea.

e. Salida de volumen moderado de sangre por genitales.

f. El cordón protruye por fuera de los genitales.

Respuestas:

- b, c, e, f

- a, b, c, d

- b, c, d, e

- a, d, e, f



Dentro de las medidas de dispersión identifique aquella que recoge la extensión de los valores:

Respuestas:

- **Varianza.**
- Mediana.
- Rango.
- Moda.

Seleccione la respuesta correcta con relación a las actividades que no se debe realizar en la primera etapa del parto:

Respuestas:

- **Rasure rutinariamente el área genital.**
- Brinde tranquilidad y apoyo emocional continuo.
- Permita la ingesta de líquidos azucarados.
- Permita la libertad de movimientos.

Uno de los modelos de enfermería describe que el objetivo de la enfermería es “Ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud y su bienestar, recuperación o a lograr una muerte digna”. ¿Quién es la creadora de este concepto de enfermería?

Respuestas:

- **Virginia Henderson.**
- Florence Nightingale.
- Martha Rogers.
- Marjory Gordon.



Relacione las vías de administración con sus respectivas ventajas.

Vías	Ventajas
1. Sublingual	a. Pocos efectos adversos. Efecto sistémico prolongado.
2. Subcutánea	b. Efecto farmacológico rápido al pasar directo a la circulación sistémica.
3. Transdérmica	c. Inicio de acción más rápido que la oral.
4. Tópica	d. Pocos efectos adversos. Evita problemas de absorción digestiva.

Respuestas:

- **1b, 2c, 3d, 4a.**
- 1a, 2c, 3d, 4b.
- 1b, 2d, 3c, 4a.
- 1a, 2b, 3c, 4d.

Son medidas que involucran a todos los pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. ¿A qué principio básico de Bioseguridad se refiere este enunciado?

Respuestas:

- **Universalidad.**
- Uso de barreras.
- Medios de eliminación de material contaminado.
- Equipos de seguridad.



En el área de Pediatría, usted educa a los padres que es recomendable e ideal que los niños tengan de 11 a 14 horas de sueño. ¿A qué grupo de edad se refieren las horas recomendadas de sueño?

Respuestas:

- **1 - 2 años.**
- 3 - 5 años.
- 0 - 3 meses.
- 6 - 13 años.

Ordene los componentes de un trazado electrocardiográfico normal:

1. Onda P.
2. Complejo QRS.
3. Intervalo PR.
4. Segmento S.
5. Intervalo QT.
6. Onda T.

Respuestas:

- **1, 3, 2, 4, 6, 5**
- 2, 3, 1, 4, 5, 6
- 1, 4, 5, 3, 2, 6
- 4, 5, 6, 2, 1, 3

A la valoración pulmonar de un paciente se auscultan: sonidos fuertes, de tono bajo, retumbantes, se escuchan durante la inspiración o espiración y a veces se aclaran con la tos. Señale a qué tipo de ruido pulmonar adventicio se refiere el enunciado:

Respuestas:

- **Roncus.**
- Sibilancias.
- Crepitantes.
- Roce por fricción pleural.

Seleccione las manifestaciones clínicas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica:

1. Fiebre con escalofríos.

2. Disnea de esfuerzo.

3. Tos con hemoptisis.

4. Tos crónica.

5. Dolor torácico pleurítico.

6. Producción de esputo.

Respuestas:

- 2, 4, 6

- 1, 3, 5

- 1, 2, 4

- 3, 5, 6

Luis de 40 años acude a la emergencia por presentar palpitaciones, debilidad, dolor, presión del pecho, fatiga y mareos, al realizarle un electrocardiograma se identifica una fibrilación ventricular, para el manejo le piden administrar una dosis inicial de un antiarrítmico. ¿Cuál es el medicamento que pertenece a este grupo farmacológico?

Respuestas:

- Amiodarona.

- Adrenalina.

- Dopamina.

- Atropina.

Paciente ingresa al servicio por presentar parada cardiorespiratorio, el equipo de salud se prepara para el manejo de una vía aérea definitiva mediante la colocación de un tubo endotraqueal, el personal de enfermería debe confirmar la correcta colocación, para lo cual necesita un método cuantitativo que le permita verificar la presencia de dióxido de carbono en la vía aérea. ¿Cuál es la técnica que necesita para su intervención de enfermería?

Respuestas:

- **Medir con la Capnografía.**

- Valorar con la oximetría de pulso.
- Comprobar con el endotest.
- Utilizar métodos cololímetros.

Mujer de 55 años que ingresa al servicio de cirugía del hospital general, por intervención quirúrgica programada, en el preoperatorio se retiran objetos personales y prendas de vestir, colocando una bata antes de entrar al quirófano, luego de su ingreso y de permanecer unos minutos en la sala, la paciente manifiesta sentir frío ya que la temperatura ambiental se mantiene baja, se observa temblor muscular y "piel de gallina", sus signos vitales T 36 °C; P 92 lpm; R 20 rpm y PA 100/60 mm/Hg. Para poder aplicar cuidados específicos, el profesional de enfermería deberá reconocer ¿Cuál es el mecanismo que está provocando la pérdida de calor en la paciente?

Respuestas:

- **Radiación.**

- Convección.
- Evaporación.
- Conducción.

Al atender a un paciente con Síndrome de Compresión Medular secundario a metástasis ósea en la columna vertebral, se administra un opioide para el alivio del dolor, adicionalmente se emplea otro medicamento como analgésico adyuvante. ¿Qué tipo de medicamento puede utilizarse como analgésico adyuvante en este caso?

Respuestas:

- **Corticoides.**

- Miorelajantes.
- Anticonvulsivantes.
- Antidepresivos.

Como enfermera del centro de salud entre sus actividades, es educar a las personas que reciben atención en la unidad, para lo cual debe planificar una charla educativa sobre Diabetes, como una estrategia para evitar el alto índice de las enfermedades crónicas. Su intervención debe basarse en un modelo de Enfermería. ¿Qué teorizante aplicaría en este caso?

Respuestas:

- **Nola Pender.**

- Florence Nightingale.
- Virginia Herderson.
- Dorothea Orem.

Paciente ingresa al servicio de Medicina Interna con diagnóstico de sangrado digestivo, el médico de turno le pide que administre una Solución Salina de 1000 cc en 8 horas. ¿Cuál es el número de gotas que va a administrar por minuto con equipo de venoclisis?

Respuestas:

- **42 gotas por minuto.**

- 27 gotas por minuto.
- 14 gotas por minuto.
- 45 gotas por minuto.

La sífilis es una infección de transmisión sexual que se transfiere al feto por medio de la placenta, suele presentarse en los últimos trimestres de embarazo puede producir muerte en la etapa fetal, los niños que nacen pueden presentar manifestaciones mucocutáneas, identifique los síntomas de la sífilis congénita temprana:

Respuestas:

- **Púrpura, pénfigo palmoplantar, erupción maculopapular, condilomas planos, ragades y petequias.**

- Vesículas ampollasas en palmas y plantas, de contenido turbio y verdoso, que se rompen rápidamente dejando la dermis descubierta.
- Edema difuso de la piel: Con afectación palmo-plantar.
- Ulceración de la cicatriz umbilical (chancro).



Paciente de 43 años, se le realiza una gasometría arterial, cuyos resultados son: pH = 7,52, PaCO₂ mm Hg = 40, HCO₃ = 30mEq/L. De acuerdo a estos resultados ¿Cuál es el desequilibrio ácido básico que presenta este paciente?

Respuestas:

- **Alcalosis metabólica descompensada.**

- Acidosis Respiratoria compensada.
- Alcalosis Respiratoria compensada.
- Acidosis metabólica compensada.

Seleccione los principios básicos de bioseguridad:

Respuestas:

- **Universalidad, uso de barreras, medios de eliminación de material contaminado.**

- Prácticas adecuadas en el trabajo, universalidad, eliminación de desechos.
- Equipo de seguridad, uso de barreras, medios de eliminación de material contaminado.
- Uso de barreras, prácticas adecuadas en el trabajo, universalidad.

Un paciente de 28 años durante un partido de fútbol presenta esguince de tobillo que luego de valoración se diagnostica Esguince grado II. ¿Cuáles son las características de este tipo de esguince?

Respuestas:

- **Rotura parcial de ligamentos, lesión parcial, dolor localizado.**

- Distensión del ligamento, inflamación y dolor leve.
- Rotura completa del ligamento, hematoma, dolor y edema severo.
- Luxación de la articulación, hemartrosis, dolor importante.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



¿En cuál de las determinantes de salud se debe realizar una intervención social multisectorial, al detectarse un incremento de VIH en una comunidad estudiantil, debido al consumo de drogas, relaciones sexuales promiscuas y desprotegidas?

Respuestas:

- Estilo de vida.

- Medio ambiente.
- Biología humana.
- Atención sanitaria.

Primigesta de 27 años, en el primer control de embarazo se registra IMC de 24, TA=120/80 mmHg, FC= 72 X', FR=19 X', T°=36,5° C. Acude a control subsecuente con 23 semanas de gestación; en la valoración actual: IMC de 26, TA=150/90 mm Hg, FC= 78 X', FR=18 X', T°= 37°C, proteinuria con tira reactiva ++ ¿Qué trastorno hipertensivo presenta la paciente?

Respuestas:

- Preeclampsia leve.

- Preeclampsia grave.
- Hipertensión gestacional.
- Hipertensión crónica.

Al realizar la valoración a una paciente de 37 años de edad, la misma refiere que hace un tiempo viene presentando nerviosismo, palpitaciones, que su piel se le enrojece y que siente que las manos le tiemblan, todo esto acompañado de pérdida de peso. Ante estos signos y síntomas, usted interpreta estas manifestaciones como un cuadro de:

Respuestas:

- Hipertiroidismo.

- Síndrome de Cushing.
- Aldosteronismo primario.
- Hipotiroidismo.



Entre las intervenciones de enfermería en pacientes con sonda vesical permanente, está la orientación sobre la ingestión de líquidos. ¿Qué cantidad de líquidos le recomienda beber al paciente?

Respuestas:

- **Hasta 3000 ml.**
- Hasta 2000 ml.
- Hasta 1000 ml.
- Hasta 1500 ml.

La teorizante de enfermería moderna que establece que las condiciones externas afectan la vida y contribuyen a las enfermedades es:

Respuestas:

- **Florence Nightingale.**
- Virginia Henderson.
- Nola Pender.
- Dorothea Orem.

Paciente de 33 años con diagnóstico de íleo paralítico, con sonda nasogástrica que ha drenado gran cantidad de líquido, muestra signos de hipopotasemia e hiponatremia, tiene prescripción de reposición de las pérdidas gastrointestinales por vía intravenosa. ¿Qué solución utiliza para la reposición?

Respuestas:

- **Lactato Ringer.**
- Dextrosa al 5% en agua.
- Dextrosa al 10% en agua.
- Solución salina normal.

De acuerdo a las etapas del ciclo vital familiar, la familia en contracción se refiere:

Respuestas:

- **Desde que el primer hijo abandona el hogar hasta que lo hace el último hijo.**
- Desde la formación de pareja hasta el nacimiento del primer hijo/a.
- Desde que nace el primer hijo hasta que el primer hijo abandona el hogar.
- Desde que muere el primer cónyuge hasta la muerte del superviviente.

¿Cuál es la definición de Enfermería según Dorotea Orem?

Respuestas:

- **La Enfermería es el arte de actuar por la persona incapacitada, ayudarla a actuar por sí misma o ayudarla a aprender a actuar por sí misma.**
- Lo fundamental de la enfermería es situar al paciente en el mejor estado posible para que la naturaleza actúe sobre el mismo.
- La función propia de la Enfermería es asistir al individuo, sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación.
- La Enfermería es un servicio al individuo y a la familia.

Paciente adulto mayor acude al hospital por presentar desorientación, vómitos, agitación e irritabilidad, de acuerdo a la prescripción médica le indican administrar una solución hipertónica para manejo de hiponatremia. ¿Cuál es la solución que usted debe administrar?

Respuestas:

- **Solución Salina al 3%**
- Lactato Ringer.
- Solución Salina al 0.45%
- Dextrosa en Solución Salina 5%

Identifique en qué estadio clínico de la enfermedad del VIH aparecen condiciones clínicas como neumonía bacteriana recurrente, candidiasis esofágica, tuberculosis extrapulmonar, sarcoma de Kaposi y nefropatía asociada al VIH.

Respuestas:

- **Estadio IV**
- Estadio I
- Estadio II
- Estadio III

Seleccione los pasos a seguir para aplicar la ficha familiar:

- 1. Coordinar con la autoridad comunitaria.**
- 2. Obtener datos de persona >15 años de no estar el jefe de familia.**
- 3. Recibir capacitación y el material necesario.**
- 4. Registrar cada familia asignándole un código.**
- 5. Asignar el centro de salud para archivar las fichas familiares.**
- 6. Analizar y aplicar la información en la carpeta familiar.**

Respuestas:

- **1, 3, 4, 6**
- 1, 2, 5, 6
- 2, 3, 4, 5
- 3, 4, 5, 6

Paciente con diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio, para su manejo, el médico le prescribe un medicamento vasodilatador que actúa relajando el músculo liso de los vasos arteriales y venosos. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene este mecanismo de acción?

Respuestas:

- **Nitroglicerina.**
- Heparina.
- Ácido Acetilsalicílico.
- Morfina.



Durante la valoración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico, usted se percata que el paciente presenta deterioro neurológico progresivo, sólo ante un estímulo doloroso abre los ojos y se retira del dolor, sus palabras son mal articuladas con sonidos incomprensibles. ¿Qué puntuación en la escala de Glasgow tiene el paciente?

Respuestas:

- **8 puntos.**

- 13 puntos.

- 15 puntos.

- 7 puntos.

Complete el siguiente enunciado con relación al volumen gástrico residual en la alimentación enteral:

Los volúmenes gástricos residuales se miden antes de cada alimentación _____ y cada 4 a 8 horas durante la alimentación _____.

Los volúmenes residuales mayores a _____ pueden vincularse con un riesgo aumentado de aspiración y neumonía asociada.

Respuestas:

- **Intermitente – continua – 200 ml.**

- Continua – intermitente – 100 ml.

- Intermitente – continua – 50 ml.

- Continua – intermitente – 150 ml.

Se programa cirugía de colecistectomía en paciente masculino de 47 años, con antecedentes patológicos personales de HIV en tratamiento con su TARGA habitual, ingesta y abuso de alcohol hace 3 años. SV: PA: 100/70mmHg; FC: 76lpm; Fr: 22rpm; T°:36,7°C; IMC: 32. En el transoperatorio se presenta complicación en la respiración, provocando disminución en la función ventilatoria. ¿Qué factor considera como principal causa de complicación durante el transoperatorio?

Respuestas:

- **Aumento del peso corporal del paciente. .**

- Paciente con antecedentes de inmunodepresión.

- Disminución del peso corporal del paciente.

- Hábitos de ingesta de alcohol del paciente.



¿Qué coloración espera encontrar al examinar los loquios de una puérpera en el día once del posparto?

Respuestas:

- **Blanca.**
- Seroso
- Amarronada.
- Rojos.

Señale el diagnóstico de enfermería que corresponde a la definición operacional: La inspiración y/o espiración que no proporcionan ventilación adecuada.

Respuestas:

- **Patrón respiratorio ineficaz.**
- Deterioro del intercambio de gases.
- Limpieza ineficaz de la vía aérea.
- Estado respiratorio: ventilación.

Niño de 3 años llega letárgico al centro de salud con los siguientes signos y síntomas: temperatura de 38.7 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 138 latidos por minuto, respiraciones 42 por minuto, saturación de oxígeno 83%, tiraje subcostal y estridor. De acuerdo con el AIEPI clínico 2017. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento respectivo?

Respuestas:

- **Neumonía grave y administración de primera dosis de ampicilina 50 mg/kg, oxígeno y referir urgentemente.**
- Neumonía grave y administración de ceftriaxona 50 mg/kg, oxígeno y referir urgentemente.
- Neumonía grave y administración de primera dosis de amoxicilina 80 mg/kg, paracetamol 15 mg/kg, oxígeno y referir urgentemente.
- Neumonía y administración de primera dosis de ampicilina 50 mg/kg, oxígeno y referir urgentemente.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001




Al realizar la valoración de enfermería a un paciente, usted observa que presenta crisis de tetania y según datos de laboratorio: Ca = 5 mg/dL, Na=140 mEq/l, K=4 mEq /l. ¿Qué trastorno electrolítico presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hipocalcemia.**
- Hipopotasemia.
- Hipernatremia.
- Hipercalcemia.

Relacione los procedimientos a realizar, de acuerdo con la pirámide sobre el uso de guantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pirámide del uso de guantes	Procedimiento
 1. Guantes estériles 2. Guantes de manejo	a. Contacto con membrana mucosa o piel dañada. b. Procedimientos radiológicos invasivos. c. Inserción y retirada de dispositivos intravenosos. d. Accesos vasculares y procedimientos vasculares.

Respuestas:

- **1bd, 2ac.**
- 1ab, 2cd.
- 1cd, 2ab.
- 1ad, 2bc.



Una mujer en edad fértil que acude a la consulta médica, indica que tiene los siguientes signos y síntomas: retraso de 8 días de su menstruación, náuseas en la mañana y vómito ocasional, turgencia mamaria y cansancio ¿A qué tipo de signos y síntomas fisiológicos de embarazo corresponden?

Respuestas:

- **Signos presuntivos de embarazo.**

- Signos compatibles de embarazo.
- Signos probables de embarazo.
- Signos positivos de embarazo.

De las actitudes y aplicaciones del pensamiento crítico en la práctica enfermera, una de ellas es solicitar ayuda si no se está seguro sobre cómo realizar alguna técnica. ¿A qué actitud hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- **Responsabilidad y autoridad.**

- Perseverancia.
- Humildad.
- Integridad.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Paciente femenina de 34 años quien se encuentra recibiendo sulfato de magnesio por vía intravenosa, usted identifica que la paciente presenta hiporreflexia, somnolencia, bradipnea y diaforesis. Al analizar los resultados de los exámenes de electrolitos séricos encuentra lo siguiente:

Potasio: 4.5 mEq/L

Sodio: 140 mEq/L

Cloro: 105 mEq/L

Magnesio: 3.2 mg/dL

Calcio: 8.6 mg/dL

¿Qué alteración electrolítica presenta la paciente?

Respuestas:

- **Hipermagnesemia.**
- Hiperpotasemia.
- Hipernatremia.
- Hipercloremia.

Usted como profesional de Enfermería identifica el siguiente diagnóstico enfermero: déficit de volumen de líquidos, relacionado con pérdida activa de sangre, manifestado por disminución de la presión arterial, sequedad de mucosas orales, aumento de la frecuencia del pulso, debilidad y sed. En la planificación de sus cuidados. ¿Qué resultado esperado elige usted para la paciente según el diagnóstico enfermero citado? Elija la respuesta correcta:

Respuestas:

- **Aumento de volemia.**
- Termorregulación.
- Equilibrio electrolítico y ácido - base.
- Eliminación urinaria.



Al servicio de emergencia en el que usted labora el equipo de trabajo de Enfermería se encuentra debatiendo cuál es la mejor etiqueta diagnóstica para un paciente con dificultad respiratoria leve. A pesar de las diferencias de criterio del grupo sobre el manejo del paciente, el líder toma la decisión de rechazar la opinión de sus compañeros porque él cree tener la mejor opción de etiqueta diagnóstica para su cuidado. ¿Qué actitud sugiere para fomentar el pensamiento crítico en esta situación?

Respuestas:

- **Imparcialidad.**

- Integridad.
- Independencia.
- Perseverancia.

Paciente femenina sufrió un accidente vascular cerebral (ACV) hace una semana presenta síntomas: dolor, debilidad de los músculos, malestar generalizado, fiebre, taquicardia, disminución del gasto urinario, diuresis de color castaño oscuro, el cual se debe a un desequilibrio hidroelectrolítico o insuficiencia renal, están a espera de resultados de creatina cinasa, enzimas hemáticas, para confirmar estos diagnósticos, estas manifestaciones clínicas son características de:

Respuestas:

- **Rabdomiliosis.**

- Atrofia muscular.
- Encefalopatía hepática.
- Síndrome de Bartter.

Al realizar la valoración de las mamas en una niña de 14 años, usted observa que hay una recesión de laaréola, con lo que solo el pezón sobresale. ¿En cuál de los estadios de Tanner se encuentra?

Respuestas:

- **Estadio 5**

- Estadio 4
- Estadio 3
- Estadio 2

Adulto mayor ingresa al servicio médico por presentar hormigueo en los dedos de las manos, pies y en región peri bucal, al examen físico se observa reflejos osteotendinosos aumentados, los resultados de laboratorio muestran los siguientes datos: Na: 135mEqL; K: 3,5 mEqL; Ca: 7.0mg/dL, seguidamente de un electrocardiograma que reporta intervalo QT y segmento ST prolongados. ¿Cuál es la alteración electrolítica que presenta el paciente?

Respuestas:

- Hipocalcemia.

- Hipercalcemia.
- Hipercalcemia.
- Hipocalemia.

Mujer de 21 años se encuentra embarazada y reporta tener múltiples parejas sexuales por el trabajo que realiza, al momento acude al servicio de ginecología para realizarse control de su embarazo. Al iniciar la preparación, paciente desconoce la fecha de su última menstruación, se toma los signos vitales, su talla es de 1m 45cm se reporta una estatura baja, el índice de masa corporal es menor a 18.5 kg/m², lo que se considera peso bajo para edad gestacional. ¿En qué factor de riesgo clasificaría a este embarazo?

Respuestas:

- Factores de riesgo no modificables.

- Factores de riesgo modificables.
- Factores de dominio modificables.
- Factores de riesgo sociales no modificables.

¿Cuál elemento del Código de Ética del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) se encuentra vulnerado cuando el profesional de enfermería acude al turno con problemas en su salud?

Respuestas:

- La enfermera y la práctica.

- La enfermera y las personas.
- La enfermera y la profesión.
- La enfermera y sus compañeros de trabajo.



Mediante la técnica de auscultación, usted detecta un paciente que presenta sonidos fuertes de tono bajo, retumbantes que se oyen durante la inspiración o la espiración. ¿Cuál es el ruido que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Roncus.**
- Crepitantes.
- Sibilancias.
- Roce pleural.

Adulto mayor con diagnóstico de diabetes acude al centro de salud porque indica que su familia no apoya los buenos hábitos de alimentación lo que le dificulta mantener la dieta prescrita. Usted como personal de enfermería le indica otras alternativas para seguir con el régimen terapéutico y le anima a tomar una decisión. ¿Cuál es el rol del personal de enfermería frente al caso?

Respuestas:

- **Consejera.**
- Educadora.
- Cuidadora.
- Gestora de casos.

¿Cuál es el objetivo de la aplicación del test de APGAR familiar?

Respuestas:

- **Evaluar el Nivel de funcionamiento de la familia.**
- Determinar una crisis familiar normativa.
- Determinar una crisis familiar no normativa.
- Evaluar la funcionalidad de la familia a través de una representación gráfica.

Seleccione el tipo de drenaje que se utiliza para vía biliar.

Respuestas:

- **Tubo en T.**
- Penrose.
- Jackson Pratt.
- Hemovac.



A un paciente se requiere administrar, solución salina 0.9 % en un volumen de 500 ml pasar en 24 horas a una velocidad de flujo de 7 gotas / min, de acuerdo a criterio de enfermería se debe transfundir en equipo de bomba. ¿A cuántos ml/h usted programa la bomba?

Respuestas:

- **21 ml/h.**

- 7 ml/h.

- 25 ml/h.

- 42 ml/h.

Seleccione las ventajas de la administración del micronutriente CHIS PAZ en los niños menores de 5 años:

1. El costo del producto no es excesivo y el embalaje es atractivo y de fácil aceptación.
2. Desarrollo de heces líquidas o constipación, oscurecimiento de las heces.
3. La sobredosis es poco probable por la cantidad mínima existente en los sobres.
4. Mejora la respuesta inmune.
5. Los sobres son fáciles de usar y se administran en cualquier comida.
6. El empleo de micronutriente se mezcla con productos preparados en casa.
7. Disminuye las complicaciones graves de sarampión.

Respuestas:

- **1, 3, 5, 6**

- 1, 2, 4, 7

- 2, 3, 4, 5

- 2, 5, 6, 7

Seleccione la teorizante fundadora en los cuidados de la diversidad y la universalidad de la Enfermería transcultural.

Respuestas:

- **Madeleine Leininger.**

- Hildegard Peplau.

- Martha Rogers.

- Virginia Henderson.



De las siguientes, identifique las acciones que se deben seguir y valorar en la paciente cuando se evidencia patrones anormales dentro de la monitorización fetal:

- a. Cambio de posición materna a decúbito lateral, preferiblemente sobre el izquierdo.
- b. Posición trendelenburg.
- c. Examen vaginal para descartar prolapso de cordón o evolución rápida del parto.
- d. Monitorización de la presión sanguínea materna para descartar hipotensión materna.
- e. Es importante valorar presencia de edema generalizado.
- f. El uso prolongado de la oxigenoterapia en la madre puede ser perjudicial para el feto y debe evitarse.

Respuestas:

- **a, c, d, f.**
- b, c, d, e.
- a, b, e, f.
- b, d, e, f.

La herramienta de diagnóstico que permite conocer en forma gráfica el proceso vivido por los actores locales, los factores de riesgo y protección: sanitario ambiental, socioeconómico y biológico, se refiere a:

Respuestas:

- **Mapa parlante.**
- Análisis situacional de salud.
- Diagnóstico dinámico.
- Sala situacional.

Paciente ingresa al servicio de Ginecología con diagnóstico de Pielonefritis, el médico para su tratamiento le pide administrar Ciprofloxacina 400 mg intravenosa cada 12 horas. Usted como personal de enfermería debe conocer del medicamento para evitar efectos adversos. ¿A qué grupo farmacológico pertenece este medicamento?

Respuestas:

- **Fluoroquinolona.**
- Macrólidos.
- Aminoglucósidos.
- Cefalosporina.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Los métodos educativos directos utilizados en la educación en salud son:

Respuestas:

- **El diálogo, clase magistral, charla y discusión de grupo.**

- Simulaciones, juegos, demostración y análisis de situaciones.
- Foto-palabra, cuestionarios, dibujo-palabra y tormenta de ideas.
- Análisis de textos, de problemas, valoraciones de situaciones y discusiones.

Como profesional de enfermería, usted debe crear un grupo que será el responsable de analizar los problemas de salud de la comunidad y sus posibles soluciones. ¿Qué técnica usted utilizaría para generar consenso y cuantificar las posiciones y preferencias de los componentes del grupo?

Respuestas:

- **Voto ponderado.**

- Phillips 6/6.
- Parejas rotativas.
- Brainstorming.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a las características clínicas de la Glomerulonefritis?

Respuestas:

- **Hematuria – Edema- Hipertensión arterial.**

- Hiperalbuminemia – Hipolipidemia – Hipotensión arterial.
- Deshidratación – Poliuria – Hipertensión arterial.
- Hipotensión arterial- Hematuria- Hiperalbuminemia.

Usted debe preparar una charla educativa a una población de adolescentes sobre Salud Sexual, orientándolos a tomar decisiones adecuadas y responsables. ¿Cuál es el enfoque, según el Plan de Salud Sexual y Salud Reproductiva del MSP, que se pone de manifiesto en este caso?

Respuestas:

- Enfoque inter-generacional.

- Enfoque de inclusión social.
- Enfoque de género.
- Enfoque de interculturalidad.

La actuación de la enfermera en la atención familiar y comunitaria en el marco de la APS, implica asumir una relación personal, asistencial que hace referencia a la conexión entre las distintas actuaciones asistenciales, relativas a un problema de salud, actuaciones que pueden ser realizadas por distintos profesionales y en diferentes ámbitos del sistema sanitario. ¿Cuál es el tema al que hace mención el enunciado?

Respuestas:

- Continuidad de los cuidados.

- Longitudinalidad de los cuidados.
- Promoción de los cuidados.
- Prevención de los cuidados.

El diagnóstico de enfermería es el enunciado que explica y describe el estado de salud, problema real o potencial en los procesos vitales de una persona. ¿Cuál es la estructura secuencial de un diagnóstico real?

Respuestas:

- Etiqueta diagnóstica + factores relacionados + características definitorias.

- Etiqueta diagnóstica + factores relacionados + factores etiológicos.
- Etiqueta diagnóstica + problema + factores relacionados.
- Etiqueta diagnóstica + características definitorias + factores relacionados.

La definición: La diferenciación o cambio progresivo de órganos y tejidos con adquisición y perfeccionamiento en sus funciones. Corresponde a:

Respuestas:

- **Desarrollo.**

- Crecimiento.
- Maduración.
- Percentiles.

Dentro del proceso para la atención en el escenario comunitario del MAIS – FCI, se encuentra la Salud Ambiental, que son actividades dirigidas a fomentar el cuidado del entorno familiar y comunitario con la finalidad de minimizar los riesgos ambientales para proteger la salud de la población. Las actividades por realizar son:

Respuestas:

- **Vigilancia periódica de la calidad del agua, alimentos, excretas, vectores, aire, recursos naturales.**

- Vigilar y reportar en forma oportuna las enfermedades epidemiológicas de notificación obligatoria y factores de riesgo.
- Vigilancia de problemas sociales (alcoholismo, violencia, drogadicción).
- Vigilancia y seguimiento a personas con discapacidad.

Cuando usted realiza la valoración del reflejo oculocefálico (ROC) a paciente inconsciente, encuentra que los ojos no se mueven o el movimiento ocular no es conjugado, cuando gira la cabeza hacia lado derecho e izquierdo, esto quiere decir que existe una alteración a nivel de:

Respuestas:

- **Tallo encefálico**

- Ángulo pontocerebeloso
- Mesencéfalo
- Cerebelo



Paciente de 57 años, diagnosticada de Hipotiroidismo, es atendida en el servicio de Medicina Interna. En el momento de la valoración se encuentra con reposo en cama, presenta letargia, $T^{\circ} = 35^{\circ} \text{ C}$, $\text{FC}=50\text{X}'$, no ha realizado la deposición por 2 días. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario en este caso?

Respuestas:

- **Hipotermia R/C enfermedad M/P temperatura 35° C .**

- Intolerancia a la actividad R/C inmovilidad M/P debilidad generalizada.
- Riesgo de estreñimiento crónico funcional R/C hipotiroidismo.
- Riesgo de confusión aguda R/C deterioro del funcionamiento metabólico.

Un niño de 5 años presenta un crecimiento lento en su talla, es física y mentalmente parsimonioso, se muestra cansado y friolento. ¿A qué tipo de alteración de crecimiento se refiere el caso descrito?

Respuestas:

- **Deficiencia de hormona tiroidea.**

- Talla baja familiar.
- Deficiencia de hormona de crecimiento.
- Retraso del crecimiento y la pubertad.

En la hipótesis: el aumento de número de divorcios de parejas cuyas edades fluctúan entre los 18 y 25 años será de entre 10 y 12%, dentro de cinco años en las principales ciudades del Ecuador, tomado como base los datos de años anteriores. ¿De acuerdo con lo antes descrito, identifique a qué tipo de la hipótesis hace referencia?

Respuestas:

- **Hipótesis predictivas.**

- Hipótesis correlacional.
- Hipótesis causales.
- Hipótesis alternativas.



Al centro de salud acude una señora con problemas para mantener el equilibrio por lo que necesita ayuda de sus familiares para la deambulaci3n, usted como profesional de Enfermería debe realizar la valoraci3n. ¿Cuál de las siguientes escalas utilizaría para su valoraci3n?

Respuestas:

- **Tinetti.**
- Barthel.
- Yesavage.
- Pfeiffer.

¿En qué nivel de actuaci3n el personal de Enfermería est3 encaminado al diagn3stico y tratamiento de los problemas de salud ya establecidos (enfermedad instalada), mediante la elaboraci3n de un plan de cuidados de enfermería destinado a evitar posibles complicaciones?

Respuestas:

- **Nivel Secundario o Patogénico.**
- Nivel Primario o Pre-Patogénico.
- Nivel Terciario o Pos-Patogénico.
- Nivel Cuaternario o Pre-Patogénico.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgaci3n de la informaci3n y consentimiento informado.

Direcci3n: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

C3digo postal: 170702/ Quito - Ecuador

Tel3fono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Señale los pasos que la enfermera debe seguir para dar atención a un usuario:

- 1. Llenado de la ficha familiar.**
- 2. Captación del individuo.**
- 3. Admisión integral.**
- 4. Formular plan de atención.**

5. Atención integral.

6. Monitoreo familiar.

Respuestas:

- **2, 3, 5**
- 1, 2, 5
- 2, 4, 6
- 1, 3, 4

Paciente acude al centro de salud para solicitar asesoramiento sobre lactancia materna, indica que por motivos de trabajo debe dejar a su hijo de tres meses al cuidado de un familiar y desea mantener la leche materna a una temperatura ambiente adecuada. ¿Cuál es la temperatura y tiempo de conservación conveniente?

Respuestas:

- **$\leq 26^{\circ}\text{C}$ tres horas.**
- $\leq 5^{\circ}\text{C}$ tres días.
- -15°C dos semanas.
- -18°C tres meses.

Identifique la medida de tendencia central que se define como el promedio aritmético de una distribución:

Respuestas:

- **Media.**
- Moda.
- Mediana.
- Porcentaje.

En las enfermedades inmunoprevenibles como la Difteria. ¿Cuál es el tipo de muestra que se debe tomar?

Respuestas:

- **Hisopado orofaríngeo, nasofaríngeo o de lesiones cutáneas.**
- Sangre, dependiendo de las condiciones del paciente: tejido hepático.
- Líquido cefalorraquídeo, sangre.
- Orina, saliva o líquido cefalorraquídeo.

Cuando el MAIS-FCI, garantiza los derechos de las y los ciudadanos y la corresponsabilidad en el cumplimiento de los deberes hacia los otros, sus comunidades y la sociedad se esta refiriendo a:

Respuestas:

- **Principios del Modelo de Atención Integral de Salud.**
- Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud.
- Propósito del Modelo de Atención Integral de Salud.
- Objetivos estratégicos para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud.



Paciente acude al hospital por presentar irritabilidad, mucosas orales secas, náuseas que llegan al vómito por varias ocasiones. Se solicita exámenes de laboratorio donde se identifica sodio de 150 mEq/L; para el tratamiento le piden administrar una solución salina hipotónica. De las siguientes opciones. ¿Cuál es la solución más adecuada?

Respuestas:

- Solución Salina al 0.3%

- Solución Salina al 0.9%
- Solución de Lactato Ringer.
- Solución Salina al 3%

De acuerdo al MAIS-FCI, cuando se integra a la salud desde una visión multidimensional y biopsicosocial tanto individual como colectiva actuando sobre los riesgos y condiciones que afectan la salud, identificando y potenciando los factores protectores de la salud articulando acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos de las personas, familias comunidad y su entorno se refiere a:

Respuestas:

- Principios del Modelo de Atención Integral de Salud.

- Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud.
- Propósito del Modelo de Atención Integral de Salud.
- Objetivos estratégicos para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud.

En el área de triage de urgencias obstétricas, usted atiende a una mujer de 38 años con embarazo de 23 semanas, con una tensión arterial de 150/100 mm Hg, presenta proteinuria 350 mg en orina de 24 horas. ¿A qué patología de los trastornos hipertensivos del embarazo corresponde el caso?

Respuestas:

- Preeclampsia sin signos de gravedad (leve).

- Hipertensión gestacional.
- Eclampsia.
- Hipertensión arterial crónica.



Al aplicar enemas de limpieza con el objetivo de eliminar las heces, se emplean varias soluciones. ¿Qué tipo de solución estimula el peristaltismo aumentando el volumen en el colon e irritando la mucosa?

Respuestas:

- **Espumosa.**
- Hipotónica.
- Hipertónica.
- Isotónica.

Paciente con 12 semanas de gestación, acude a la consulta de Emergencia de un hospital de segundo nivel, por presentar: fiebre de 38.5 grados, escalofríos, malestar general, náuseas, vómito, refiere dolor costo vertebral y deshidratación. El médico la valora y diagnóstica pielonefritis. ¿Qué medicamento de primera elección debe tener listo la enfermera, en este caso?

Respuestas:

- **Nitrofurantoina.**
- Fosfomicina.
- Cefalosporina.
- Ampicilina.

Un paciente con sonda para aspiración gástrica y diarrea, presenta debilidad muscular y calambres. Según el cuadro descrito y los resultados de laboratorio: Na 137 mEq/L, K 3.2 mEq/L, Ca 8.9 mg/dL, Mg 1.8 mg/dL. ¿Qué trastorno electrolítico presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hipopotasemia.**
- Hipernatremia.
- Hipercalcemia.
- Hipomagnesemia.

Los siguientes son objetivos relacionados a la necesidad de cambios de posición, EXCEPTO:

Respuestas:

- **Ejecución de procedimientos médicos.**

- Mantener una buena alineación corporal.
- Evitar la aparición de isquemia.
- Mejorar la respiración y la circulación.

Nelly es una paciente de 29 años quien presenta signo de Trousseau, hiperreflexia, cambios en el estado de ánimo y aumento de la presión arterial, se encuentra recibiendo nutrición parenteral. Al analizar los resultados de electrolitos séricos, encuentra los siguientes valores:

Potasio: 3.5 mEq/L

Sodio: 137 mEq/L

Cloro: 98 mEq/L

Magnesio: 1.3 mg/dL

Calcio: 9.0 mg/dL

Considerando las manifestaciones y las concentraciones de electrolitos séricos. ¿Qué alteración electrolítica presenta la paciente?

Respuestas:

- **Hipomagnesemia**

- Hipocloremia
- Hipopotasemia
- Hipocalcemia

En una institución de salud se observa que la autoridad fluye de arriba hacia abajo, con centralización del mando y controles rígidos. ¿A qué tipo de organización corresponden estas características?

Respuestas:

- Organización lineal.

- Organización funcional.
- Organización lineo- funcional.
- Organización por comités.

¿Cuáles son las características de la comunicación terapéutica en el entorno quirúrgico?

Respuestas:

- Está dirigida a un objetivo, es única para cada paciente, exige compromiso activo, requiere de habilidades de observación y escucha.

- Ayuda a controlar el temor, controla el dolor, explica los pasos de la cirugía, alienta al paciente a comunicarse con el equipo de salud.
- Mantiene la seguridad en el acto quirúrgico, verifica el grado de bienestar, alienta a que el paciente comunique sus emociones, explica el procedimiento.
- Está dirigida a mantener el interés en la comunicación con los miembros del equipo quirúrgico, ayuda a evitar accidentes quirúrgicos.

Se recibe en la unidad de obstetricia una embarazada de 36 semanas de gestación con presencia de sangrado de características rojo rutilante. El informe del ultrasonido realizado describe que la placenta se ha implantado sobre el segmento uterino y el borde inferior queda a menos de 2 cm del orificio cervical interno. ¿A cuál corresponde según la clasificación de la placenta previa?

Respuestas:

- Implantación baja de placenta.

- Placenta previa marginal.
- Placenta previa parcial.
- Placenta previa central.

De las siguientes opciones, seleccione las que corresponden a medidas de control administrativo para el manejo de la tuberculosis:

1. Minimizar el uso de procedimientos que induzcan la tos en afectados.
2. Se recomienda la utilización de respiradores o mascarillas N95 con protección.
3. Salas de espera en la consulta externa sean abiertas y bien ventiladas.
4. Elaborar un plan de control de infecciones en el establecimiento de salud.
5. Se recomienda como medida general reforzar la importancia del lavado de manos.
6. Se recomienda que los contactos sean entrevistados por el personal de salud.
7. Se recomienda promover el tratamiento ambulatorio de la TB.

Respuestas:

- 3, 4, 7
- 1, 5, 6
- 2, 4, 5
- 4, 6, 7

En la comunidad, la enfermera utiliza varios instrumentos de abordaje familiar. ¿Cuál de la siguientes alternativas evalúa el funcionamiento de la familia?

Respuestas:

- **Apgar familiar**
- Familiograma
- Mapeo de Actores
- Ecomapa

Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, acude al centro de salud para el control de rutina; durante la visita el médico decide cambiar su medicación habitual por Diltiazem 60mg cada 12 horas. ¿A qué grupo farmacológico pertenece el medicamento prescrito?.

Respuestas:

- **Antagonistas de los canales de calcio.**
- Bloqueantes beta adrenérgicos.
- Inhibidores enzima convertidora de angiotensina
- Antagonistas de los receptores de aldosterona

¿Cuál es el periodo de ayuno preoperatorio al que debe someterse un niño de 4 meses que recibe lactancia materna?

Respuestas:

- **4 horas.**
- 2 horas.
- 6 horas.
- 1 hora.

La paciente NN es asmática y fumadora desde hace 15 años. Al realizar la Valoración como primera etapa del Proceso de Atención de Enfermería, en la necesidad de respirar normalmente según Virginia Henderson, presenta disnea, cianosis, sonidos respiratorios adventicios, produce esputo con frecuencia y tos inefectiva. ¿Cuál es el dominio alterado de la Taxonomía NANDA que usted debe identificar previo a la construcción del diagnóstico de Enfermería con formato PES?

Respuestas:

- **Dominio Seguridad/protección.**
- Dominio Confort.
- Dominio Principios vitales.
- Dominio Percepción/cognición.

Una paciente cursa embarazo de 36 semanas, acude a consulta médica por presentar metrorragias escasas con sangre oscura y coágulos, con dolor abdominal continuo e intenso. Para aplicar el proceso de atención de enfermería es necesario conocer la patología con la que guarda relación estos signos y síntomas. ¿A qué patología corresponde?

Respuestas:

- **Desprendimiento placenta normo inserta.**
- Placenta previa.
- Amenaza de aborto.
- Enfermedad trofoblástica gestacional.



La preeclampsia incrementa la mortalidad materna y perinatal con un mayor riesgo de eventos potencialmente mortales. Por esta razón se hace necesario la identificación oportuna de los factores de riesgos. ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a factores de riesgo alto para desarrollar preeclampsia?

Respuestas:

- **Mujer con enfermedad renal crónica y Diabetes Mellitus.**
- Mujer adolescente y primigesta.
- Mujer con intervalo intergenésico mayor a 10 años e infección de las vías urinarias.
- Mujer obesa de 40 años de edad.

Relacione las vías de administración con las características del proceso de absorción que corresponda:

Vías de administración	Características del proceso de absorción
1. Vía oral.	a. La superficie de absorción es altamente vascularizada.
2. Vía sublingual.	b. Se absorbe a través de los capilares sanguíneos.
3. Vía intramuscular.	c. Superficie de absorción extensa, debido al grosor de la capa mucosa.
4. Vía subcutánea.	d. Escasa vascularización y su absorción es más lenta.

Respuestas:

- **1c, 2a, 3b, 4d.**
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1b, 2c, 3d, 4a.
- 1d, 2a, 3c, 4b.



La teorizante que permite desarrollar una relación interpersonal entre el paciente y el profesional de enfermería es:

Respuestas:

- **Hildegard Peplau.**
- Dorotea Orem.
- Virgia Henderson.
- Nola Pender.

Para medir la calidad y seguridad de la atención de enfermería y controlar las infecciones asociadas a la atención de salud, se utilizan instrumentos para recolectar la información, uno de ellos son las listas de cotejo. Identifique los propósitos de este instrumento:

Respuestas:

- **Facilitar la agrupación de datos, registrar eventos, comparar el logro de objetivos.**
- Definición de objetivos, aplicación de la matriz FODA, diagrama de Gantt.
- Liderazgo participativo, toma de decisiones, motivación y coordinación de actividades.
- Control de monitoreo, evaluación de las desviaciones y medidas correctivas.

Adulto mayor en la consulta de Geriatría presenta deterioro de la función cognitiva que conduce a una disminución de la memoria, cambios en el estado de ánimo y dificultad para comunicarse. Usted debe realizar una valoración del paciente. ¿Cuál es la escala que utiliza para este caso?

Respuestas:

- **Escala de Pfeiffer.**
- Escala de Katz.
- Escala de Yesavage.
- Escala de Guijón.

A un paciente se le va a realizar un test de sobrecarga oral de glucosa. ¿Cuál de las siguientes es una recomendación adecuada a la preparación del paciente para el test?

Respuestas:

- En los 2 o 3 días anteriores a la prueba debe efectuar una ingesta normocalórica con un aporte diario superior a 150 gr de hidratos de carbono.

- Indicar al paciente que ingiera algún alimento rico en hidratos de carbono mientras se realiza la prueba.

- Durante los 3 días previos a la prueba deberá abstenerse de ingerir todo tipo de hidratos de carbono.

- Se indica al paciente que se administre ciertos fármacos como corticoides, diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos y algunos antihipertensivos.

La clasificación básica y práctica divide a la hipertensión del embarazo en 4 categorías. Señale cuáles son las correctas:

1. Hipotensión Arterial.
2. Preeclampsia – Eclampsia.
3. Hipertensión con Signos de Alarma.
4. Hipertensión Crónica con Preeclampsia Sobre Añadida.
5. Síndrome de Hellp.
6. Hipertensión Gestacional.
7. Hipertensión Crónica.
8. Trastorno Hipertensivo.

Respuestas:

- 2, 4, 6, 7

- 2, 3, 5, 7

- 1, 4, 6, 8

- 2, 3, 5, 8



Sujeto de cuidado femenino de 76 años, que llega al servicio de neurología manifestando que hace 2 meses le aparecieron movimientos involuntarios, repentinos e impredecibles como cierre y apertura de las manos y flexión y extensión de los pies, los cuales no tienen un ritmo específico y desaparecen durante el sueño y aumentan las preocupaciones del hogar. Hace 15 días percibe otras molestias como la protrusión de los labios como si lanzara besos; hace tres días refiere que emergieron movimientos violentos e involuntarios en el brazo y pierna derecha con dolores musculares y articulares, por lo que decide consultar. ¿Cuáles de las manifestaciones clínicas son tipificadas como subjetivas?

Respuestas:

- **Mialgias intensas y artralgias.**

- Temblores en extremidades con hemibalismo derecho.
- Movimientos coreicos en extremidades y monobalismo superior derecho.
- Protrusión de la comisura labial y mialgias intensas.

Ingresa al servicio de quemados un paciente con lesiones térmicas producida por el derrame de líquido caliente según refiere. En la valoración, se identifica una quemadura de tercer grado en tórax anterior y posterior con una superficie corporal quemada del 36%. ¿Cuál es la principal intervención de enfermería en este caso?

Respuestas:

- **Vigilar la reanimación de líquidos y control de gasto urinario.**

- Establecer una vía aérea y la ventilación del paciente.
- Valorar el nivel de conciencia y control de signos de alarma.
- Controlar la gasometría arterial y monitorización cardíaca.

De las siguientes técnicas de muestreo, seleccione aquella que se utiliza cuando la población es muy grande y dispersa:

Respuestas:

- **Conglomerado.**

- Aleatorio simple.
- Estratificado.
- Aleatorio sistemático.



La hiperbilirrubinemia es una patología que los recién nacidos desarrollan durante las primeras semanas de vida, entre las causas hemolíticas tenemos:

- a. Enfermedad hemolítica ABO.**
- b. Incompatibilidad RH.**
- c. Hipoglicemia.**
- d. Sepsis.**
- e. STORCH.**
- f. Diabetes gestacional.**

Respuestas:

- a, b, d, e.

- a, b, c, d.
- b, c, d, e.
- b, d, e, f.

Paciente de 65 años que presenta en los últimos meses intolerancia al frío, está más estreñida de lo habitual y se encuentra muy cansada. Su voz es ronca. En la exploración física llama la atención la presencia de edema palpebral. Considerando estos datos. ¿Cuál es el diagnóstico probable?

Respuestas:

- Hipotiroidismo.

- Hipertiroidismo.
- Hipoparatiroidismo.
- Enfermedad de Addison.

Al realizar una visita domiciliar se encuentra con una familia conformada por los dos padres y sus tres hijos: Juan de 5 años, Alberto de 15 y María de 20 años quién en ese momento se encontraba de visita con su pequeño hijo. Señale como clasificaría a esta familia de acuerdo a la etapa del ciclo vital familiar por el que atraviesa:

Respuestas:

- Familia en contracción.

- Familia en formación.
- Familia en extensión.
- Familia en disolución.



Paciente ingresa a emergencia producto de un accidente de tránsito, en la evaluación primaria se determina un Glasgow de 10/15, disnea, diaforesis, aleteo nasal, un patrón respiratorio anormal, para su manejo solicitan una gasometría arterial y los resultados encontrados son valores de PO₂ 40mmHg hipoxemia, PaCO₂ de 50 mmHg hipercapnia; por consiguiente, se identifica un deterioro en la ventilación perfusión. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería a la que hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- **Deterioro del intercambio de gases.**
- Deterioro de la ventilación espontánea.
- Patrón respiratorio ineficaz.
- Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.

Seleccione la fundamentación para la técnica de aplicación del calor:

Respuestas:

- **Acelerar la absorción de exudados acumulados en una zona.**
- Aliviar los espasmos musculares secundarias a lesión articular.
- Reducir el metabolismo basal.
- Lograr una anestesia local.

Dentro de los cambios fisiológicos en la mujer, y el apareamiento de caracteres sexuales secundarios. ¿A qué se denomina el desarrollo del vello púbico y un año después el inicio del crecimiento del vello axilar?

Respuestas:

- **Adrenarquia**
- Telarquia
- Menarquia
- Pubarquia



En el Programa de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis se contempla el tratamiento preventivo con isoniácida (TPI) para las personas que han sido contactos de pacientes tuberculosos. ¿Cuál es la dosis recomendada de éste fármaco en pacientes adultos?

Respuestas:

- 5 mg/kg/día (máximo 300 mg al día)
- 8 mg/kg/día (máximo 320 mg al día)
- 10 mg/kg/día (máximo 300 mg al día)
- 15mg/kg/día (máximo 350 mg al día)

¿Cuál es la manifestación clínica tardía de la neumonía bacteriana?

Respuestas:

- **Cianosis.**
- Fiebre.
- Tos.
- Disnea.

La Modalidad de Atención Integral del MAIS -FCI, que comprende todos los servicios de salvamento, atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados corresponde a:

Respuestas:

- **Atención prehospitalaria.**
- Atención extramural.
- Atención en un establecimiento de salud.
- Atención en establecimientos móviles de salud.

Seleccione los factores causales de los efectos adversos que afectan la cultura de seguridad en los servicios de salud:

Respuestas:

- **Comunicación deficiente, incorrecta ejecución de procedimientos, turnos excesivos.**
- Estados del paciente, funcionamiento deficiente de equipos, ambiente desfavorable.
- Escases de materiales hospitalarios, personal no profesional, poco mantenimiento.
- Co-morbilidad del paciente, poca tecnología de equipos, desmotivación del personal.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a una investigación con función de temporalidad retrospectiva?

Respuestas:

- **El inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados.**

- Los datos se obtienen al inicio de la investigación, cuando aún no han aparecido los efectos.
- Se asigna un factor de estudio, el cual es controlado para la realización de la investigación.
- Cuando el investigador se limita a observar sin intervenir en el suceso.

Sujeto de cuidado masculino de 33 años, con antecedentes de hipertensión arterial, acude a consulta externa para su valoración nutricional, para lo cual los profesionales de enfermería miden su antropometría, remitiendo los siguientes datos: IMC: 30.8, Perímetro de cintura: 105cm y Circunferencia de la Cadera: 73cm. ¿Cuáles son los resultados de la valoración nutricional reflejados en el sujeto?

Respuestas:

- **Se evidencia una obesidad clase I, distribución de grasa tipo androide y riesgo de morbilidad cardiovascular.**

- Se evidencia una obesidad clase III, distribución de grasa tipo androide y riesgo de morbilidad cardiovascular.
- Se evidencia una obesidad clase II, distribución de grasa tipo androide y no existe riesgo de morbilidad cardiovascular.
- Se evidencia una obesidad clase I, distribución de grasa tipo ginoide y riesgo de morbilidad cardiovascular.

Es un instrumento esencial del MAIS-FCI que nos permite vigilar el estado de salud de la población sus necesidades y desarrollar las mejores políticas de salud para garantizar la prestación de servicios sanitarios. Tiene dos objetivos fundamentales: medir de las condiciones de vida y los determinantes sociales de salud. ¿A qué instrumento estamos haciendo referencia?

Respuestas:

- **Ficha familiar.**

- Visita domiciliaria.
- Sala situacional.
- Mapa parlante.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Seleccione las variables que debe considerar para el manejo de la escala de riesgo de caída de MORSE:

1. Estado mental.
2. Edad.
3. Ayuda para deambular.
4. Venoclisis.
5. Antecedentes.
6. Marcha.

Respuestas:

- **1, 3, 4, 6**
- 1, 2, 5, 6
- 2, 3, 4, 6
- 1, 2, 4, 5

Paciente con diagnóstico de Bronquitis permanece con oxigenoterapia por mascarilla. Durante el turno de la mañana presenta secreciones en abundante cantidad, una de sus intervenciones es realizar examen físico como: auscultación del tórax donde se identifica sonidos fuertes, de tono bajo, retumbantes que se escuchan durante la espiración en campos pulmonares. ¿Cuál es el ruido adventicio que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Roncus.**
- Crepitantes.
- Sibilancias.
- Estertores.



Una señora acude al centro de salud con su hijo de 10 m 15 días de edad, por control de niño sano, sus signos vitales son: temperatura 37.3 °C; frecuencia cardiaca: 120 /min; presión arterial; 90/62 mmHg; frecuencia respiratoria 40/min, al observar el carnet de vacunación, verifica que tiene administrada las siguientes vacunas: pentavalente 3 dosis, Polio 0 dosis, Neumococo 3 dosis y Rotavirus 2 dosis. ¿Qué acción de enfermería aplicaría en este caso?

Respuestas:

- **Administrar la 1° dosis de fIPV.**

- Administrar la dosis completa de 0,5ml de fIPV IM.
- Administrar la 1° dosis de bOPV.
- Administrar la 1° dosis de bOPV y la 2ª las 2 semanas.

De las siguientes acciones a seguir en la identificación de un sintomático respiratorio. ¿Cuál de ellas no corresponde?

Respuestas:

- **Conservar las muestras en caja de cartón, protegidas de la luz solar o calor excesivo.**

- Detectar al sintomático respiratorio en forma permanente durante todo el horario de atención.
- Obtener dos muestras de esputo en 24 horas, siendo una de ellas matutina.
- Observar a través del envase la calidad y cantidad de la muestra obtenida.

En el centro de salud que está realizando su año de salud rural debe aplicar el componente de provisión de servicios del MAIS-FCI con la herramienta de la visita domiciliaria; usted prioriza la visita a un niño menor de 1 mes. ¿Qué criterio de priorización de la visita domiciliaria está aplicando?

Respuestas:

- **Demográfico.**

- Epidemiológico.
- Administrativo.
- Socioeconómico.

En la guía de Atención del trabajo de parto, parto y posparto inmediato, el Ministerio de Salud Pública ha indicado que se debe restringir el número de tactos vaginales a:

Respuestas:

- **1 cada 4 horas hasta el término de la labor**

- 1 cada hora hasta que la dilatación sea 6cm de dilatación, luego 1 cada media hora hasta que se encuentre con 10 cm de dilatación y 100% de borramiento.
- Cada 2 horas mientras está en fase de dilatación y luego a discreción del médico.
- Preferible no hacer más de 1 tacto durante la labor de parto.

Paciente masculino de 58 años con antecedentes de infarto agudo del miocardio hace 35 días, el cual va a ser intervenido de apendicitis aguda. Según la American Society of Anesthesiologists (ASA). ¿Cuál es la clasificación que le corresponde a este paciente?

Respuestas:

- **ASA 4**

- ASA 1
- ASA 2
- ASA 3

Identifique el efecto que produce la aplicación del frío.

Respuestas:

- **Reduce la hemorragia.**

- Reduce la vasoconstricción.
- Aumenta el flujo sanguíneo.
- Aumenta el suministro de oxígeno a los tejidos.

Paciente de 10 años con diagnóstico de neumonía bacteriana que requiere administración de oxígeno a una concentración de 28 %. ¿Qué dispositivo emplea en este caso?

Respuestas:

- **Catéter nasal.**

- Máscara facial simple.
- Máscara con reciclador parcial.
- Máscara sin reciclador.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



En sala de partos nace un recién nacido prematuro con dificultad respiratoria por déficit de surfactante, presenta una palidez periférica (cianosis), el médico le indica al profesional en enfermería de guardia que realice la valoración aplicando la escala de DOWNES. ¿Qué parámetros mide la escala de Downes?

Respuestas:

- Frecuencia respiratoria, cianosis central, entrada de aire, quejido espiratorio, retracciones subcostal o subxifoideas

- Frecuencia respiratoria, cianosis distal, entrada de aire, quejido respiratorio, llanto fuerte.
- Frecuencia cardíaca, cianosis central, entrada de aire, quejido espiratorio, retracciones subcostal o subxifoideas.
- Frecuencia respiratoria, cianosis central, entrada de aire, actividad física, retracciones subcostal o subxifoideas.

¿Cuál de los siguientes enunciados se acerca más a la definición de la Carta de Ottawa sobre Promoción de la Salud?

Respuestas:

- Proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma.

- Proporcionar condiciones para generar un cambio del entorno físico y socio-económico de la población.
- Proporcionar educación sanitaria para prevenir enfermedades crónicas.
- Promocionar solamente un cambio de comportamiento individual.

Sujeto de cuidado que laboró durante 20 años como operario en la industria cementera y desde hace aproximadamente 3 años manifiesta cuadro clínico caracterizado por disnea, tos irritativa y estertores secos; en su visita al médico ocupacional se le diagnóstica neumoconiosis por asbesto. ¿Qué teoría explica este tipo de cambio en el proceso salud y enfermedad?

Respuestas:

- Florence Nightingale.

- Virginia Henderson.
- Dorothea Orem.
- Nola Pender.

En el Programa de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis (TB), es importante considerar los pacientes con fracaso al tratamiento de primera línea. ¿Cuál es la definición correcta para este tipo de paciente?

Respuestas:

- Afectado con TB cuya baciloscopia o cultivo de esputo es positivo en el quinto mes o al finalizar el tratamiento.

- Afectado con TB que muere por cualquier razón antes de comenzar el tratamiento o durante el curso del mismo.
- Afectado con TB que no inició el tratamiento o lo interrumpió durante un mes o más.
- Afectado con TB a quien no se le ha asignado el resultado del tratamiento. Incluye los transferidos a otra unidad.

Seleccione los síndromes geriátricos:

- 1. Pérdida de la densidad ósea.**
- 2. Incontinencia urinaria.**
- 3. Reducción de la motilidad gastrointestinal.**
- 4. Alteración de la movilidad.**
- 5. Disminución de la grasa subcutánea.**
- 6. Aumento de la susceptibilidad a infecciones.**

Respuestas:

- 2, 4, 6**
- 1, 3, 5
- 2, 3, 5
- 1, 4, 6



Paciente de 37 años, a la valoración de enfermería se detecta disnea, inquietud, confusión, letargo, arritmias, los resultados de la gasometría reportan: pH 7.25, PaCO₂ 56 mmHg. Señale el trastorno de la gasometría arterial:

Respuestas:

- **Acidosis respiratoria.**

- Alcalosis respiratoria.
- Acidosis metabólica.
- Alcalosis metabólica.

Seleccione los criterios para predecir la gravedad de la pancreatitis dentro de las siguientes 48h luego de la admisión hospitalaria.

1. Descenso del hematocrito mayor del 10 %
2. Hemoglobina de 13 mg/dL
3. PO₂ menos de 60 mm Hg
4. Calcio sérico mayor de 10 mg/dL
5. PO₂ mayor de 75mm Hg
6. Nitrógeno ureico en sangre mayor de 5mg/dL

Respuestas:

- **1, 3, 6**

- 2, 4, 6
- 1, 2, 5
- 3, 4, 5

En una gasometría arterial de un paciente de 37 años. ¿Qué trastorno se pone de manifiesto teniendo en cuenta los siguientes resultados: pH 7.50, PaCO₂ 40 mmHg, HCO₃ 28 mEq/L?

Respuestas:

- **Alcalosis metabólica.**

- Acidosis metabólica.
- Alcalosis respiratoria.
- Acidosis respiratoria.



¿Cuál de las siguientes condiciones constituye una causa prerrenal de la insuficiencia renal aguda?

Respuestas:

- **Hemorragia.**
- Cálculos.
- Pielonefritis.
- Glomerulonefritis.



Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Seleccione las medidas de control administrativo en el primer nivel de atención con respecto a la Guía clínica de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis 2018:

1. Realizar la búsqueda permanente de sintomáticos respiratorios en todas las áreas y servicios de los establecimientos de salud.

2. Se recomienda el uso de respiradores N95 en personal de salud, administrativo, vigilancia y seguridad, así como visitas y acompañantes.

3. Las salas de espera en la consulta externa deben ser abiertas y bien ventiladas.

4. El momento de ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.

5. Evitar la circulación de personas con TB bacteriológicamente positiva fuera de sus habitaciones.

6. Elaborar un plan de control de infecciones en el establecimiento de salud.

7. El talento humano en salud con algún tipo de inmunodepresión no sea asignado a áreas de alto riesgo de contagio de TB.

Respuestas:

- 1, 3, 4, 6, 7

- 1, 2, 3, 4, 5

- 1, 4, 5, 6, 7

- 1, 2, 4, 5, 6



¿Qué instrumento se utiliza para detectar el grado de funcionalidad (o disfunción) de la familia?

Respuestas:

- **Apgar familiar.**
- Visita domiciliaria.
- Familiograma.
- Ficha familiar.

Usted como líder de servicio de Urgencias, al presentarse algún evento adverso realiza la notificación, independientemente de su tipología y gravedad. ¿Cuál es la característica, de los sistemas de notificación de eventos adversos, que está aplicando?

Respuestas:

- **Capacidad de respuesta.**
- Orientación sistémica.
- Análisis por expertos.
- Independiente.

En el control prenatal, para reducir las complicaciones materno neonatales, se deben identificar los factores de riesgo obstétrico modificables y no modificables. ¿Cuál es no modificable?

Respuestas:

- **Endocrinopatía controlada.**
- Síntomas neurovegetativos.
- Bacteriuria asintomática.
- Control insuficiente de la gestación.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



La sala para la recepción del Recién Nacido es de suma importancia para el bienestar del neonato. ¿Cuál es el equipamiento de esta sala durante el parto culturalmente adecuado?

- a. Calor producido por calefactores, estufas o chimeneas (tomando en cuenta las regiones del país y condiciones de la unidad operativa).
- b. Cuna de calor radiante y monitor previamente calibrado.
- c. Camilla o silla adecuada para el parto vertical.
- d. Incubadora previamente calibrada con temperatura adecuada.
- e. Una colchoneta o estera en el piso, cubierta con campos sobre los cuáles nacerá el bebé.
- f. Instrumental limpio colocado en un área adecuada para evitar contaminación.

Respuestas:

- **a, c, e, f.**

- a, b, d, e.

- b, c, d, e.

- b, d, e, f.

Paciente adulto mayor con antecedentes de diabetes presenta a la valoración de enfermería déficit de movimiento de hemitórax del lado derecho. Señale con qué patología se puede asociar para gestionar los cuidados enfermeros:

Respuestas:

- **Demencia vascular.**

- Demencia senil.

- Parkinson.

- Delirio.

¿Cuál es el signo más temprano que evidencia aumento de la presión intracraneal (PIC)?

Respuestas:

- **Cambio en el nivel del estado de conciencia.**

- Respuestas motoras anormales.

- Cambios pupilares (pupilas dilatadas y fijas).

- Alteración o ausencia de la respiración.



En un programa de salud, la característica que refleja los resultados esperados tras su implantación corresponde a:

Respuestas:

- Prospectividad.

- Flexibilidad y dinamismo.
- Sistemática.
- Creatividad.

Paciente de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, acude al hospital por presentar cefalea de moderada intensidad y presión arterial de 170/110mmHg, como causa aparente conflictos familiares. Además, indica dificultad para seguir con el tratamiento prescrito por el médico. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- Gestión ineficaz de la salud.

- Mantenimiento ineficaz de la salud.
- Protección ineficaz.
- Síndrome de fragilidad del anciano.

Paciente de 42 años de sexo masculino, acude a la unidad de atención de salud con dolor en la zona lumbar de 10 semanas de evolución, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con irradiación a ambas piernas, que compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias, con limitación funcional que le dificultan sus actividades diarias. ¿Qué tipo de dolor tendría este paciente?

Respuestas:

- Dolor lumbar subagudo.

- Dolor lumbar específico.
- Dolor lumbar inespecífico.
- Dolor lumbar agudo.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

¿Qué recomendación se debe tener en cuenta en la toma de la tensión arterial en pacientes en estado de gestación con trastornos hipertensivos?

Respuestas:

- **Tomar la tensión arterial en decúbito lateral izquierdo.**
- Usar brazaletes pequeños.
- Registrar la lectura más baja de tensión arterial tomada en ambos brazos.
- Tomar la tensión arterial en decúbito supino.

¿Cómo se denomina el fenómeno epidemiológico que expresa la prevalencia usual de una enfermedad, en particular en una zona geográfica?

Respuestas:

- **Endemia.**
- Pandemia.
- Brote epidémico.
- Epidemia.

Con relación al electroencefalograma. Señale el enunciado correcto:

Respuestas:

- **Es útil para el diagnóstico y evaluación de trastornos convulsivos.**
- Ayuda a distinguir la debilidad por neuropatía o la resultante de otras causas.
- Se utiliza para identificar la presencia de circulación colateral cerebral.
- Registra la velocidad del flujo sanguíneo de los vasos intracraneales.

¿Cuál de los siguientes medicamentos empleados en el tratamiento de los trastornos tiroideos, es considerado un medicamento LASA (Like alike - Sound alike)?

Respuestas:

- **Metimazol.**
- Liotironina.
- Levotiroxina.
- Propiltiuracilo.



Qué siglas le corresponden a un recién nacido de 39 semanas de gestación, con peso de 1500 gr?

Respuestas:

- **RNAT - PMBN**
- RNAT - PAEG
- RNAT - PEEG
- RNAT- PBED

¿Cuál es la ubicación del foco aórtico en la auscultación cardíaca?

Respuestas:

- **Segundo espacio intercostal derecho, borde externo derecho.**
- Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio claviclar.
- Segundo espacio intercostal izquierdo, borde externo izquierdo.
- Cuarto espacio intercostal izquierdo, borde externo izquierdo.

Seleccione los elementos que constituyen el Componente de Provisión de Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud:

1. Niveles de atención; homologación y tipología de establecimientos de salud.
2. Grupos de población a quienes se entregará la atención.
3. Herramientas de diagnóstico y monitoreo de las condiciones de salud.
4. Conjunto de prestaciones por ciclos de vida.
5. Organización territorial y funcionamiento de la Red Pública y complementaria.
6. Escenarios y modalidades de atención.
7. Estrategias y herramientas para brindar prestaciones integrales de salud.

Respuestas:

- **2, 4, 6, 7**
- 2, 3, 5, 6
- 1, 5, 6, 7
- 1, 3, 4, 6



Durante su turno un paciente con diagnóstico de cáncer de colon, permanece álgido con dolor 10/10 en escala de EVA, el médico para su tratamiento prescribe Fentanilo; sin embargo, al momento de la administración usted observa que presenta intoxicación asociada al fármaco. ¿Cuál es el antídoto que debe preparar para revertir la acción del medicamento?

Respuestas:

- **Naloxana.**
- Flumazenil.
- N-Acetilcisteína.
- Vitamina K.

Usted planifica una visita domiciliaria a una comunidad donde se identifica problemas de desnutrición en niños menores de 5 años en una zona urbano-marginal. Como personal de enfermería debe realizar un plan de cuidados. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería principal que usted utiliza en este caso?

Respuestas:

- **Salud deficiente de la comunidad.**
- Gestión ineficaz de la salud familiar.
- Mantenimiento ineficaz de la salud.
- Disposición para mejorar la gestión de la salud.

Cuando los receptores cutáneos de un recién nacido perciben una baja en la temperatura ambiente, el sistema nervioso simpático se activa y se produce calor utilizando las reservas del tejido adiposo pardo, este mecanismo se conoce como:

Respuestas:

- **Lipólisis de grasa.**
- Conducción.
- Evaporación.
- Convección.



Paciente de 57 años ingresa a emergencia luego de sufrir caída de una altura de 2 metros. A la valoración, tiene apertura ocular al llamado, al preguntarle su nombre la respuesta es confusa y localiza el dolor. De acuerdo a la escala de Glasgow. ¿Cuál es la puntuación que alcanza el paciente?

Respuestas:

- **Glasgow 12/15**

- Glasgow 14/15

- Glasgow 11/15

- Glasgow 10/15

Paciente con antecedentes de diabetes, acude al hospital por presentar un cuadro de deshidratación con presencia de náuseas y vómito por varias ocasiones. Para el diagnóstico se requiere la medición de gases en sangre arterial, donde se reporta una acidosis metabólica. ¿Qué valores determina esta alteración?

Respuestas:

- **PH=7,15, PaCO₂= 20, HCO₃= 14**

- PH=7,56, PaCO₂= 45, HCO₃= 27

- PH= 7,50, PaCO₂= 24, HCO₃= 10

- PH = 7,10, PaCO₂ = 50, HCO₃ = 28

A la valoración de enfermería usted identifica un paciente adulto mayor que presenta pérdida de firmeza en la piel, disminución de la capacidad visual y deterioro celular, lo que afecta su salud y bienestar. ¿Cuál es la teoría de envejecimiento que hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- **Teoría estocástica.**

- Teoría no estocástica.

- Teoría de la desvinculación.

- Teoría de la actividad.



Complete el enunciado:

Al atender un paciente con Tuberculosis Pulmonar, entre las medidas a tomar se encuentran las precauciones respecto a la transmisión _____, las cuales se usan en pacientes con enfermedades que se transmiten mediante partículas _____. En éste caso se recomienda el uso de _____.

Respuestas:

- **aérea – menores de 5 μ m – mascarilla N95**
- gotas – mayores de 5 μ m – mascarilla quirúrgica
- aérea – mayores de 5 μ m – mascarilla N95
- gotas – menores de 5 μ m – mascarilla quirúrgica

Un alto grado de participación es la clave de lograr retrasar las consecuencias del declive por el envejecimiento. ¿A qué teoría del envejecimiento corresponde?

Respuestas:

- **De la actividad.**
- Del reloj biológico.
- De los radicales libres.
- Genética.



Seleccione las características de la Diabetes Mellitus tipo 1:

- 1. Disminución de la insulina endógena.**
- 2. Mayor incidencia en niños y jóvenes.**
- 3. Las causas de la patología incluyen obesidad.**
- 4. Poca o ninguna insulina endógena.**
- 5. Los hipoglicemiantes orales pueden regular los niveles de glucosa.**
- 6. Requiere de administración de insulina externa.**

Respuestas:

- **2, 4, 6**
- 1, 3, 5
- 2, 3, 4
- 1, 5, 6

Como profesional de enfermería usted atiende a un paciente al que se le colocó sonda en T después de una intervención quirúrgica. El cirujano indica pinzar la sonda por 1 hora antes y después de los alimentos. ¿Cuál es el objetivo de esta indicación?

Respuestas:

- **Favorecer la digestión.**
- Detectar obstrucción del flujo biliar.
- Vaciar el contenido de bilis.
- Evitar que acumule líquidos.



¿Cuál es el valor de plaquetas que indica que el paciente se encuentra en riesgo de hemorragia?

Respuestas:

- **19000 por milímetro cúbico.**
- 100000 por milímetro cúbico.
- 75000 por milímetro cúbico.
- 50000 por milímetro cúbico.

¿Cuál es la sanción a quien incurra en homicidio culposo por mala práctica profesional según el Artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador?

Respuestas:

- **De 1 a 3 años con pena privativa de libertad.**
- De 3 a 5 años con pena privativa de libertad.
- De 1 a 2 años con pena privativa de libertad.
- De 2 a 3 años con pena privativa de libertad.

Según prescripción médica le piden administrar Morfina 10 mg intravenoso. Ordene los cuidados de enfermería que se debe tomar en cuenta en la administración.

1. Diluir el medicamento antes de la administración.
2. Controlar el patrón respiratorio.
3. Valorar la acción analgésica del fármaco.
4. Controlar la velocidad en la administración del fármaco.
5. Controlar náuseas y vómitos por efectos adversos.

Respuestas:

- **2, 1, 4, 5, 3**
- 1, 2, 3, 5, 4
- 3, 4, 5, 1, 2
- 2, 1, 3, 4, 5



Como profesional de enfermería, es necesario que usted conozca los tipos de prácticas seguras en la atención de salud. Las prácticas establecidas para la seguridad del paciente-usuario son: prácticas seguras administrativas, prácticas seguras asistenciales, prácticas seguras administrativas - asistenciales. ¿Cuál es el procedimiento que se relaciona a la práctica segura administrativa?

Respuestas:

- **Identificación correcta del paciente.**

- Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo.
- Conciliación de medicamentos.
- Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente.

Seleccione los cuidados de enfermería posoperatorio inmediato en cesárea:

1. **Administrar antiinflamatorios no esteroideos post-cesárea.**
2. **Retirar el apósito 24 horas después de la cesárea.**
3. **Monitoreo específico para la fiebre.**
4. **Controlar la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial.**
5. **Evaluar la herida para detectar señales de infección.**
6. **Control del sangrado, cada media hora durante 2 horas.**
7. **Limpiar suavemente y secar la herida diariamente.**

Respuestas:

- **2, 3, 5, 7**

- 1, 2, 4, 5

- 3, 4, 5, 6

- 3, 1, 6, 7

Seleccione las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca:

1. Disminución de la tolerancia a la actividad.

2. Dolor torácico de inicio súbito.

3. Disnea durante el ejercicio.

4. Arritmias.

5. Ortopnea.

6. Piel pálida y diaforética.

Respuestas:

- 1, 3, 5
- 2, 4, 5
- 1, 4, 6
- 4, 5, 6



Seleccione las manifestaciones clínicas de la neumonía:

1. Dolor torácico.
2. Tos con expectoración por más de 15 días.
3. Taquipnea.
4. Sudoración nocturna.
5. Uso de músculos accesorios en la respiración.
6. Secreción nasal purulenta.

Respuestas:

- 1, 3, 5
- 2, 4, 6
- 1, 2, 4
- 3, 5, 6

Seleccione el período de tiempo en que un termo (para el transporte de vacunas) sin destapar, mantiene la temperatura entre +2°C a +8°C, según la distancia, la cantidad de biológico y la capacidad del termo.

Según la distancia, la cantidad de biológico y la capacidad del termo (para el transporte de vacunas). ¿Qué periodo de tiempo mantiene el termo, sin destapar, la temperatura entre +2°C a +8°C?

Respuestas:

- 72 horas.
- 36 horas.
- 24 horas.
- 48 horas.

Entre los factores extrínsecos del riesgo de caídas en los adultos mayores se encuentran:

Respuestas:

- **Calzado inadecuado, caminar en medias, inestabilidad del terreno.**
- Alteración del equilibrio, deterioro de la memoria.
- Disminución de la función muscular, utilización inadecuada de bastones.
- Deterioro auditivo y visual, disminución del estado de alerta.

Seleccione y ordene de forma secuencial los pasos para realizar la revisión bibliográfica en un proyecto de investigación:

1. Utilización de fuentes primarias.
2. Preparación de la revisión.
3. Comprensión de la información.
4. Realización de la búsqueda.
5. Procesamiento de la bibliografía.
6. Utilización de tecnologías informáticas.
7. Redacción de la revisión bibliográfica.

Respuestas:

- **2, 4, 5, 7**
- 1, 2, 5, 3
- 1, 4, 5, 7
- 2, 5, 6, 3



Paciente de 64 años, que llega a Emergencias con Glasgow 9/15, la familia refiere que hace 3 días se le diagnosticó una infección urinaria y que en el día anterior comenzó con dolor abdominal y vómitos. Al examen físico se evidencia deshidratación, respiración de Kussmaul y aliento a fruta. Al ingreso presenta los signos vitales: TA= 90/50 mmhg, FC= 122 por minuto, R=32 respiraciones por minuto, T= 35,8°C, Diuresis =4ml/kg/hora. Los resultados de laboratorios arrojaron una glucemia de 356 mg/dl, Cetonemia y una Gasometría arterial con los siguientes resultados: Ph=7,12, PaCO₂=25mmhg, PaO₂ = 84 mmhg, HCO₃=8 meq/L, EB= (-6,2), SaO₂=94%. ¿Qué desequilibrio ácido-básico presenta el paciente?

Respuestas:

- **Acidosis metabólica.**
- Alcalosis metabólica.
- Acidosis respiratoria.
- Alcalosis respiratoria.

En visita domiciliaria a familia extendida integrada por 15 personas, todas las generaciones han padecido de cáncer, y algunos han muerto por diabetes, viven en condiciones sanitarias inadecuadas y no asisten al centro de salud para el control médico regular. Señale el criterio de selección aplicado en la visita domiciliaria descrita:

Respuestas:

- **Epidemiológico.**
- Demográfico.
- Socioeconómico.
- Administrativo.

Paciente de 8 años ingresa a emergencia acompañada de su madre la cual refiere que presenta fiebre, dolor de garganta y malestar general, a la valoración de enfermería se reporta al familiar que la niña se encuentra sana y que no presenta la sintomatología mencionada, por lo que la madre se siente inconforme y solicita una nueva valoración. ¿Cuál es la barrera de comunicación que se presenta en el caso?

Respuestas:

- **Desafío.**
- Sondeo.
- Estereotipía.
- Comprobación.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Relacione las alteraciones de la frecuencia respiratoria con sus características.

Alteraciones	Características
1. Hiperpnea	a. Aumento gradual seguido de una disminución gradual con periodo de apnea.
2. Cheyne-Stokes	b. Respiraciones de igual profundidad seguidas por un periodo de apnea.
3. Biot	c. Movimientos respiratorios rápidos y profundos. Se produce por alteraciones metabólicas.

Respuestas:

- 1c, 2a, 3b.
- 1a, 2b, 3c.
- 1b, 2c, 3a.
- 1c, 2b, 3a.

Paciente que durante su turno presenta deterioro neurológico, al preguntarle su nombre responde con palabras inapropiadas, sus extremidades se mantienen en extensión y a la apertura ocular solo al llamado. De acuerdo a la escala de Glasgow, usted debe reportar al paciente con esta alteración en su estado de conciencia. ¿Cuál es la puntuación que alcanza el paciente?

Respuestas:

- Glasgow 8/15
- Glasgow 9/15
- Glasgow 10/15
- Glasgow 7/15

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Seleccione los criterios de complejidad que usted como profesional de enfermería de APS debe considerar para la atención de salud como gestor de casos:

1. Niños con patologías respiratorias leves.
2. Precisan cuidados a domicilio tras el alta hospitalaria.
3. Con morbilidad de bajo riesgo.
4. Pluripatológicos y con deterioro funcional.
5. Situaciones familiares con déficit de apoyo.
6. Control prenatal en curso adecuado.
7. En etapa final de la enfermedad.

Respuestas:

- 2, 4, 5, 7

- 1, 3, 4, 6

- 2, 5, 6, 7

- 1, 2, 4, 6

La normativa de la Autoridad Sanitaria es uno de los factores que influyen en la conformación del Equipo de Atención Integral de Salud. ¿Qué condición se incluye en este factor?

Respuestas:

- **Tipología de la unidad.**

- Ubicación rural o urbana.

- Concentración/dispersión de la población.

- Condiciones de acceso geográfico.

En el área de triage de un centro de salud, usted recibe a un niño de 21 meses y al graficar la curva de crecimiento, observa que el puntaje Z del indicador peso/talla se encuentra por debajo de -3 desviación estándar (DE). ¿A qué tipo de malnutrición hace referencia?

Respuestas:

- **Desnutrición aguda severa.**

- Desnutrición aguda moderada.

- Insuficiencia de micronutrientes.

- Desnutrición crónica.

Entre los efectos secundarios frecuentes de la quimioterapia a nivel del aparato digestivo encontramos:

Respuestas:

- **Estomatitis, mucositis, náuseas, vómito, anorexia, diarrea, estreñimiento.**
- Diarrea, estreñimiento, anemia, anorexia, anomalías del gusto, decaimiento.
- Anorexia, alopecia, estreñimiento, náuseas, vómito.
- Pérdida del apetito, anorexia, mucositis, feocromocitoma.

Según Abraham Maslow y su teoría de las necesidades humanas, describe la supervivencia y desarrollo del sujeto como un proceso de búsqueda constante de seguridad. En qué nivel de la pirámide se encuentran las necesidades de seguridad del ser humano:

Respuestas:

- **Segundo nivel.**
- Primer nivel.
- Tercer nivel.
- Cuarto nivel.

Paciente de 30 años, acude a la consulta externa para un control prenatal. La paciente cursa su primer trimestre de embarazo con 10 semanas de gestación, usted debe realizar acciones de acuerdo a las semanas de gestación. ¿Cuál es la actividad prioritaria que se recomienda durante la atención?

Respuestas:

- **Pedir que se realice una prueba de B-HCG en sangre.**
- Auscultar la frecuencia cardíaca fetal de rutina.
- Detectar signos de preeclampsia mediante toma de TA.
- Valorar signos de proteinuria en orina de 24 horas.

La enfermera de turno realiza la valoración utilizando Dominios NANDA-I a un paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), detectó una alteración en el dominio Seguridad-Protección. De los siguientes, seleccione el diagnóstico que según la NANDA-I pertenece a ese dominio:

Respuestas:

- Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con retención de secreciones manifestado por sonidos respiratorios anormales.

- Deterioro del intercambio de gases relacionado con desequilibrio en la ventilación perfusión manifestado por la disminución en el nivel de CO₂.
- Dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos manifestado por cambios en los parámetros fisiológicos.
- Riesgo de disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración de la frecuencia y ritmo cardíaco.

Como profesional de enfermería del servicio de cirugía, usted atiende un paciente que se encuentra inmóvil por temor a que su herida quirúrgica se abra, atendiendo que en una ocasión su papá fue operado y presentó esa complicación. ¿Cuál de los siguientes criterios debe ser priorizado en la valoración?

Respuestas:

- Posibilidad real de dehiscencia de herida.

- Riesgo de movilidad postoperatoria limitada.
- Ajuste emocional del paciente a la cirugía.
- Antecedentes familiares de la complicación.

¿Cuál es el elemento del código deontológico para la profesión que se pone de manifiesto cuando la enfermera mantiene la confidencial de toda información personal y utilizará la discreción al compartirla?

Respuestas:

- La enfermera y los pacientes.

- La enfermera y la práctica.
- La enfermera y la profesión.
- La enfermera y la salud global.



Señale la escala utilizada para valorar el riesgo de úlceras por presión que incluye: percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición, fricción y cizallamiento:

Respuestas:

- **Escala de Braden.**
- Escala de Norton.
- Escala de Macdems.
- Escala de Morse.

Relacione las vías de administración con sus ventajas.

Vías de administración	Ventajas.
1.Sublingual.	a. Efecto sistémico prolongado.
2.Subcutánea.	b. Segura no rompe la barrera cutánea.
3.Oral.	c. La absorción es más lenta.
4.Transdérmica.	d. Produce un efecto local.

Respuestas:

- **1d, 2c, 3b, 4a.**
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1b, 2c, 3d, 4a.
- 1c, 2d, 3a, 4b.

Paciente ingresa al servicio de Urgencias con traumatismo maxilofacial, a su llegada se evidencia obstrucción de la vía aérea por presencia de un cuerpo extraño, el paciente se mantiene letárgico, taquipneico, cianótico, disneico, a la auscultación disminución de los sonidos respiratorios lo que dificulta la permeabilidad de la vía aérea, para su intervención debe basarse en un diagnóstico enfermero centrado en el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario del acuerdo al caso?

Respuestas:

- **Limpieza ineficaz de la vía aérea.**

- Patrón respiratorio ineficaz.
- Deterioro de la ventilación espontánea.
- Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.

Paciente con antecedentes de discapacidad postraumática, acude al centro de salud por presentar ansiedad, sentimientos de tristeza y además indica pérdida de interés por su familia en los últimos meses. Usted debe brindarle una atención integral utilizando un modelo de enfermería. ¿Cuál es la teorizante que aplicaría en este caso?

Respuestas:

- **Dorothea Orem.**

- Nola Pender.
- Jean Watson.
- Virginia Henderson.

Recién nacido que al minuto de su nacimiento presenta llanto débil, tiene alteraciones en la frecuencia respiratoria, manos y pies azulados, su frecuencia cardíaca es de 80 por minuto, brazos y piernas con poco movimiento. ¿A qué puntaje de APGAR corresponde?

Respuestas:

- **4 - 6**
- 0 - 3
- 7 - 8
- 3 - 4

En una familia donde sus integrantes están sin trabajo, atraviesan una situación de pobreza, las relaciones intrafamiliares son violentas y no predominan la práctica de los valores. ¿A qué determinante de la salud, según Marck Lalonde, hace referencia el caso?

Respuestas:

- **Sociales.**
- Ambientales.
- Biológicos.
- Conductuales.

La valoración de enfermería a un paciente de 70 años se identifica: alteración del patrón funcional actividad y ejercicio, por lo que se decide evaluar la funcionalidad. Según los Protocolos de Atención Integral de Salud de las y los Adultos Mayores. ¿Qué instrumento se utiliza para evaluar la función de movilidad del paciente adulto mayor?

Respuestas:

- **Índice de Katz o Lawton y Brody modificado.**
- Índices específicos de la historia clínica única.
- Índices de Yesavage modificado.
- Índice de Pfeiffer modificado.

Seleccione las etapas de la vigilancia epidemiológica en infecciones asociadas con la atención de salud (IAAS):

1. Definiciones de hechos a vigilar.
2. Programas de supervisión.
3. Recolección de datos.
4. Consolidación y análisis de datos.
5. Programas de prevención.
6. Capacitación al personal.
7. Divulgación de los resultados.

Respuestas:

- **1, 3, 4, 7**
- 1, 2, 6, 7
- 2, 4, 5, 6
- 2, 3, 5, 6



La gasometría arterial es una técnica de monitorización respiratoria que permite identificar la alteración del equilibrio ácido básico. ¿Qué trastorno se pone de manifiesto teniendo en cuenta los siguientes datos?

pH= 7.30

PaCO₂. = 48 mmHg.

PaO₂. = 83 mmHg.

H₂CO₃. = 20 meq/l.

Respuestas:

- **Acidosis Respiratoria.**
- Alcalosis respiratoria.
- Acidosis metabólica.
- Alcalosis metabólica.

Paciente masculino con angina de pecho que tras realizar una caminata exhausta, presenta dolor precordial que se irradia al brazo izquierdo, luego de suspendida la actividad, estar el paciente en reposo y administrarle nitroglicerina sublingual el dolor desaparece. ¿Qué tipo de angina presenta el paciente?

Respuestas:

- **Angina estable.**
- Angina inestable.
- Angina variante.
- Angina refractaria.



En relación al aislamiento de contacto, complete el siguiente enunciado:

Las precauciones de contacto se aplican cuando se sospeche o se tenga constancia de haber estado expuesto a patógenos que liberan esporas y en particular a brotes de _____. Como medida de protección se recomienda el uso de _____ y la utilización de _____.

Respuestas:

- **C. difficile – bata y guantes – material clínico de uso individual.**
- C. difficile – guantes y mascarilla quirúrgica - material clínico de uso individual.
- Micoplasma - guantes y mascarilla N95 - material clínico de uso individual.
- Micoplasma – bata y mascarilla quirúrgica - material clínico de uso individual.

¿Cuál es la reacción adversa más severa por sobredosis de acetaminofén?

Respuestas:

- **Necrosis hepática.**
- Insuficiencia respiratoria aguda.
- Crisis convulsiva.
- Broncoespasmo.

La ictericia es una condición clínica donde la bilirrubina sérica está aumentada como para observar un tinte amarillo, según la escala visual de Kramer. ¿Cuál es el valor de la bilirrubina total cuando se extiende a la mitad superior del tronco?

Respuestas:

- **5 - 12 mg/dl**
- 8 - 16 mg/dl
- 10 - 18 mg/dl
- 4 - 8 mg/dl

Seleccione las intervenciones de enfermería a pacientes en recuperación postanestésica:

- 1. Valoración inicial al ingreso.**
- 2. Controlar infección de la herida quirúrgica.**
- 3. Mantener la ventilación.**
- 4. Control de constantes vitales cada hora.**
- 5. Control cardiovascular.**
- 6. Trasladar al servicio cuando el paciente tenga ALDRETE de 6.**

Respuestas:

- **1, 3, 5**
- 2, 4, 6
- 1, 2, 4
- 3, 5, 6

De acuerdo al MAIS-FCI cuando hay optimización y uso racional de los recursos orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas, a la eficiencia del gasto, garantizando el uso adecuado y un mayor rendimiento de los recursos se refiere a:

Respuestas:

- **Principios del Modelo de Atención Integral de Salud.**
- Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud.
- Propósito del Modelo de Atención Integral de Salud.
- Objetivos estratégicos para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud.



Seleccione los factores de riesgo en la Aspergilosis:

1. Neutropenia, enfermedad de injerto versus huésped.
2. Hepatogenia, virulencia, agente.
3. Trasplante hematopoyético alérgico.
4. Lesiones cercanas a grandes vasos.
5. Trasplante de órganos sólidos, endocarditis.
6. Infección a citomegalovirus, colonización previa.
7. Micosis pulmonar, dolor abdominal.
8. Erosión pleural, compromiso del SNC.

Respuestas:

- **1, 3, 5, 6**

- 1, 2, 4, 7

- 2, 4, 6, 8

- 2, 4, 8, 7

Como profesional de enfermería, es necesario que usted conozca los tipos de prácticas seguras en la atención del paciente - usuario. Las prácticas establecidas son: prácticas seguras administrativas, prácticas seguras asistenciales y prácticas seguras administrativas- asistenciales. ¿Cuál de los siguientes procedimientos pertenecen a las prácticas seguras asistenciales?

Respuestas:

- **Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo.**

- Identificación correcta del paciente.

- Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente.

- Manejo correcto de bombas de infusión.

Paciente de 50 años, se encuentra en recuperación postanestésica luego de una laparotomía exploratoria, con hidratación parenteral, insiste en levantarse para ir al baño. De acuerdo a la escala de riesgo de caída de Morse. ¿Cuál es el riesgo de caída en este paciente?

Respuestas:

- **Medio.**

- No tiene riesgo.

- Bajo.

- Alto.



Hombre de 58 años con antecedentes de Diabetes Mellitus y asma, acude a la consulta al servicio de emergencias del hospital general, luego de haber sufrido un ataque de ansiedad, en la valoración se observa que presenta los siguientes síntomas; disnea, debilidad, mareo y confusión, además, el grado de recorrido de sus respiraciones se encuentra aumentado, a la exploración de los signos vitales se objetiva T 37 °C, R 30 rpm, P 98 lpm y presión arterial 140/80 mm/hg, sin otros hallazgos de interés. ¿Cuál de las alteraciones de la respiración presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hiperventilación.**

- Hipoventilación.
- Taquipnea.
- Bradipnea.

Adulto mayor acude a la consulta externa acompañado de su hija, a la entrevista manifiesta que presenta dificultades para recordar datos como su nombre, fechas, dirección de su domicilio, entre otros. ¿Cuál es la escala que debe utilizar para hacer la valoración de este caso?

Respuestas:

- **Pfeiffer.**

- Índice de Katz.
- Lawton y Brody.
- Yesavage.

Paciente de 53 años, se le realiza una gasometría arterial, cuyos resultados son: pH = 7.33, PaCO₂ = 55 mm Hg, HCO₃ = 24 mEq/L. De acuerdo con estos resultados ¿Cuál es la alteración ácido básica que presenta este paciente?

Respuestas:

- **Acidosis respiratoria.**

- Alcalosis respiratoria.
- Acidosis metabólica.
- Alcalosis metabólica.



La enfermera del centro de salud, valora a un lactante para evaluar la pertinencia y adecuación de sus habilidades. Evidencia que cuando está boca abajo, levanta la cabeza y el pecho, y soporta el peso con los antebrazos. En el desarrollo del motor grueso ¿A qué edad del lactante corresponde esta habilidad?

Respuestas:

- **De 2 a 4 meses.**
- De 4 a 6 meses.
- De 6 a 8 meses.
- De 8 a 10 meses.

La adecuada implementación de las maniobras de RCP por el personal de enfermería es esencial para lograr la supervivencia del paciente en paro cardíaco. ¿Cuáles son las características de las compresiones torácicas de alta calidad en un adulto?

Respuestas:

- **Frecuencia de 100 - 120 cpm, 5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.**
- Frecuencia de 80 -100 cpm, 2.5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.
- Frecuencia de 100 - 120 cpm, 2 cm de profundidad como mínimo, evitar la expansibilidad torácica entre las compresiones e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.
- Frecuencia de 60 -100 cpm, 5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.

¿Qué entiende como GÉNERO?

Respuestas:

- **Es el conjunto de características que tienen mujeres y hombres, las cuales están basadas en factores/construcciones sociales**
- Es el conjunto de creencias y costumbres sobre las preferencias sexuales, que tienen que ver con la formación que los individuos reciben
- Se refiere a las características con las que vienen hombres y mujeres determinados biológicamente
- Tiene relación con la naturaleza biológica y los hábitos que las personas adquieran a lo largo de su vida



Seleccione la respuesta que contenga todas las acciones que se desarrollan al realizar las visitas domiciliarias programadas:

1. Detección precoz y atención integral de problemas de salud y discapacidades.
2. Identificación, atención y apoyo de cuidados paliativos al individuo y familia.
3. Coordinación y participación en actividades de desarrollo comunitario.
4. Identificación de riesgos ambientales y grupos laborables en riesgo.
5. Elaboración del diagnóstico situacional, mapeo de actores, planes operativos.
6. Participación en actividades intersectoriales de desarrollo comunitario.
7. Evaluación dinámica, organizada y continua del estado de salud en su entorno familiar.

Respuestas:

- 1, 2, 4, 7

- 1, 3, 4, 6

- 2, 4, 6, 7

- 2, 3, 5, 6

Paciente de 73 años con antecedentes de EPOC, acude a la emergencia por presentar alteraciones del estado de conciencia y dificultad respiratoria, para su manejo se realiza una gasometría arterial donde se reporta una PO₂ en 55mmHg. ¿Cuál es la alteración que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hipoxemia.**

- Hipercapnia.

- Hipoxia.

- Hipocapnia.

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. ¿Cómo se define la muerte materna?

Respuestas:

- Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo, o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

- Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 45 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción.

- Muerte de una mujer en período del embarazo, parto, o puerperio que se pudo evitar si se hubiera tomado la decisión oportuna de acudir a los servicios de salud a tiempo y haber recibido atención oportuna y adecuada.

- Muerte que resulta de las complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de las intervenciones, o de las omisiones de la aplicación de un tratamiento incorrecto o de una cadena de acontecimientos que se producen en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Seleccione las complicaciones que se presentan en un recién nacido prematuro que está recibiendo oxigenoterapia:

- 1. Signos y síntomas de infección.**
- 2. Hipotermia.**
- 3. Reflejos tendinosos profundos aumentados.**
- 4. Acidosis metabólica y respiratoria.**
- 5. Signos de fuga de aire pulmonar.**
- 6. Reflejo de Moro aumentado.**

Respuestas:

- 1, 2, 4, 5

- 1, 3, 5, 6

- 1, 2, 3, 5

- 1, 4, 2, 6



Esta teorizante, conceptualizó la función propia de la enfermería, que consistía en atender a la persona sana y enferma en sus actividades, para contribuir a su salud o recuperación, y las que realiza si tienen fuerza, voluntad y conocimientos necesarios, o ayudar a una muerte digna. ¿A qué teorizante se le atribuye esta definición?

Respuestas:

- **Virginia Henderson.**

- Nola Pender.
- Dorothea Orem.
- Florence Nightingale.

¿Cuál es el mecanismo de pérdida de calor corporal asociado a exposición de la piel y/o tracto respiratorio del recién nacido a una concentración de humedad menor a la necesaria?

Respuestas:

- **Evaporación.**

- Conducción.
- Convección.
- Radiación.

Una de las teorizantes de enfermería se centra en el individuo como un sistema biopsicosocial adaptativo que emplea un ciclo de realimentación de entradas (estímulos), producción (procesos de control) y salidas (conductas o respuestas adaptativas). ¿Cuál es la teorizante que utiliza este enfoque?

Respuestas:

- **Callista Roy.**

- Betty Neuman.
- Virginia Henderson.
- Martha Rogers.

En un sector de una comunidad, por razones de trabajo minero existe una alta migración de un grupo étnico, usted debe atender a esa comunidad. Al realizar el plan operativo. ¿Cuál sería el objetivo prioritario del Plan, tomando en cuenta el enfoque intercultural?

Respuestas:

- **Reconocer e incorporar los conocimientos y las prácticas de salud ancestrales en el plan.**

- Reconocer las necesidades de salud del grupo étnico de acuerdo a sus costumbres.
- Particularizar los servicios de atención de salud a los grupos de riesgo para mejorar el acceso a los servicios.
- Mejorar las relaciones entre proveedores de salud y usuarios con distintas demandas de atención de salud.

Si queremos realizar una investigación que estudie características humanas tales como: la moralidad, la conducta cotidiana, la libertad, podemos decir que la metodología de investigación será de enfoque :

Respuestas:

- **Cualitativo.**

- Cuantitativo.
- Observacional.
- Experimental.

Seleccione los cuidados para aumentar la temperatura en el RN con hipotermia:

1. Que todos los gases que respire el RN deben estar húmedos y calientes.
2. Ajustar la temperatura de la incubadora máximo 1 °C.
3. Se recomienda el uso de termómetros digitales.
4. Colocar los sensores de temperatura cutánea en la línea media abdominal.
5. Que la temperatura y los gases inspirados debe ser de 37 °C.

Respuestas:

- **1, 2, 5**

- 1, 3, 4
- 2, 4, 5
- 3, 4, 5

Señale la opción correcta de las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso.

Respuestas:

- **Exantema en forma de mariposa y pericarditis.**
- Hipotensión arterial y creatinina sérica disminuida.
- Sensación exagerada al frío y fatiga extrema.
- Lesión eritematosa sobre la superficie de la articulación y debilidad muscular.

Mujer embarazada de 22 años, múltipara que acude al servicio de emergencia del hospital, es valorada por el médico de turno, el cual diagnostica un parto en expulsivo. Se realiza la admisión y se prepara a la paciente e ingresa a sala de partos y da a luz en condiciones normales. ¿Cuáles son los medicamentos que aplica el profesional en enfermería como medida profiláctica al recién nacido?

Respuestas:

- **Administración de ungüento oftálmico con eritromicina al 0.5% o tetraciclina al 1% y de 1 mg de vitamina K vía intramuscular.**
- Aplicación de profilaxis oftálmica ungüento de gentamicina y administración de 1 mg de vitamina K vía intramuscular.
- Administración de profilaxis oftálmica ungüento de garamicina y administración de 2 mg de vitamina K vía intramuscular.
- Aplicación de profilaxis oftálmica ungüento de mupirocina y administración de 1 mg de vitamina K vía intramuscular.

Con relación a los cuidados para el manejo adecuado de las náuseas y vómitos en personas en la fase final de la vida. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones permite disminuir estas molestias?

Respuestas:

- **Iniciar el día con alimentos secos como tostadas o galletas de sal.**
- Brindar infusiones durante las comidas.
- Preferir dieta líquida, fraccionada.
- Suministrar bebidas de canela, menta, laurel y jengibre.

Paciente que permanece en el servicio de Neurocirugía por presentar Trauma Craneoencefálico severo, a la valoración de enfermería se observa que el paciente se encuentra somnoliento, a la monitorización se determina presión intracraneal elevada, según la prescripción médica se solicita administrar una solución hipertónica. ¿Cuál es la solución que usted prepararía para la administración?

Respuestas:

- Solución Salina al 3%

- Solución Salina al 0.9%
- Solución de Lactato Ringer.
- Solución Salina al 0.45%

Paciente con una puntuación de 12 según instrumento de valoración de Johns Hopkins. ¿Qué medida restrictiva debe aplicar para la prevención de caídas según el riesgo del paciente?

Respuestas:

- Permanecer con el paciente mientras usa el baño.

- Ayudar al paciente cuando va al baño.
- Orientar al paciente sobre la ubicación del baño.
- Asegurar una adecuada iluminación sobre todo en la noche.

Cuando la paciente embarazada se encuentra acostada durante la toma de la tensión arterial en la posición decúbito supino se puede provocar hipotensión a causa de compresión venosa. ¿Cuál de las siguientes venas es más probable que hayan sufrido compresión?

Respuestas:

- Vena Cava Inferior.

- Vena femoral.
- Vena Porta Hepática.
- Vena cava superior.



Como licenciado en enfermería realiza la visita domiciliaria a una familia en etapa de contracción, donde ambos cónyuges son adultos mayores con dependencia funcional. ¿Qué actividad prioritaria se realiza teniendo en cuenta los factores de riesgo?

Respuestas:

- Planificar un plan rutinario de ejercicios.

- Orientar una dieta hipercalórica y fraccionada.
- Facilitar silla de ruedas y cuidadores.
- Garantizar reposo minimizando las actividades.

De los siguientes enunciados, seleccione los elementos del Componente de Provisión de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud:

- 1. Reorientación del enfoque curativo.**
- 2. Grupos de población a quienes se entrega la atención.**
- 3. Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.**
- 4. Acercar los servicios de salud a la comunidad.**
- 5. Estrategias y herramientas para dar las prestaciones.**
- 6. Modalidades de atención.**

Respuestas:

- 2, 5, 6**
- 1, 3, 4
- 2, 3, 5
- 1, 4, 6

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Los enemas de limpieza tienen como objetivo eliminar las heces, para lo cual se usan varias soluciones. ¿Qué tipo de solución actúa mediante la extracción del líquido del espacio intersticial hacia el colon?

Respuestas:

- **Hipertónica.**

- Hipotónica.
- Isotónica.
- Espuma.

Complete el enunciado: La parotiditis es una enfermedad que se transmite por vía _____, las partículas son _____. En este caso, como medida de bioseguridad, se utiliza _____.

Respuestas:

- **Directa – mayores de 5 micras – mascarilla quirúrgica.**

- Directa – menores de 5 micras – mascarilla N95.
- Indirecta – mayores de 5 micras – mascarilla N95.
- Indirecta – menores de 5 micras – mascarilla quirúrgica.

En el servicio de Medicina Interna, usted valora a una paciente de 60 años, que presenta presión arterial =160/110 mmHg, el resultado de su examen de hematocrito es de 56%. ¿Qué variable hemodinámica relacionada con la fisiología de la presión arterial sanguínea está alterada en este caso?

Respuestas:

- **Viscosidad.**

- Gasto cardíaco.
- Resistencia periférica.
- Volumen de sangre.



El familiar de un adulto mayor le pregunta al profesional en Enfermería que hacer con su paciente que tiene Alzheimer, porque le preocupa que la estancia en la casa pueda provocarle complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones de un paciente con Alzheimer?

Respuestas:

- **Lesiones, neumonía, estreñimiento, desnutrición, depresión, deshidratación.**
- Diarreas, ansiedad, hiperactividad, delirios, aspiración, neumotórax.
- Derrame pleural, neumonía, fístulas broncopulmonares, insuficiencia respiratoria.
- Temblor, músculos rígidos, cambios en el habla, postura y equilibrios alterados.

Paciente mujer de 30 años que en la valoración se encuentra síntomas clínicos: aumento del apetito, poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso y además exámenes de laboratorio que determinan: glucemia en plasma venoso 200 mg/dL (11.1 mmol/L), estos hallazgos serían indicativos de:

Respuestas:

- **Diabetes Mellitus tipo 2**
- Diabetes Mellitus tipo 1
- Diabetes gestacional.
- Hiperglicemia.

En los centros de salud de nivel primario se desarrollan actividades extramurales, con visitas a las escuelas y familias donde articulan acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, con una visión psicosocial. ¿Cuál de los principios del Modelo de Atención Integral de la Salud (MAIS) se está cumpliendo?

Respuestas:

- **Integralidad.**
- Garantía de los derechos de las y los ciudadanos.
- Universalidad.
- Equidad.



Paciente ingresa con antecedentes de insuficiencia valvular aórtica. El personal de enfermería debe realizar el examen físico para determinar algún sonido cardíaco anómalo que se origina a nivel de la aorta, para la cual debe utilizar técnicas de auscultación de focos cardíacos. ¿Cuál es la localización de este foco cardíaco o aórtico que hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- **Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha.**
- Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.
- Tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.
- Mitad inferior del esternón a lo largo de la línea paraesternal izquierda.

Un pequeño porcentaje de las personas a las que se les administra medicación puede tener una respuesta anormal determinada genéticamente. ¿Cómo se denomina a esta respuesta anormal?

Respuestas:

- **Idiosincrasia.**
- Reacción tóxica.
- Reacción alérgica.
- Efectos colaterales.

Paciente de 70 años permanece en reposo absoluto por diagnóstico de prótesis total de cadera, al realizar medidas de higiene y confort se observa en región sacra una úlcera de presión grado III. ¿Cuál es la principal característica que presenta este estadio?

Respuestas:

- **Pérdida completa del espesor de piel grasa visible.**
- Pérdida parcial del espesor de piel aparición de ampolla.
- Piel íntegra con eritema no blanqueante.
- Pérdida completa del espesor de los tejidos.



La NANDA incluye algunas etiquetas diagnósticas para pacientes con problemas respiratorios. Relacione las etiquetas diagnósticas con las intervenciones de enfermería que correspondan:

NANDA ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS	NIC INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
1. Limpieza ineficaz de vías aéreas.	a) Oxigenoterapia y control de su eficacia.
2. Deterioro del intercambio de gases.	b) Monitorización respiratoria.
3. Patrón respiratorio ineficaz.	c) Aspiración de las vías aéreas.
4. Riesgo de aspiración.	d) Incremento de la tos.

Respuestas:

- **1b, 2a, 3d, 4c.**
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1c, 2b, 3d, 4a.
- 1d, 2c, 3a, 4b.

El profesional de enfermería líder del servicio de consulta externa se encuentra ante un conflicto generado por la inasistencia del enfermero del área de vacunación, sin previo aviso. Esta situación ha generado un colapso en la atención a los usuarios pediátricos, por lo que le toca hacer un reajuste del personal, iniciando con la contribución de ella en las actividades mientras llega el enfermero que cubrirá el turno. ¿Qué estilo de liderazgo está aplicando el líder de enfermería?

Respuestas:

- **Democrático.**
- Directivo.
- Autocrático.
- Coercitivo.



Al valorar un paciente con trauma craneoencefálico, usted observa que no abre los ojos bajo ningún estímulo, al preguntar su nombre responde con palabras inapropiadas y al evaluar la respuesta motora observa una flexión anormal. ¿Qué puntuación tiene este paciente aplicando la Escala del Coma de Glasgow?

Respuestas:

- 7
- 8
- 9
- 6

Seleccione la herramienta que corresponde a la siguiente definición: “son instrumentos técnicos y metodológicos que permiten conocer en forma gráfica a los actores sociales, el proceso vivido por los actores locales, los factores de riesgo y de protección: ambiental, estilos de vida, sanitario y biológico”.

Respuestas:

- **Mapas parlantes.**
- Sala situacional.
- Diagnóstico situacional.
- Ficha familiar.

En el choque hipovolémico para la compensación con soluciones: ¿Cuál de las siguientes soluciones intravenosas no se debe utilizar?

Respuestas:

- **Dextrosa al 5% en agua.**
- Cloruro de sodio 0,9%.
- Lactato Ringer.
- Coloides.

El control es definido como la etapa final del proceso administrativo, en el cual se aprecia el resultado de la ejecución de los planes. Para realizar el control, es necesaria la aplicación de sistemas, métodos y técnicas de control. Una técnica de control son los informes, algunos se realizan cuando existen desviaciones en el logro de objetivos o metas. Las fallas o deficiencias requieren ser examinadas y se precisa de información especial. ¿Cuál es el tipo de informe descrito?

Respuestas:

- **Informes provocados.**

- Informes cualitativos.
- Informes cuantitativos.
- Informes de control.

Paciente de 28 años, con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo I, es llevada por su esposo al servicio de emergencia, por pérdida del estado de vigilia, debido a que hace 5 días no se ha administrado la insulina; a la valoración se encuentra: somnolienta, pálida y deshidratada, con signos vitales: TA 80/40 mmHg, FC 125 lpm, FR 30 rpm, T 36.5 °C, SatO2 86%. Usted recibe los resultados de la gasometría con los siguientes valores: pH 7.33, HCO3 11 mEq/L, PaCO2 15 mmHg, Lactato de 2 y EB -12 mmol/L. ¿Qué diagnóstico considera para la planificación de cuidados de enfermería en la paciente?

Respuestas:

- **Acidosis metabólica.**

- Acidosis respiratoria.
- Alcalosis metabólica.
- Alcalosis respiratoria.



Con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil de las enfermedades prevenibles por vacunación, el Ministerio de Salud Pública da prioridad a la entrega de los diferentes esquemas de vacunación a la población más vulnerable de acuerdo a criterios de riesgo definidos. ¿Qué principio de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI) se pone de manifiesto en la mencionada afirmación?

Respuestas:

- **Equidad social.**

- Oportunidad y Sustentabilidad.
- Calidad.
- Participación social.

Al valorar un paciente con trauma craneoencefálico, usted observa apertura ocular al dolor, al preguntar la fecha le responde de manera confusa y al evaluar la respuesta motora localiza el dolor. De acuerdo a la Escala del Coma de Glasgow, señale la puntuación correspondiente en este caso:

Respuestas:

- **11**

- 10
- 12
- 9

Mujer lleva a la unidad de salud por control de niño sano a su hijo de 11 meses, luego de la revisión médica, el profesional encuentra que el niño está bajo de peso para la edad y solo ha recibido las vacunas de los 2 meses, por lo tanto, remite a la madre al vacunatorio. El profesional de enfermería revisa el carnet y corrobora lo reportado por el médico. ¿Qué intervención de enfermería corresponde?

Respuestas:

- **Aplicar 2da. dosis de: fIPV, neumococo y pentavalente.**

- Aplicar 2da. dosis de: neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: Rotavirus, fIPV, neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: bOPV, neumococo y pentavalente.

Paciente acude a la consulta por presentar: dificultad para respirar, fiebre, tos que moviliza secreciones y dolor precordial. A la exploración física del tórax se ausculta sonidos de tono alto, ligeros que se escuchan al final de la inspiración a nivel de base derecha del pulmón. ¿Cuál es el ruido adventicio que presenta el paciente?

Respuestas:

- Crepitantes.

- Roncus.
- Sibilancias.
- Estridor.

Adulto mayor hospitalizado con diagnóstico de Neumonía, al realizar la monitorización usted identifica que el paciente presenta alteraciones como hipotensión e hipotermia, los resultados de los exámenes de laboratorio revelan una hemoglobina de 8 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes métodos proporciona datos inexactos?

Respuestas:

- Oximetría de pulso.

- Gasometría arterial.
- Gasometría venosa.
- Capnografía.

Como profesional de Enfermería de sala de partos al atender a un recién nacido, para controlar la oxigenación del mismo, debe realizar oximetría de pulso. De acuerdo a la saturación de oxígeno esperable en el recién nacido durante la reanimación post parto descrita en el Normograma de Dawson. ¿Cuánto de Sat O2 se espera a los 5 minutos?

Respuestas:

- 80 - 85 %

- 85 - 95 %
- 75 - 80 %
- 70 - 75 %

Seleccione los factores modificables de riesgo obstétrico, en el control prenatal:

1. Exposición a solventes y pesticidas.
2. Hemorragia del primer trimestre.
3. Inadecuado soporte familiar y de la pareja.
4. Gestante con Rh negativo.
5. Incompetencia cervical.
6. Historia de abuso sexual, físico y emocional.

Respuestas:

- 1, 3, 6
- 2, 4, 5
- 1, 3, 5
- 2, 4, 6

En el servicio de recuperación, debe aplicar transfusión sanguínea a una paciente histerectomizada que presenta 8 g/dl de hemoglobina. Indique la precaución específica que debe tener para evitar la hipotermia:

Respuestas:

- **Administrar la sangre a 37°C**
- Administrar la sangre a 4°C
- Administrar la sangre a 25°C
- Administrar la sangre a 36 °C



Relacione los términos utilizados en el desarrollo de la enfermería con sus características

Términos	Características
1. Modelo.	a. Conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, explicar y predecir el fenómeno de interés.
2. Teoría.	b. Conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina.
3. Paradigma.	c. Análisis del concepto y su implicación conceptual en enfermería.
4. Metaparadigma.	d. Conjunto de conceptos que explican de manera general el fenómeno del cuidado.

Respuestas:

- 1d, 2a, 3c, 4b
- 1a, 2c, 3b, 4d
- 1b, 2d, 3c, 4a
- 1c, 2b, 3d, 4a

Seleccione el concepto del método anticonceptivo MELA:

Respuestas:

- **Consiste en que las mujeres recién paridas y que no han tenido menstruación desde el parto amamenten a su hijo/a exclusivamente durante el día y la noche.**
- Es aquel en que se debe mantener una abstención de relaciones sexuales mientras la madre que ha parido recientemente no vuelva a menstruar.
- Este método se pone en práctica en madres que han parido recientemente que amamantan por lo menos el 80% del tiempo.
- Consiste en que las mujeres recién paridas que ya menstruaron después del parto amamenten a su hijo/a exclusivamente durante el día y la noche.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Cuando usted realiza el tamizaje metabólico a un niño de quince días de nacido para detectar enfermedades hereditarias, la patología que corresponde a trastorno macrosómico excesivo que afecta al metabolismo de las proteínas se refiere a:

Respuestas:

- **Fenilcetonuria.**

- Galactosemia.
- Hipotiroidismo congénito.
- Hiperplasia suprarrenal.

Usted como coordinador de Enfermería ha detectado que existen algunas diferencias en realizar ciertos procedimientos por el personal a su cargo, para poder solucionar este tema de gestión ha resuelto iniciar un estudio de tiempos y movimientos, como técnica administrativa básica, lo que al terminar podrá decir que toda tarea puede reducirse a movimientos elementales y de esta forma optimizar esfuerzos. ¿Qué autor menciona dicho enfoque?

Respuestas:

- **Frank Gilbreth.**

- Frederick Taylor.
- Elton Mayo.
- Douglas McGregor.

Seleccione las ventajas de la leche materna para el sistema inmunológico del recién nacido.

1. Favorece la mielinización.
2. Estimula la producción de leucocitos granulocitos y macrófagos.
3. Aumenta la presencia de oligosacáridos.
4. Aumenta la Somatostatina GI.
5. Mejora la composición de las membranas celulares del cerebro.
6. Aumenta los ácidos grasos de la cadena polinsaturados.

Respuestas:

- **2, 3, 6**

- 1, 2, 3
- 2, 4, 5
- 3, 5, 6



A la auscultación abdominal el profesional en enfermería detecta ruidos hipoactivos muy suaves. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ser la causa de esta manifestación clínica?

Respuestas:

- Manipulación del intestino durante la cirugía.

- Uso de laxantes.
- Depositiones diarreicas.
- Intolerancia a los alimentos.

¿Cuál es el porcentaje de agua corporal que le corresponde al adulto mayor?

Respuestas:

- 45 %**
- 78 %
- 50 %
- 60 %

Seleccione las manifestaciones clínicas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

- 1. Fiebre, sudoración nocturna.**
- 2. Disnea con el ejercicio.**
- 3. Tos seca e irritante.**
- 4. Tos crónica con esputo.**
- 5. Hipoxemia y cianosis.**
- 6. Tórax en tonel.**

Respuestas:

- 2, 4, 6**
- 1, 3, 5
- 2, 3, 6
- 1, 4, 5

Un enfermero se encuentra en su turno de trabajo en la sala de medicina interna, tiene que administrar 35 unidades de insulina de acción intermedia (NPH), como esquema de tratamiento diario prescrito para un paciente de 45 años, de contextura muy delgada, con escaso tejido adiposo, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es la jeringa y calibre de aguja, ideal para administrar la medicación indicada?

Respuestas:

- **Jeringa de 0.5 ml con aguja calibre 31.**
- Jeringa de 0.3 ml con aguja calibre 29.
- Jeringa de 0.5 ml con aguja calibre 25.
- Jeringa de 500 U/ml con aguja calibre 25.

Indique la teorizante a la que corresponde el siguiente enunciado: "La categoría de enfermería humanística, donde el papel de la enfermera es la realización (suplencia o ayuda) de las acciones que la persona no puede realizar en un determinado momento de su ciclo de vital, enfermedad, infancia o edad avanzada."

Respuestas:

- **Virginia Henderson.**
- Florence Nightingale.
- Marjory Gordon.
- Nola Pender.

La incontinencia urinaria es la incapacidad para controlar la micción. Puede variar desde una fuga ocasional hasta la incapacidad total para retener cualquier cantidad de orina. Al realizar una visita domiciliaria, Paciente adulto mayor solicita información sobre lo que debe hacer para que "no se le vaya la orina". ¿De las siguientes acciones, cuál de ellas no disminuye la incontinencia urinaria?

Respuestas:

- **Dar masaje a nivel suprapúbico.**
- Evitar hacer esfuerzo físico.
- Restringir la ingesta de líquidos en la noche.
- Fisioterapia del piso pélvico (Ejercicios de Kegel).



Un paciente de 75 años sometido a cirugía de cadera bajo anestesia raquídea, luego de 2 horas en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), refiere sensación de plenitud en su vejiga y urgencia para orinar, pero no logra la evacuación. ¿Cuál es la primera opción de intervención en este caso?

Respuestas:

- **Aplicar calor en el perineo.**

- Realizar sondaje vesical.
- Poner de pie al paciente.
- Aplicar frío en el perineo.

El MSP del Ecuador clasifica la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacuna. Identifique las enfermedades prevenibles por vacuna en el orden de erradicación y eliminación.

1. Poliomielitis, Sarampión.
2. Parotiditis, Fiebre Amarilla.
3. Rubéola, Síndrome de rubéola congénita.
4. Tétanos neonatal - Hepatitis B.
5. Varicela, Rotavirus.
6. Neumonía, Influenza.

Respuestas:

- **1, 3, 4**

- 1, 4, 5

- 2, 5, 6

- 3, 2, 1

El campo de acción de los Equipos de salud de acuerdo al MAIS-FCI, en el cual les permite construir la base del perfil epidemiológico como herramienta fundamental, para mantener la salud mediante acciones dirigidas a grupos desagregados por género, etnia y por ciclos de vida corresponde al nivel:

Respuestas:

- **Epidemiológico.**

- De enfermedad.
- Familiar y comunitario.
- Social.

¿Cuál es la orientación correcta que se debe brindar a la mujer antes y durante el embarazo con el objetivo de prevenir la aparición de casos con Hipotiroidismo Congénito (HC)?

Respuestas:

- Garantizar el consumo promedio de 250 microgramos de yodo al día durante el embarazo.

- Garantizar el consumo promedio de 80 microgramos de yodo al día durante la lactancia.
- Recomendar el empleo de vitaminas prenatales de administración diaria, que no contengan yodo.
- Tomar suplementos de hierro junto con la levotiroxina para potenciar su efecto.

En los pacientes adultos mayores que reciben inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) tienen riesgo de presentar alteraciones. ¿Cuál es el medio diagnóstico de rutina que se debe realizar?

Respuestas:

- Electrolitos en suero.

- Troponinas.
- Colesterol.
- Gasometría arterial.

En el servicio de consulta externa debe planificar una charla educativa sobre hipertensión arterial dirigida a los pacientes que reciben atención en esta casa de salud, para su intervención debe basar su actuación en un modelo de enfermería. ¿Cuál es la teorizante que utilizaría en este caso?

Respuestas:

- Nola Pender.

- Hildegard Peplau.
- Virginia Henderson.
- Dorothea Orem.



El aumento a nivel de las células en número y/o en tamaño tiene relación con la edad en las dos primeras décadas de la vida, esta definición corresponde a:

Respuestas:

- **Crecimiento.**
- Desarrollo.
- Maduración.
- Osmolaridad.

Al realizar un baño en cama a un paciente con yeso pelvipédico. ¿Qué sistema está aplicando según Dorothea Orem?

Respuestas:

- **Totalmente compensador.**
- Parcialmente compensador.
- Apoyo educativo.
- Orientación al autocuidado.

¿A qué grupo corresponde el método anticonceptivo conocido como Billings?

Respuestas:

- **Naturales.**
- Quirúrgicos.
- Hormonales.
- Mecánicos.

¿Cuál de los siguientes factores patológicos está relacionado con un pronóstico favorable en el cáncer mamario?

Respuestas:

- **Tumor bien diferenciado.**
- Tumor no invasivo mayor de 1 cm.
- Invasión vascular o linfática.
- Ganglios linfáticos axilares positivos.

De acuerdo a clasificación de la mujer embarazada con respecto al modelo de atención prenatal de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el objetivo del control prenatal en el componente básico?

1. La detección de enfermedades maternas subclínicas.
2. Valoración y seguimiento del embarazo de riesgo.
3. Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal.
4. Realizar preparación psicofísica para el nacimiento.
5. Realizar técnicas de diagnóstico prenatal invasivo.
6. Informar a la embarazada sobre los signos de alarma y conductas a seguir.

Respuestas:

- 1, 3, 4, 6
- 1, 2, 3, 5
- 1, 4, 5, 6
- 2, 3, 4, 6

La enfermera del centro de salud al realizar trabajo comunitario ha podido analizar algunos riesgos de salud en los habitantes de la comunidad. Encontró: desnutrición, antecedentes de enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedad crónica en la madre o en el lactante, enfermedades diarreicas y respiratorias frecuentes en el lactante, dificultades o rechazo a la lactancia o alimentación. ¿A qué tipo riesgo de salud se refiere el enunciado?

Respuestas:

- **Riesgos Biológicos.**
- Riesgos socioeconómicos.
- Riesgos de Prestaciones.
- Riesgos en el ciclo de vida.

Seleccione los mecanismos a través de los cuales se fomenta los entornos saludables en el desarrollo comunitario:

- 1. Educación para la salud y participación social.**
- 2. Escuelas promotoras de salud.**
- 3. Elaboración del Análisis Comunitario de Salud.**
- 4. Salud ambiental.**
- 5. Vigilancia y control de riesgos.**
- 6. Elaboración, negociación y ejecución de proyectos.**

Respuestas:

- **1, 2, 4, 5**
- 2, 3, 5, 6
- 1, 2, 3, 5
- 2, 4, 5, 6

El consentimiento de la persona adulta mayor, después de haber recibido la información, será registrada en un documento en el cual se reconozca que recibió la misma en forma previa, completa y que ésta fue comprendida en todas sus dimensiones, manifestando su decisión ante la autoridad competente. ¿A qué artículo de la ley orgánica de las personas adultas mayores, corresponde este enunciado?

Respuestas:

- **Artículo 37.**
- Artículo 36.
- Artículo 35.
- Artículo 16.



Usted realiza una visita domiciliaria, y durante la valoración detecta un paciente que presenta los siguientes síntomas: depresión, miedo a su alrededor y a sus familiares, incapacidad de afrontar problemas de la vida diaria y como consecuencia hostilidad y violencia. Para su intervención debe basar su actuación en un modelo de enfermería. ¿Cuál es la teorizante que utilizaría en este caso?

Respuestas:

- **Hildegard Peplau.**

- Jean Watson.
- Virginia Henderson.
- Dorothea Orem.

Seleccione las manifestaciones clínicas de la cirrosis hepática:

1. Arañas vasculares.
2. Dolor abdominal grave.
3. Eritema palmar.
4. Náusea y vómito.
5. Ascitis.
6. Disminución de la peristalsis.

Respuestas:

- **1, 3, 5**
- 2, 3, 4
- 2, 4, 6
- 1, 5, 6

Usted atiende mujer que cursa embarazo de primer trimestre. Seleccione las recomendaciones que se deben informar:

1. Calcular la fecha probable de parto por F.U.M.
2. Tamizaje de prueba tiroidea.
3. Solicitar grupo sanguíneo y factor Rh, biometría hemática y VDRL.
4. Controlar y registrar presión arterial.
5. Descartar incompatibilidad de grupo y factor Rh.
6. Medir y registrar el peso.

Respuestas:

- **3, 4, 5**
- 1, 2, 6
- 1, 4, 6
- 1, 2, 3

¿Qué escala de valoración corresponde con las siguientes categorías de evaluación: estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia?

Respuestas:

- **Escala de Norton.**
- Escala de Braden.
- Escala de Morse.
- Escala de Macdems.

Paciente de 50 años con cuadro de emergencia hipertensiva, el cual requiere tratamiento antihipertensivo de administración intravenosa para inmediata biodisponibilidad. Seleccione el fármaco de elección:

Respuestas:

- **Nitroprusiato de sodio.**
- Captopril.
- Metildopa.
- Diltiazem.

Como enfermera circulante, usted atiende en quirófano a un paciente al que se realiza una Colecistectomía. Una vez que se realizó la apertura de la pared abdominal, el cirujano le indica que cambie al paciente de posición para tener un mejor acceso a la vesícula biliar. ¿En qué posición usted colocaría al paciente?

Respuestas:

- **Trendelenburg invertida.**

- Litotomía.
- Trendelenburg.
- Decúbito dorsal.

La demencia y el delirio son dos situaciones que pueden presentarse en el adulto mayor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponden a la demencia?

Respuestas:

- **Se pierde en sitios que le eran familiares.**

- Tiene períodos de lucidez y desorientación.
- Se produce por toxicidad por fármacos.
- Existe una alteración cognitiva preexistente.

Paciente masculino de 33 años quien se encuentra en UCI y recibe terapia hidroelectrolítica como parte de su tratamiento, al analizar el Electrocardiograma usted identifica: incremento de la altura de la onda T, prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS, onda P casi ausente y depresión del segmento ST; al analizar los resultados de electrolitos en sangre encuentra un potasio de 8.5 mEq/L, fosforo de 2.7 mg/dl, Na 140 mEq/dl. ¿Cuál de los siguientes desequilibrios electrolíticos considera que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hipercalemia.**

- Hipocalemia.
- Hipernatremia.
- Hiponatremia.

Usted como líder de Enfermería del servicio de Pediatría, debe efectuar el cálculo de personal de Enfermería para la atención directa a pacientes de este servicio. ¿Cuáles son las horas necesarias de atención directa de Enfermería en 24 horas, de acuerdo a los indicadores por categoría de tratamiento?

Respuestas:

- **5 a 6 horas.**

- 1 a 2 horas.

- 3 a 4 horas.

- 7 a 8 horas.

¿En cuál de las situaciones que se presentan se debe evitar de manera absoluta el uso de tocolíticos para prolongar el embarazo?

Respuestas:

- **Hemorragia severa materna.**

- Estado hipertensivo del embarazo no complicado.

- Restricción de crecimiento fetal, sin alteración de la vitalidad.

- Rotura prematura de membranas.

El personal de enfermería está realizando una investigación sobre adherencia al Papanicolau, la situación de pareja es una variable de influencia importante que requiere ser relacionada y se la distingue como: mujeres con pareja o mujeres sin pareja. Para determinar las pruebas estadísticas es necesario identificar el tipo de variable "situación de pareja". ¿A qué tipo de variable corresponde?

Respuestas:

- **Cualitativa nominal.**

- Cuantitativa discreta.

- Cualitativa ordinal.

- Cuantitativa continua.



En el centro de salud, la Licenciada en enfermería encargada del programa de tuberculosis realiza algunas actividades, como medidas de control ambiental. ¿Cuál recomendación, corresponde a esta actividad?

Respuestas:

- **Instalación de sistema de ventilación con presión negativa en laboratorios y salas.**
- Como medida general reforzar la importancia del lavado de manos.
- Los afectados con TB pulmonar o laríngea permanezcan en aislamiento respiratorio, mientras presenten una baciloscopia positiva.
- Realizar la búsqueda permanente de sintomáticos respiratorios en todas las áreas y servicios de los establecimientos salud.

El modelo en el cual, es necesario incluir la motivación como elemento imprescindible posterior al proceso informativo para la consecución de determinados hábitos se refiere:

Respuestas:

- **Modelo persuasivo.**
- Modelo informativo.
- Modelo conviccional.
- Modelo de decisiones en salud.

¿Cuál es el reservorio en la cadena de transmisión de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud?

Respuestas:

- **Paciente, visitante y medios inanimados.**
- Aparato digestivo inferior, vía aérea superior y soluciones de continuidad de la piel.
- Contacto, gotitas y aéreo.
- Vía aérea superior, mucosas de la cara y aparato genitourinario.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo?

Respuestas:

- **Objetivos, preguntas directrices, justificación y viabilidad.**

- Diseño, métodos, instrumentos, población.
- Marco referencial, marco conceptual, marco legal, marco ético.
- Discusión, análisis, conclusiones, recomendaciones.

Paciente masculino de 48 años que ingresa al servicio de emergencia tras sufrir una lesión encefálica traumática frontal luego de haber recibido un golpe en la cabeza con un bate de béisbol, provocándole una contusión cerebral en el sitio de impacto. ¿Qué mecanismo de lesión cefálica recibió el paciente?

Respuestas:

- **Lesión de aceleración.**

- Lesión rotacional.
- Lesión de contragolpe.
- Lesión de desaceleración.

Seleccione el instrumento que permite vigilar el estado de salud de la población, sus necesidades y desarrollar política para garantizar los servicios de salud.

Respuestas:

- **Ficha familiar.**

- Diagnóstico dinámico.
- Mapa parlante.
- Historia clínica.

¿Cuál es el estado nutricional de una paciente de 35 años, con una talla de 147 cm y un peso de 80 kg según el índice de masa corporal?

Respuestas:

- **Obesidad media.**

- Normal.
- Sobrepeso.
- Obesidad mórbida.

La muerte materna es uno de los problemas de salud más relevantes, el Plan Integral de Salud considera los siguientes factores más influyentes, identifique y señale:

- a. Es la muerte de una mujer embarazada.
- b. Aproximadamente 4 de cada 10 embarazos son planificados.
- c. Si existe peligro en la mujer puede ser evitado.
- d. Es un principal indicador de la condición de salud de la mujer.
- e. Se produce con mayor frecuencia en mujeres del sector rural.
- f. Cuando las vías de acceso son deficientes.

Respuestas:

- **a, d, e, f.**

- a, c, e, d.

- a, c, d, f.

- b, c, e, f.

Paciente de 54 años ingresa al servicio de Emergencia por presencia de parches y manchas de color púrpura en la piel y en las membranas mucosas, incluso el revestimiento de la boca en el hemograma nos indica un recuento de neutrófilos menor de 1 300 microlitros, hemoglobina menor de 8 g/dL y plaquetas por debajo de 30 000 microlitros (pancitopenia). ¿Qué tipo de anemia presenta?

Respuestas:

- **Anemia Aplásica.**

- Anemia Ferropénica.

- Anemia Megaloblástica.

- Poliglobulia o Policitemia Vera.

En el control prenatal, para reducir las complicaciones materno neonatales, se deben identificar los factores de riesgo obstétrico modificables y no modificables. ¿Cuál es modificable?

Respuestas:

- **Síntomas neurovegetativos.**

- Endocrinopatía controlada.

- Polihidramnios u oligoamnios.

- Incompetencia cervical.



Los componentes generales de las vacunas son:

1. **Antígeno.**
2. **Principio activo.**
3. **Inmunoglobulinas.**
4. **Excipiente.**
5. **Conservador.**
6. **Adyuvantes.**

Respuestas:

- **1, 4, 5, 6**

- 1, 2, 3, 4

- 2, 4, 5, 6

- 3, 4, 5, 6

Visita domiciliaria es el encuentro o acercamiento del equipo de salud al domicilio del usuario, familia y/o comunidad; responde a una necesidad identificada por el equipo de salud, quienes elaboran el plan de intervención a seguir en el domicilio. En la unidad de salud donde usted ha sido asignada/o, el reporte de consultas le indica alta incidencia de riesgo de desnutrición infantil. ¿Con qué criterio usted realizaría su planificación de visitas domiciliarias?

Respuestas:

- **Epidemiológico.**

- Demográfico.

- Administrativo.

- Socioeconómico.

En una investigación experimental cuando se abordan las causas se tratan de las variables _____, mientras se abordan los efectos se tratan de las variables _____; y si se involucran otros elementos entre las variables se denominan variables _____.

Respuestas:

- **Independientes, dependientes, intervinientes.**

- Dependientes, independientes, intervinientes.

- Independientes, intervinientes, dependientes.

- Dependientes, intervinientes, independientes.

Profesional en Enfermería al realizar la valoración de la embarazada, obtiene información sobre la paridad de la usuaria que indica que ha tenido dos abortos y dos partos a término. Situación que se cataloga como:

Respuestas:

- Grávida x 5.

- Grávida x 4.
- Grávida x 3.
- Grávida x 2.

¿Cuál es la dosis de impregnación de sulfato de magnesio para el tratamiento de eclampsia?

Respuestas:

- 6 g intravenoso en 20 minutos.

- 1 g/hora en infusión continua.
- 2 g/hora en infusión continua.
- 4 g intravenosa en 20 minutos.

Al brindar cuidados de enfermería a pacientes con Hipotiroidismo. ¿Cuál de las siguientes intervenciones usted realiza?

Respuestas:

- Proporcionar una capa adicional de ropa adecuada y evitar la exposición al frío.

- Promover el uso de fuentes de calor externas para mantener la temperatura corporal.
- Incrementar el uso de laxantes en los pacientes para prevenir la constipación.
- Incentivar y orientar sobre el uso de hipnóticos y sedantes para aliviar el insomnio y el nerviosismo.



Paciente de 75 años internado en un centro geriátrico, presenta deterioro global de las funciones cognitivas, sin alteración del nivel de conciencia que interfiere en el desarrollo de sus actividades cotidianas. ¿Qué síndrome geriátrico presenta el paciente con esta sintomatología?

Respuestas:

- **Demencia.**
- Delirio.
- Caídas.
- Dismovilidad.

Ordene la secuencia fisiopatológica en el choque hipovolémico:

1. Disminución de la perfusión tisular.
2. Disminución del gasto cardiaco.
3. Disminución del volumen sanguíneo.
4. Reducción del retorno venoso.
5. Disminución del volumen latido.

Respuestas:

- **3, 4, 5, 2, 1.**
- 2, 3, 4, 5, 1.
- 4, 3, 2, 1, 5.
- 1, 2, 3, 4, 5.



Seleccione las prácticas seguras administrativas/asistenciales para la atención de salud:

1. Control de abreviaturas peligrosas.
2. Programa de mantenimiento de equipos médicos.
3. Prácticas quirúrgicas seguras.
4. Notificación de eventos relacionados con la seguridad.
5. Administración correcta de medicamentos.
6. Manejo correcto de bombas de infusión.

Respuestas:

- **3, 4, 6**
- 1, 2, 3
- 2, 4, 5
- 1, 5, 6

Un niño de 2 años vive a 1600 metros sobre el nivel del mar, al realizar la prueba de hemoglobina tiene una concentración de 12 g/dl. ¿Cuál es la concentración real de hemoglobina, de acuerdo con los ajustes, en función de la altitud sobre el nivel del mar?

Respuestas:

- **11.5 g/dl**
- 11.8 g/dl
- 10.1 g/dl
- 11.2 g/dl

De las consideraciones detalladas para la toma de la muestra del Tamizaje Metabólico Neonatal (TAMEN). ¿Cuál no corresponde?

Respuestas:

- **El recién nacido debe colocarse de forma horizontal durante todo el procedimiento y apoyado al pecho de quién lo sostenga.**
- La toma de la muestra se la realiza a partir de las primeras 96 horas de vida del recién nacido.
- El recién nacido debe estar en ayuno ya sea por vía enteral o parental al menos una hora antes de la muestra.
- Cuando el recién nacido llegue después de las 96 horas, se tomará la muestra de igual manera, incluso hasta el primer año de vida.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



En una institución de salud se observa que se establecen líneas directas de comunicación, se elimina la centralización en la toma de decisiones y se busca simplificar el trabajo. ¿A qué tipo de organización corresponden estas características?

Respuestas:

- **Funcional.**

- Lineal.
- Lineo- funcional.
- Por comités.

Al aplicar en la práctica de enfermería, la reflexión sobre las propias experiencias, identificando las maneras en que se puede mejorar el propio desempeño. ¿A qué habilidad del pensamiento crítico se refiere?

Respuestas:

- **Autorregulación.**

- Inferencia.
- Análisis.
- Explicación.

Como profesional de Enfermería del servicio de Urgencias, al valorar la función respiratoria de un paciente de 65 años, usted observa que la frecuencia respiratoria es anormalmente baja y la profundidad de la respiración está deprimida. Los resultados de la gasometría reportan hipercapnia. ¿Cómo reporta esta alteración del patrón respiratorio en su informe?

Respuestas:

- **Hipoventilación.**

- Respiración de Biot.
- Hiperventilación.
- Respiración de Cheyne-Stokes.

Cuando el investigador informa al participante los objetivos y el propósito de la investigación, el nivel de implicación que requerirá, la garantía de confidencialidad. El principio básico de la ética en investigación es:

Respuestas:

- **Consentimiento.**

- Cuidado.
- Honestidad.
- Autoprotección.

Entre los exámenes de laboratorio que se realizan a un paciente con cáncer se encuentran los bio marcadores, el CA 125 es un bio marcador para el diagnóstico de cáncer de:

Respuestas:

- **Ovario.**

- Próstata.
- Testículo.
- Tiroides.

Paciente con dificultad respiratoria, a su llegada al servicio presenta confusión, mareo, parestesias periféricas y calambres. Para el diagnóstico se requiere la medición de gases en sangre arterial, donde se reporta una alcalosis respiratoria. ¿Qué valores determinan esta alteración?

Respuestas:

- **PH= 7,50, PaCO₂= 24, HCO₃= 10**

- PH=7,15, PaCO₂= 20, HCO₃= 14
- PH=7, 56, PaCO₂= 45, HCO₃= 28
- PH = 7,10, PaCO₂ = 50, HCO₃ = 28

Según el MAIS – FCI, se debe realizar un diagnóstico de la situación de las comunidades con la finalidad de verificar las características socio demográficas de la población. Dentro del saneamiento y contaminantes, es importante tomar en cuenta:

Respuestas:

- **Todo lo relacionado con el agua y la calidad de su abastecimiento.**

- Todo lo relacionado con la luz y servicios básicos.
- Todo lo relacionado con el alcantarillado y las aguas servidas.
- Todo lo relacionado con la pavimentación y servicios básicos.

En el servicio de Medicina Interna, recibe un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, que permaneció en urgencias 12 horas por una crisis hipertensiva. Luego de su estabilización debe ser controlado en hospitalización. El paciente está consciente, al deambular se apoya en los muebles, su marcha es débil, se encuentra con una solución intravenosa de mantenimiento. ¿Cuál es la puntuación final de acuerdo a la escala de riesgo de caída de Morse?

Respuestas:

- **75 puntos.**

- 50 puntos.

- 65 puntos.

- 45 puntos.

El ESAMyN es la Normativa Sanitaria para la Certificación de Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño, se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal a través de: la atención adecuada a la gestante, el parto humanizado, y el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna, consta de cuatro componentes y 24 pasos. ¿Cuál de los pasos corresponde al componente (B)?

Respuestas:

- **Captar y controlar a madres embarazadas y asegurar el tratamiento de las mujeres en riesgo.**

- Capacitar y dar a conocer la norma en el establecimiento de salud.

- Garantizar un ambiente acogedor y el respeto de práctica interculturales.

- Permitir el acompañamiento por una persona de elección de la madre antes, durante y después del parto.

¿Cuál es el elemento del Código deontológico para la profesión del CIE, que se pone de manifiesto cuando el profesional en enfermería se cerciora de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas?

Respuestas:

- **La enfermera y los pacientes.**

- La enfermera y la salud global.

- La enfermera y la profesión.

- La enfermera y la práctica.

Adulto mayor acude a la consulta externa acompañado de su hija, a la entrevista manifiesta que presenta dificultades para realizar cuidados de la vida diaria, además al examen físico se observa la necesidad de apoyarse para deambular. ¿Cuál es el instrumento que utilizaría para hacer la valoración según los datos descritos?

Respuestas:

- **Índice de Katz.**
- Lawton y Brody.
- Yesavage.
- Pfeiffer.

¿Cuál es el método anticonceptivo recomendado para una mujer de 28 años, con 8 semanas postparto y lactancia materna exclusiva?

Respuestas:

- **Amenorrea de la lactancia.**
- Método del moco cervical o Billings.
- Anticonceptivos orales combinados.
- Dispositivo intrauterino de cobre.

En el sistema integrado de vigilancia epidemiológica, se crea la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica y tiene como subsistema el SIVE ALERTA. ¿A qué corresponde el SIVE ALERTA?

Respuestas:

- **A emergencias sanitarias.**
- A enfermedades que son parte de programas de intervención del Ministerio de Salud Pública.
- Registro de egresos hospitalarios.
- Registro de mortalidad.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Cuando el MAIS-FCI, orienta el accionar integrado de los actores del Sistema Nacional de Salud hacia la garantía de los derechos en salud y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, al mejorar las condiciones de vida y salud de la población ecuatoriana, bajo los principios de la Estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada. ¿A qué se está refiriendo?

Respuestas:

- Propósito del Modelo de Atención Integral de Salud.

- Principios del Modelo de Atención Integral de Salud.
- Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud.
- Objetivos estratégicos para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud.

Acude a la consulta una mujer que ha tomado anticoncepción hormonal oral y refiere que ha presentado diarrea, vómito, náusea y desea cambiar de método anticonceptivo. ¿Cuál es la recomendación que se debe valorar?

Respuestas:

- La inocuidad del método que viene determinada por la ausencia de riesgos de salud.

- El índice de Pearl que refleja el porcentaje de no embarazos de un método anticonceptivo.
- La aceptabilidad del método que viene determinada por la ausencia de efectos colaterales.
- La motivación o condicionamientos socioculturales como el nivel de educación que se tiene.

En la sala de patología obstétrica, usted atiende a una mujer de 25 años con embarazo de 37 semanas que presenta tensión arterial de 170/110 mm Hg, agitación psicomotriz y proteinuria con tirilla reactiva ++. Luego de aplicar la herramienta SCORE MAMÁ activa clave azul. De acuerdo al protocolo para eclampsia y de acuerdo con la prescripción médica. ¿Qué dosis de sulfato de magnesio administra para mantenimiento?

Respuestas:

- 2gr / hora en infusión continua.

- 1gr / hora en infusión continua.
- 2gr en bolo en 20 minutos.
- 4gr IV en 20 minutos.

Complete el enunciado:

Luego de formular los diagnósticos enfermeros, se inicia la etapa de planeación durante la cual se establecen _____ y los _____ utilizando la taxonomía NOC.

Respuestas:

- **Resultados - indicadores.**

- Evaluaciones - resultados.
- Intervenciones - resultados.
- Ejecuciones - dominios.

Complete el siguiente enunciado, relacionado con las complicaciones agudas de la Diabetes Mellitus:

La _____ puede deberse a un exceso de insulina, actividad física extenuante o poca ingesta de alimentos. En caso de una cantidad nula de insulina disponible en el organismo, se produce _____, caracterizada por hiperglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis. El cuadro clínico que incluye hipotensión, deshidratación intensa y signos neurológicos corresponde a _____.

Respuestas:

- **hipoglicemia - cetoacidosis diabética - síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico.**

- cetoacidosis diabética - nefropatía - complicaciones microvasculares.
- hipoglicemia - síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico - nefropatía.
- hiperglicemia - cetoacidosis diabética - nefropatía.

Identifique la saturación de oxígeno esperable en el recién nacido durante la reanimación post parto a los 3 minutos según lo descrito en el Normograma de Dawson:

Respuestas:

- **70 -75%**

- 75 - 80%
- 80 - 85%
- 85 - 95%

Al realizar la valoración de enfermería a un paciente con obstrucción intestinal, se observa que el abdomen se encuentra distendido y en la auscultación los ruidos hidroaéreos están ausentes. El contenido de la última aspiración gástrica realizada presenta un color oscuro de aspecto retencional que alcanza los 250 ml. Los datos del ionograma muestran signos de Hipocalemia e Hiponatremia, por lo que el médico indica reponer las pérdidas gástricas por vía intravenosa. ¿Qué tipo de solución utilizaría para la administración?

Respuestas:

- **Ringer lactato.**
- Dextrosa al 5%
- Solución salina al 0.9%
- Solución glucosalina.

¿Cuál de las siguientes herramientas de monitoreo de las condiciones de salud, permite la actualización periódica de la situación inicial e identificar oportunamente a los individuos y familias con posibles y potenciales riesgos?

Respuestas:

- **Diagnóstico dinámico.**
- ASIS.
- Sala situacional.
- Mapa parlante.

Paciente embarazada de 32 semanas de gestación que acude al control prenatal; dentro de la valoración a la gestante debe realizar las maniobras de Leopold. ¿Qué valora la segunda maniobra?

Respuestas:

- **Situación en relación del eje longitudinal del feto con el útero.**
- La presentación del feto.
- El encajamiento y movilidad de la cabeza del feto en la entrada de la pelvis materna.
- Si la cabeza esta encajada en relación con los planos de Hodge.



Los fármacos antineoplásicos pueden ser irritantes. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el efecto irritante?

Respuestas:

- **Inducen reacciones inflamatorias, pero casi nunca daño hístico permanente.**
- Nunca debe administrarse en venas periféricas de la mano o la muñeca.
- Causan necrosis tisular y daño a tendones, nervios y vasos sanguíneos subyacentes.
- Provoca una reacción circunscrita y dolorosa.

Cuando valora a un paciente con un trastorno neurológico, usted comprueba que presenta signo de Kernig positivo. Este hallazgo se relaciona con:

Respuestas:

- **Irritación meníngea.**
- Crisis convulsiva.
- Diplopía.
- Infarto cerebral.

Usted trabaja en el servicio de Medicina Interna, durante su turno observa que un paciente adulto mayor al momento de interrogarlo presenta un cambio en el estado de ánimo, se siente deprimido porque sus familiares no lo han visitado. ¿Cuál es la escala de valoración geriátrica que puede utilizar en este caso?

Respuestas:

- **Escala Yesavage.**
- Escala Pfeiffer.
- Escala Katz.
- Escala Lawton.

Los siguientes valores, en la medición de glicemia, permiten dar un diagnóstico de Diabetes Mellitus. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Glicemia tomada al azar > 250 mg/dl, después de una carga de 100 g de glucosa.**
- Glicemia tomada al azar > 200 mg/dl.
- Glicemia plasmática en ayunas > 126 mg/dl.
- Glicemia plasmática > 200 mg/dl, 2 horas después de una carga de 75 g de glucosa.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Seleccione las áreas que son consideradas semirrestringidas en un centro quirúrgico:

1. Sala de procedimientos menores.
2. Áreas de almacenamiento.
3. Área de materiales estériles.
4. Corredores ubicados entre quirófanos.
5. Vestidores del centro quirúrgico.
6. Áreas de procesamiento de instrumental.

Respuestas:

- **2, 4, 6**
- 1, 5, 6
- 2, 3, 5
- 1, 3, 4

Como profesional de enfermería, usted brinda cuidados paliativos domiciliarios a un paciente que presenta cuadro de deshidratación a causa de abundantes vómitos. ¿Qué vía de administración se utiliza como primera opción para la reposición de líquidos, ante la imposibilidad de obtener un acceso intravenoso?

Respuestas:

- **Vía subcutánea.**
- Vía oral.
- Vía intramuscular.
- Vía rectal.

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural, orienta el accionar integrado de los actores del Sistema Nacional de Salud hacia la garantía de los derechos en salud y en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir al mejorar las condiciones de vida y salud de la población. Esta definición hace énfasis a:

Respuestas:

- **Propósito.**
- Objetivo.
- Principios.
- Integralidad.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Al realizar la auscultación pulmonar escucha un ruido áspero, rechinante, superficial durante la inspiración y la espiración y que no desaparece con la tos. Seleccione el ruido respiratorio adventicio que indica el caso.

Respuestas:

- **Roce pleural.**

- Sibilancias.
- Roncus.
- Estertores crepitantes.

Seleccione los cuidados de enfermería en la administración del sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia en pacientes con riesgo de parto prematuro.

1. Se recomienda administrar 4 g IV hasta 20 minutos seguido de 1 hora.
2. No retrasar el parto para administrar el sulfato de magnesio.
3. Se recomienda el uso en mujeres con semana de gestación > 34.
4. Cuando la dilatación de cuello es mayor a 4 cm.
5. Administrar progesterona vaginal para prevenir parto prematuro.

Respuestas:

- **1, 2, 4**

- 1, 3, 5

- 2, 4, 5

- 3, 2, 1

Ordene los objetivos de la Atención Primaria en Salud en el enfoque del MAIS del Ecuador:

1. Fortalecer los recursos humanos en materia de salud.
2. Facilitar la inclusión social y la equidad en salud.
3. Fomentar el trabajo intersectorial sobre los determinantes.
4. Potenciar la promoción de la salud y promover la atención integral.
5. Promover los sistemas de salud basados en APS.
6. Orientar hacia la calidad de la atención y seguridad del paciente.

Respuestas:

- **2, 5, 4, 3, 6, 1**

- 2, 1, 4, 5, 3, 6

- 3, 2, 1, 6, 5, 4

- 1, 3, 5, 4, 6, 2

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

@CACES.EC

@CACES_EC

/CACES_EC



¿Cuál es la zona corporal recomendada y en qué posición deberá estar el paciente para administrar medicamento por vía Intra Muscular (IM) ?

Respuestas:

- **Muslos – supino.**
- Brazos – de pie.
- Glúteos – dorsal.
- Gran dorsal - ventral.

Durante la visita domiciliaria, usted identifica un paciente con hipertensión arterial. Establece la necesidad de trabajar en un plan de cuidados individualizados sobre estilo de vida saludable y actividades que promuevan el equilibrio entre el descanso y la actividad, dirigido al paciente y su familia. ¿Cuál es el rol que desempeña el personal de enfermería frente a este caso?

Respuestas:

- **Cuidadora.**
- Colaboradora.
- Defensora del paciente.
- Consejera.

En la visita domiciliaria se identifica un paciente con Diabetes tipo 2. Al interrogatorio manifiesta que está preocupado actualmente por el problema de salud que enfrenta y considera cambiar su conducta alimentaria, además, solicita información sobre la dieta. ¿Cuál es la fase del cambio de la conducta de salud que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Fase de contemplación.**
- Fase de precontemplación.
- Fase de preparación.
- Fase de acción.



De las siguientes teorías, indique la que está relacionada con la hipótesis en que el envejecimiento ocurre porque un grupo de átomos inestables son el producto de la oxidación de ciertos componentes orgánicos, que trae como resultado cambios bioquímicos en las células que no pueden regenerarse.

Respuestas:

- **Teoría de los radicales libres.**

- Teoría inmunitaria.
- Teoría genética.
- Teoría del desgaste.

Paciente de 24 años, ingresa a centro obstétrico del hospital, da a luz a su primogénito, recién nacido a término, vigoroso, con llanto fuerte y con un buen tono muscular (APGAR 10/10). Usted como profesional en enfermería. ¿Qué cuidados debe recibir este niño?

Respuestas:

- **Cuidado esencial inmediato.**

- Realizarle un examen rápido.
- Aplicarle el test de Apgar.
- Contacto piel a piel con la madre.



Seleccione las vacunas que aplica tanto a los adolescentes como adultos que presentan infección por VIH con valores de linfocitos CD4+ por debajo de 200 células por ml:

1. Influenza inactivada.
2. Difteria tétanos.
3. Fiebre amarilla.
4. Antineumocócica.
5. Papiloma Virus.
6. Varicela Zóster.

Respuestas:

- 1, 2, 4, 5
- 1, 3, 5, 6
- 1, 2, 3, 5
- 1, 4, 5, 6

Señale la secuencia correcta para retirarse el equipo de protección personal:

1. Gafas protectoras.
2. Mascarilla.
3. Guantes.
4. Bata.

Respuestas:

- 3, 1, 4, 2
- 1, 2, 3, 4
- 3, 4, 1, 2
- 2, 1, 4, 3

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Paciente de 24 años, se encuentra en la sala de recuperación luego de ser intervenido de una apendicectomía; después de una hora aproximadamente, el paciente mueve solo 2 extremidades, respira profundo y tose, tiene una presión sanguínea 20 % mayor a la cifra preanestésica, está completamente despierto y mantiene su SatO2 en 91 % con aire ambiente. ¿Cuál es el puntaje según la escala de Aldrete?

Respuestas:

- 9
- 7
- 5
- 10

“Se deben crear espacios de gestión y autogestión, donde los conjuntos sociales y los trabajadores de la salud concierten sobre los procesos de identificación de problemas, el establecimiento de prioridades y la búsqueda de soluciones”. ¿A qué tipo de integralidad corresponde el enunciado?

Respuestas:

- **Integralidad en la participación de la comunidad.**
- Integralidad en las acciones intersectoriales.
- Integralidad en la atención individual y familiar.
- Integralidad en la gestión institucional.

Si se realizara una investigación para determinar la prevalencia de anemia en madres embarazadas que acuden al hospital durante el último semestre del 2020. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico aplicaría?

Respuestas:

- **Transversal.**
- Longitudinal.
- De caso control.
- De cohorte.



Seleccione los principios transversales de la seguridad del paciente – usuario:

1. Atención centrada en la persona.
2. Atención con Autonomía y Justicia.
3. Liderazgo y trabajo en equipo.
4. Administración correcta de medicamentos.

5. Visión sistémica y multicausal.

6. Identificación correcta del paciente.

Respuestas:

- 1, 3, 5
- 2, 4, 6
- 3, 4, 6
- 2, 3, 5

Al valorar con la herramienta SCORE MAMÁ, a una mujer embarazada de 38 semanas que presenta los siguientes parámetros: estado de conciencia alerta, frecuencia cardíaca 104 por minuto, presión arterial 130/80 mm Hg, frecuencia respiratoria 23 por minuto, temperatura 38.2°C, saturación de oxígeno 95%. ¿Cuál es el puntaje total asignado de acuerdo a los parámetros del caso?

Respuestas:

- 4 puntos.
- 7 puntos.
- 8 puntos.
- 5 puntos.



Indique la solución cristaloide que restaura el volumen intravascular y neutraliza la acidosis.

Respuestas:

- Lactato de Ringer.

- Solución salina al 3 %
- Solución salina al 0.9 %
- Albúmina.

Usted se encuentra en el área de Coronarios y debe administrar medicamentos bajo medidas de seguridad, pero evidencia la inexistencia de protocolos. ¿Cuál es la situación a la que se enfrenta el personal de enfermería?

Respuestas:

- Factor contribuyente.

- Suceso adverso.
- Seguridad del paciente.
- Error activo.

Al educar a los padres con respecto al cuidado del Recién Nacido, de evitar colocar la cuna cerca de una ventana abierta, un ventilador o aire acondicionado. ¿A qué mecanismo de prevención de pérdida de calor se está refiriendo?

Respuestas:

- Convección.

- Conducción.
- Radiación.
- Evaporación.

Seleccione los objetivos específicos de atención de los profesionales enfermeros/ras gestores de casos en la atención primaria en salud:

1. Mantener y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las cuidadoras principales de los pacientes.
2. Mantener y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de toda persona incapacitada y/o de riesgo.
3. Elaborar Guías de Práctica Clínica que ayuden en la coordinación entre niveles.
4. Facilitar la mejora de la atención domiciliaria al equipo de atención primaria.
5. Garantizar el uso adecuado del material de ayudas técnicas para el cuidado.
6. Evaluar y retroalimentar continuamente en los diferentes niveles asistenciales.

Respuestas:

- 1, 2, 4, 5
- 2, 3, 5, 6
- 1, 3, 4, 5
- 2, 4, 5, 6

Paciente de 41 años, con diagnóstico reciente desde hace 2 meses de demencia senil, con tratamiento, que acude a urgencias por presentar alucinaciones y agitación. Se ingresa en el servicio de neurocirugía para valoración evidenciándose torpeza progresiva para la marcha, disfunción de esfínteres y desorientación de una semana de evolución. Al interrogatorio con antecedentes personales hipertensión arterial y familiares, dos hermanos con demencia tipo Alzheimer, además exploración complementaria una analítica normal. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- 00128 Confusión aguda.
- 00129 Confusión crónica.
- 00131 Deterioro de la memoria.
- 00222 Control de impulsos ineficaz.

Paciente adulta mayor con antecedentes de infecciones del tracto urinario por repetidas ocasiones, acude al hospital por presentar: hematuria, incontinencia urinaria; el médico para su diagnóstico solicita un estudio que le permita evaluar el reflujo vesicoureteral y lesión vesical. ¿Cuál es el estudio diagnóstico que le permita evaluar estas alteraciones?

Respuestas:

- **Cistografía.**
- Pielografía.
- Gammagrafía.
- Urografía.

Como profesional de enfermería, debe brindar cuidado interpersonal para promover la salud y prevenir la enfermedad a través de las intervenciones en su quehacer diario, permitiendo generar la curación del cuerpo y alma. ¿A qué teorizante hace referencia?

Respuestas:

- **Jean Watson.**
- Patricia Benner.
- Kristen Swanson.
- Madeline Leininger.

En el centro de salud donde usted trabaja se presenta el caso de una enfermedad con una incidencia mayor a la esperada para su área geográfica y período determinado. ¿Cuál es el tipo de vigilancia epidemiológica que corresponde este caso?

Respuestas:

- **Epidemia.**
- Pandemia.
- Endemia.
- Brote.

¿Con qué tipo de variables se trabaja en una investigación para clasificar el dolor en pacientes posquirúrgicos y establecer una constante de intensidad con ordenamiento jerárquico en subclases, con intervalos graduales o no; como leve, moderado y grave, se entiende que leve es menos intenso que moderado y que grave, sin que se pueda distinguir con claridad la distancia entre cada una de las intensidades del dolor?

Respuestas:

- Variables ordinales.

- Variables numéricas continuas.
- Variables nominales.
- Variables de razón.

En el tratamiento del dolor oncológico en adultos, de acuerdo con la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud modificada. ¿En qué caso se utiliza tramadol?

Respuestas:

- Escala visual análoga 5-6

- Escala visual análoga 1-4
- Escala visual análoga 7-9
- Escala visual análoga 10

Para garantizar la esterilización se realiza el monitoreo integral tanto en la carga como en los paquetes de equipos. Seleccione el producto utilizado para realizar el control de carga:

Respuestas:

- Indicadores biológicos.

- Indicadores químicos.
- Cintas testigo.
- Tarjetas de registro.



¿Cuál es el cuidado de enfermería en un paciente adulto con tubo endotraqueal y que requiere aspiración de secreciones por sistema abierto?

Respuestas:

- **Aspirar de 10 a 15 segundos en cada ocasión.**
- Evitar la hiperventilación previa a la aspiración.
- Aspirar las secreciones bucofaríngeas antes que las endotraqueales.
- Aspirar de 15 a 30 segundos en cada ocasión.

En un Centro de Salud se va a realizar una encuesta con relación a la atención de Enfermería dirigida a los pacientes para evaluar el grado de satisfacción empleando la escala: Muy satisfecho - Satisfecho - Regular. ¿Qué tipo de variable estamos analizando?

Respuestas:

- **Cualitativa ordinal.**
- Cuantitativa discreta.
- Cualitativa nominal.
- Cuantitativa continua.

Paciente de 73 años con antecedentes de EPOC, acude a la emergencia por presentar alteraciones del estado de conciencia y dificultad respiratoria, para su manejo se realiza una gasometría arterial donde se reporta una PCO₂ de 50mmHg. ¿Cuál es la alteración que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hipercapnia.**
- Hipoxia.
- Hipoxemia.
- Hipocapnia.

Según la edad gestacional en el RN prematuro se toma en cuenta:

Respuestas:

- **Madurez neuromuscular.**
- Síndrome de dificultad respiratoria.
- Valoración neurológica.
- Valoración física.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Seleccione las intervenciones de enfermería en la preparación al paciente para la ergometría:

- 1. Solicitar que se retire las prótesis dentales.**
- 2. Instruirle que debe mantenerse en ayuno 4 horas previas al examen.**
- 3. Informarle que previo al examen debe evitar el uso de estimulantes como tabaco y cafeína.**
- 4. Monitorizar al paciente durante 10- 15 minutos.**
- 5. Informarle que estará ligeramente somnoliento.**
- 6. Indicarle que debe llevar ropa adecuada para realizar ejercicio.**

Respuestas:

- 2, 3, 6**
- 1, 4, 5
- 2, 4, 6
- 1, 3, 5

Paciente ingresa al Servicio de Urgencias con traumatismo maxilofacial, al examen físico presenta: letargia, equimosis periorbitaria y retro auricular, rinorraquia y otorrraquia. Usted como personal de enfermería debe manejar la vía aérea, para lo cual necesita colocar un dispositivo básico que le permita evitar la hipoxemia y mejorar la ventilación. ¿Cuál es el dispositivo de elección para el paciente?

Respuestas:

- Cánula orofaríngea.**
- Cánula nasofaríngea.
- Máscara laríngea.
- Tubo laríngeo.



Las actividades de la vida diaria del adulto mayor se evalúan de manera jerárquica con la siguiente escala:

Respuestas:

- **Índice de Katz.**
- Índice de Barthel.
- Escala de Yesavage.
- Escala de Tinetti.

Una enfermera en servicio de salud rural al inicio de su labor extramural observa que no existe intervención de actores sociales, siendo este uno de los aspectos fundamentales del Análisis Situacional Integral de Salud (ASIS), como la dinamización de la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y contraloría social. En este proceso se incluye la conformación del comité local de salud en coordinación con el establecimiento de salud, para identificación de acciones para el fortalecimiento de la gestión comunitaria ¿En qué fase se debe realizar el proceso antes mencionado?

Respuestas:

- **Segunda fase.**
- Primera fase.
- Tercera fase.
- Cuarta fase.

¿Qué grupo de alimentos recomienda comer libremente a un paciente con Fenilcetonuria (PKU)?

Respuestas:

- **Azúcar, mermeladas, miel, chocolate.**
- Carnes de todo tipo, vísceras, pescados.
- Frutos secos: ajonjolí, avellanas, almendras.
- Todas las leguminosas secas y frescas.



En el centro de salud donde usted trabaja, acude una señora con sus familiares, quienes indican que están preocupados porque en las últimas semanas han observado que a su madre le dificulta bañarse, vestirse y caminar. Para la valoración de Enfermería debe utilizar una escala que le permita evaluar la condición del paciente. ¿Cuál es la escala que mide esas acciones?

Respuestas:

- **Escala Katz.**

- Escala Yesavage.
- Escala Pfeiffer.
- Escala Guijón.

Paciente hospitalizado en el servicio de Terapia Intensiva con diagnóstico de Septicemia, el médico para su tratamiento le pide administrar Vancomicina 500mg intravenoso cada 6 horas. Usted como personal de enfermería debe conocer del medicamento para evitar efectos adversos. ¿A qué grupo farmacológico pertenece este medicamento?

Respuestas:

- **Glicopéptidos**

- Fluoroquinolona.
- Macrólidos.
- Aminoglucósidos.

El elemento del componente de Provisión de Servicios del MAIS-FCI que entrega atención en salud a las personas y las familias considerando las especificidades y necesidades de cada grupo etario con enfoque de género se denomina:

Respuestas:

- **Ciclos de vida.**

- Grupos prioritarios.
- Grupos de riesgo específicos.
- Modalidades de atención.



Con relación a los cuidados de enfermería en la obtención de una muestra de sangre capilar para la medición de la glicemia, señale el enunciado correcto.

Respuestas:

- **Pedir al paciente que se lave las manos con agua tibia y jabón previo a la punción.**
- Presionar fuertemente el dedo puncionado para obtener la muestra de sangre.
- En los adultos se debe obtener la muestra capilar de los extremos de los dedos.
- Antes de tomada la muestra aplicar presión en el sitio de punción con una torunda con alcohol.

Paciente ingresa al hospital por presentar hormigueo y debilidad muscular; el médico solicita exámenes de laboratorio donde se evidencian los siguientes datos: Sodio 140 mEq/L; calcio 9 mg/dL, potasio 2.5 mEq/L; magnesio 2 mg/ dL; fósforo 4 mg/dL. ¿Cuál es la alteración que presenta el paciente?

Respuestas:

- **Hipocalcemia.**
- Hipocalcemia.
- Hipomagnesemia.
- Hiponatremia.

¿Cuál es el cambio fisiológico que se produce en el adulto mayor a nivel de los ojos, cuyo efecto es la disminución de la visión de cerca y de la periférica?

Respuestas:

- **Cristalinos menos elásticos.**
- Cristalinos opacos, amarillos.
- Pupila más pequeña.
- Arco senil.



Según el código deontológico para la profesión de enfermería (CIE). “La enfermera observará en todo momento normas de conducta personal que acrediten a la profesión y fomenten la confianza del público”. Seleccione el elemento al que se refiere.

Respuestas:

- La enfermera y la práctica.

- La enfermera y sus compañeros de trabajo.
- La enfermera y la profesión.
- La enfermera y las personas.

¿Cuáles son los componentes del Modelo de Atención Integral y Comunitario e Intercultural MAIS- FCI?

Respuestas:

- Provisión de servicios, organización, gestión y financiamiento.

- La universalidad, integralidad, equidad y continuidad.
- Atención individual, familiar, a la comunidad y al ambiente.
- Niñez, adolescencia, adultos/as y adulto mayor.

En los enfoques de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Ecuador. ¿Cuál de ellos proponen la modificación de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre hombres y mujeres de manera que exista igualdad en el ejercicio de derechos, en el acceso a beneficios, recursos y oportunidades?

Respuestas:

- Enfoque de género.

- Enfoque de igualdad.
- Enfoque de interculturalidad.
- Enfoque de sexualidad integral.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Paciente de 75 años, que acude a su Centro de Salud para consulta sistemática de Geriátrica. Al realizar la valoración de enfermería, se observa una respiración regular en profundidad y ritmo, con una frecuencia entre 12 y 18 veces por minuto, excepto por suspiros ocasionales. ¿Cuál de los siguientes patrones respiratorios es el descrito en este caso?

Respuestas:

- **Respiración eupnéica.**

- Respiración de Biot.
- Respiración de Cheyne-Stokes.
- Respiración de Kussmaul.

Seleccione la medida de control ambiental para la prevención del contagio y transmisión de la tuberculosis en los establecimientos de salud:

Respuestas:

- **Incrementar el intercambio de aire interno potencialmente contaminado con aire puro del exterior, mejorando la ventilación natural.**

- Al ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.
- Elaboración de un plan de control de infecciones que incluya la identificación de los servicios de riesgo.
- Promover el tratamiento ambulatorio de la TB como una forma eficaz para disminuir el riesgo de transmisión.

Mujer de 17 años, acude a un centro de salud solicitando información. Refiere haber tenido su primera relación sexual sin protección hace 24 horas. Usted como profesional de Enfermería proporciona información y asesoría sobre salud sexual y reproductiva, considerando a esta persona como un igual, comprendiendo su condición de vida, sus derechos, cualidades, actitudes y opiniones. ¿Cuál es el principio de asesoría en salud sexual y reproductiva que está aplicando en este caso?

Respuestas:

- **Respeto.**

- Confidencialidad.
- Calidad.
- Autonomía.



En la sala de cuidados neonatal a los 5 minutos de nacimiento se le aplica el test de APGAR a un neonato masculino de nacimiento eutócico simple con antecedente perinatal de líquido en las vías respiratorias. A la valoración no se observó acrocianosis ni palidez, con FC mayor a 100 latidos/min, respuesta débil a la estimulación, en semiflexión y con esfuerzo respiratorio irregular. Indique las condiciones de vitalidad del neonato:

Respuestas:

- **7 Puntos: ausencia de dificultades.**

- 6 Puntos: dificultad moderada.
- 3 Puntos: dificultad marcada.
- 5 Puntos: dificultad moderada.

En el proceso normal del envejecimiento a nivel del sistema nervioso central se producen ciertos cambios. EXCEPTO:

Respuestas:

- **Pérdida de la memoria y modificación grave del carácter.**

- Alteración de la percepción sobre la cantidad y calidad del sueño.
- Disminución progresiva de la atención y del aprendizaje.
- Alteraciones en la velocidad de respuesta y reacción.

Las actividades que realizan los enfermeros en la atención directa al paciente, requieren recolectar información para conocer la calidad del servicio, evaluar y a partir de la cual se elaboran los planes, se toman las decisiones estratégicas, se corrigen los procesos. ¿Qué instrumento utilizaría para recolectar información?

Respuestas:

- **Lista de cotejo.**

- Observación.
- El histograma.
- Encuesta.

Paciente acude a emergencia producto de un accidente de tránsito, a la valoración de enfermería presenta deterioro neurológico progresivo, abre los ojos a estímulos dolorosos, emite palabras mal articuladas con sonidos incomprensibles y a la respuesta motora una extensión hipertónica, rígida. ¿Qué puntuación en la escala de Glasgow tiene este paciente?

Respuestas:

- **Glasgow 6 puntos.**

- Glasgow 3 puntos.

- Glasgow 4 puntos.

- Glasgow 7 puntos.

Seleccione los escenarios de atención indicados en el componente de provisión de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud:

1. Atención pre hospitalaria

2. Atención individual

3. Atención familiar

4. Atención extramural

5. Atención a la comunidad

6. Atención al ambiente o entorno natural

Respuestas:

- **2, 3, 5, 6**

- 1, 2, 4, 6

- 2, 3, 4, 5

- 3, 4, 5, 6

De la siguiente lista de posiciones anatómicas, ¿Cuál es la indicada para realizar una intubación endotraqueal?

Respuestas:

- **Roser o Proetz.**

- Posición de Kraske.
- Trendelenburg.
- Decúbito supino o dorsal.

Paciente de 54 años, acude al servicio de emergencia por presentar tiraje intercostal, fatiga, tos esporádica, malestar general y saturación de O₂ de 80%. ¿Qué etiqueta diagnóstica enfermero se debe priorizar en el caso propuesto?

Respuestas:

- **Deterioro de la ventilación espontánea.**

- Patrón respiratorio ineficaz.
- Disminución del gasto cardíaco.
- Intolerancia a la actividad.

En relación con el concepto de claves obstétricas, identifique la respuesta correcta:

Respuestas:

- **Es un sistema de “roles y funciones” que permiten la comunicación efectiva y el trabajo coordinado.**

- La aplicación efectiva del protocolo requiere de simulaciones periódicas que se facilitan dada la utilidad operativa del mismo.
- Las claves obstétricas, están conformados por profesionales de la salud capacitados en estas claves que en un accionar coordinado buscan prevenir la muerte materna.
- Se han seleccionado 3 claves obstétricas en función de las 3 principales causas de mortalidad materna en el Ecuador.



En la visita domiciliaria de enfermería detecta un grupo de pacientes con hábitos de tabaquismo, como parte de su trabajo, sus pacientes establecen un compromiso individual y grupal por modificar este hábito. ¿Cuál de las siguientes tiene mayor aplicabilidad en la situación antes expuesta?

Respuestas:

- **Teoría de Nola J. Pender.**

- Teoría de Hidelgard E. Peplau.
- Filosofía de Florence Nightingale.
- Filosofía de Virginia Henderson.

En un paciente con crisis hipertiroidea, la etiqueta diagnóstica de enfermería es: Termorregulación ineficaz. ¿Cuál de las intervenciones es la correcta en este caso?

Respuestas:

- **Mantener al paciente en un ambiente frío.**

- Impedir la exposición al frío y corrientes de aire.
- Proporcionar otra cobija al paciente.
- Estimular el uso de fuentes de calor externas.

En el servicio de pediatría, se recibe un paciente en post operatorio inmediato de ostomía, al evaluar la posibilidad de que el sistema colector que se va a colocar mantenga un sello seguro y evite la filtración del afluente por debajo de la barrera del sistema. ¿A qué característica de valoración corresponde?

Respuestas:

- **Altura de ostomía.**

- Tipo de ostomía.
- Viabilidad de ostomía.
- Construcción de ostomía.



Paciente de 70 años, atendida en traumatología, se encuentra en el postoperatorio inmediato de artroplastia total de cadera derecha. Al momento de la valoración: alerta, TA=130/80 mmHg, FC=90X', FR=20X', apósito de herida quirúrgica ligeramente manchado de líquido serohemático, drenaje por hemovac 50ml, llenado capilar de miembros inferiores menor de 2 segundos. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en este caso?

Respuestas:

- **Mantener miembros inferiores en abducción.**

- Realizar curación de la herida quirúrgica.
- Controlar las características del drenaje.
- Monitorizar los signos vitales cada 30 minutos.

Seleccione las manifestaciones clínicas que corresponden a la pérdida del tono muscular como cambio característico indicativo de muerte clínica inminente:

1. Dificultad para hablar.
2. Pulso más lento y débil.
3. Dificultad para tragar.
4. Incontinencia urinaria.
5. Disminución de la sensibilidad.
6. Disminución de la Presión Arterial.

Respuestas:

- **1, 3, 4**

- 1, 5, 6

- 2, 3, 5

- 2, 4, 6



Seleccione los elementos que conforman el componente de Provisión de Servicios del MAIS-FCI:

1. Conjunto de prestaciones por ciclos de vida.
2. Niveles de atención.
3. Escenarios de atención.
4. Modalidades de atención.
5. Organización de los equipos de Atención Integral de Salud.
6. Grupos de población a quienes se entregará la atención.

Respuestas:

- **1, 3, 4, 6**

- 1, 2, 3, 6

- 2, 3, 4, 5

- 1, 2, 4, 5

Paciente hospitalizado en el servicio de Neurocirugía con diagnóstico de Trauma Craneoencefálico severo. A la valoración de enfermería usted observa que el paciente se encuentra somnoliento, y en la monitorización se determina presión intracraneal elevada, para el tratamiento el médico le prescribe administrar una solución hipertónica. ¿Cuál es la solución que usted prepararía?

Respuestas:

- **Solución Salina al 9%**

- Solución Salina al 0.9%

- Solución de Lactato Ringer

- Solución Salina al 0.45%

Paciente permanece hospitalizado en el área crítica con ventilación mecánica invasiva, una de las funciones de enfermería en este paciente es manejar el tubo endotraqueal para evitar complicaciones como la micro-aspiración y prevenir la neumonía asociada por la ventilación. ¿Cuál es el método principal que utiliza para evitar estas complicaciones?

Respuestas:

- **Comprobar con el Endotest.**

- Medir con la Capnografía.

- Valorar con la oximetría de pulso.

- Utilizar métodos cololímetros.



Al valorar un paciente con antecedentes de tumor hepático, con coloración amarillo-verdosa de la piel, usted se encuentra ante una disfunción hepática conocida como:

Respuestas:

- Ictericia obstructiva.

- Hiperbilirrubinemia hereditaria.
- Ictericia hepatocelular.
- Ictericia hemolítica.

Usted como líder de Enfermería del servicio de Pediatría, debe efectuar el cálculo de personal de enfermería para la atención directa a pacientes de este servicio. Teniendo presente que este es un servicio hospitalario y de especialidad. ¿Cuáles son las horas necesarias de atención de enfermería directa en 24 horas de acuerdo con el indicador del servicio?

Respuestas:

- 5 horas.

- 8 horas.
- 4 horas.
- 10 horas.

Las políticas integrales de salud del adulto mayor del Ministerio de Salud Pública, establecen las principales causas de muerte en adultos mayores de 65 años en adelante. ¿Cuál es la causa número 1 de muerte?

Respuestas:

- Insuficiencia Cardíaca.

- Neumonía de órgano no especificado.
- Infarto agudo de miocardio.
- Hipertensión arterial.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001

Paciente de 55 años de sexo masculino, acude al área de emergencia por presentar: anorexia, sudoración nocturna y baja de peso además de tos productiva, con 1 mes de evolución, con antecedentes de diagnóstico de tuberculosis, drogoresistente hace 5 años. Recibe tratamiento de tuberculosis primera fase. Sus signos vitales son: T: 40 °C; FC: 95/min; TA: 110/90mmHg; FR 22/min; Sat.O2: 94%. En el examen de laboratorio complementario se diagnostica tuberculosis, en la tomografía de tórax se observan condensaciones con excavaciones, post-primaria. Además, en la prueba de fármaco presenta resistencia a fluoroquinolona y a los tres medicamentos inyectables de segunda línea. ¿Cuál es el tipo de resistencia de los medicamentos, basado en este caso?

Respuestas:

- **Extensamente resistente (XDR).**
- Monorresistencia.
- Multidrogoresistencia (MDR).
- Polirresistencia.

La norma de atención a la adolescente embarazada que se refiere a proporcionar un horario de atención que favorezca la concurrencia al control prenatal, es una característica:

Respuestas:

- **Afectiva.**
- Precoz.
- Periódico.
- Integral.

Identifique los criterios del Dengue Grave:

Respuestas:

- **Choque, disnea y alteración del nivel de conciencia.**
- Fiebre, exantemas y leucopenia.
- Artralgia, vómitos y prueba de torniquete positiva.
- Dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas y hepatomegalia.

¿Cuál es el orden de la cadena de supervivencia en un paro cardíaco intrahospitalario?

1. Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias.

2. RCP de calidad inmediata.

3. Desfibrilación rápida.

4. Vigilancia y prevención.

5. Soporte vital avanzado y cuidados pos paro cardíaco.

Respuestas:

- 4, 1, 2, 3, 5

- 1, 2, 3, 4, 5

- 1, 3, 2, 4, 5

- 2, 3, 1, 4, 5

Paciente masculino de 50 años, acude al Centro de Salud por presentar cefaleas frecuentes y persistentes sin antecedentes patológicos conocidos. El profesional en Enfermería de la sala de preparación valora los signos vitales: TA =160/95 mmHg, FC = 78 lpm, FR = 18 por minuto, T = 36,5 grados centígrados, SPO2=99%, esta incluye la medición cuidadosa de la presión arterial de manera sistemática. ¿Cuál sería la conducta que debe seguir el profesional en Enfermería en el control de la Tensión arterial (TA)?

Respuestas:

- Tomar dos lecturas de la tensión arterial (TA) con una diferencia de 1 a 2 minutos en cada medición.

- Tomar tres lecturas de la tensión arterial (TA) con una diferencia de 5 a 10 minutos en cada medición.

- Tomar dos lecturas de la tensión arterial (TA) de 3 a 5 minutos en cada medición con el paciente acostado e indicarle que haga silencio.

- Tomar dos lecturas de la tensión arterial (TA) con una diferencia de 3 a 5 minutos en cada medición.

Paciente de 40 años con diagnóstico de insuficiencia cardiaca, le prescribe un diurético tiacídico para disminuir el edema de miembros inferiores ¿Qué cuidado de enfermería se debe realizar con este paciente?

Respuestas:

- Administrar dieta rica en potasio.

- Administrar el diurético en la noche.
- Incrementar el consumo de sodio en la dieta para restituir las pérdidas electrolíticas.
- Vigilar la aparición de hipoglicemia.

De las siguientes opciones. ¿Cuál se refiere al liderazgo transaccional?

Respuestas:

- Apela a los intereses, en especial a las necesidades básicas de los seguidores; promete recompensas.

- Hace que sus seguidores trabajen para realizar la misión, para lograr eso, afecta sus emociones al alentarlos e inspirarlos.
- Tiene la habilidad de crear y comunicar una visión realista creíble y atractiva del futuro, que mejora la situación actual.
- Usa muy poco el poder, si es que realmente lo usa alguna vez, y da a sus subordinados un alto grado de independencia en sus operaciones.

Para el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, el primer objetivo es el fin de la pobreza; seleccione las metas de este objetivo:

- 1. Formulación de políticas donde se creen entornos propicios para generar oportunidades de empleo.**
- 2. Promover una mejor salud para todos, especialmente para los más vulnerables.**
- 3. Que todas las personas pueden acceder a los servicios de salud de calidad.**
- 4. Poner en práctica a nivel nacional sistemas apropiadas de protección social para todos.**
- 5. Elevar la productividad económica mediante la modernización tecnológica y la innovación.**
- 6. En el sector privado promover oportunidades económicas (microempresas).**

Respuestas:

- 1, 4, 6

- 2, 3, 5

- 2, 3, 6

- 1, 5, 6

En una investigación realizada para determinar la eficacia de la aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de la úlcera en pie diabético. ¿Cuál es el tipo de estudio que va a utilizar?

Respuestas:

- **Descriptivo.**

- Exploratorio.

- Explicativo.

- Correlacional.

La unidad de salud llevó a cabo un estudio de casos sobre las enfermedades crónicas existentes en la comunidad. Los resultados demuestran que el 20% de la población padece Diabetes Mellitus tipo II y el 15% Hipertensión Arterial Crónica. En base a los datos mencionados se realiza seguimiento y control continuo a los pacientes a través de visitas domiciliarias, para la vigilancia, control y cumplimiento estricto del tratamiento farmacológico y no farmacológico en la prevención de complicaciones. ¿Qué tipo de prevención de salud está aplicando en la comunidad?

Respuestas:

- **Prevención secundaria.**

- Prevención primaria.

- Prevención terciaria.

- Promoción de la salud.

Paciente femenina de 40 años que acude al servicio de Emergencias, por presentar quemadura de 3er grado con 92% de la superficie corporal con daño pulmonar térmica. En el esquema de priorización base en la necesidad de atención y posibilidad de supervivencia. ¿A qué categoría corresponde el caso?

Respuestas:

- **Expectante.**

- Demorada.

- Menor.

- Inmediata.



Seleccione los atributos que debe tener una atención a domicilio por parte de los profesionales de enfermería gestores de casos:

- 1. Personalización del servicio de atención.**
- 2. Mayor accesibilidad de pacientes y cuidadores a los profesionales, minimizando barreras.**
- 3. Garantizar el uso adecuado del material de ayudas técnicas para el cuidado.**
- 4. Cuidadora familiar incluida como usuario dentro de la cartera de servicios de la Atención Primaria.**
- 5. Efectividad en la capacidad de respuesta del servicio de atención domiciliaria.**
- 6. Facilitar la mejora de la atención domiciliaria al equipo de atención primaria.**

Respuestas:

- **1, 2, 4, 5**
- 2, 3, 5, 6
- 1, 3, 4, 5
- 2, 4, 5, 6

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001



Seleccione los postulados del modelo de Enfermería Comunitaria que se deben aplicar con el objetivo de alcanzar un alto nivel de salud en los miembros de la comunidad:

- 1. Apropiación de los conocimientos en salud.**
- 2. Adopción de hábitos y conductas saludables.**
- 3. Establecimiento de la relación enfermera-comunidad.**
- 4. Culturización de la salud.**
- 5. Participación ciudadana.**
- 6. Valorar el estado de salud y los factores del entorno.**

Respuestas:

- **1, 2, 4, 5**
- 2, 3, 5, 6
- 1, 3, 4, 5
- 2, 4, 5, 6

Enfermera/o del centro de salud, necesita medir las condiciones de vida familiar y comunitario. ¿Cuáles son las variables que debe usar para medir estas condiciones?

Respuestas:

- **Índice de desarrollo humano, distribución de ingresos y medir la pobreza.**
- Indicadores sanitarios, medioambientales, sociodemográficos.
- Saber leer y escribir, conocimientos básicos de salud.
- Miembros de la familia, parentesco, riesgo individual, familiar y comunitario.

Este documento se encuentra sujeto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad, no divulgación de la información y consentimiento informado.

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Quito - Ecuador

Código postal: 170702/ Quito - Ecuador

Teléfono: PBX (+593 2) 3825800 Ext. 1001