

Banco de 500 preguntas tipo CACES - Psicología Clínica

Material de practica generado a partir de la estructura conceptual de Psicología Clínica y bibliografía referencial subidas por el usuario, usando como molde general el estilo de bancos CACES de Enfermería. No reproduce preguntas oficiales; son preguntas originales para entrenamiento.

Distribucion por ponderacion

Intervenciones clinicas y fundamentos de psicoterapia: 135 preguntas

Evaluacion psicologica y psicodiagnostico: 120 preguntas

Fundamentos de psicopatologia en la Psicología: 100 preguntas

Etica, deontologia y marco legal: 95 preguntas

Intervenciones psicosociales desde la Psicología: 50 preguntas

Intervenciones clinicas y fundamentos de psicoterapia

1. **[Media] Psicoterapia.** Una persona adulta acude por conflictos repetidos con su pareja y desea comprender patrones emocionales que se repiten en sus relaciones. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?
 - A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
 - B. iniciar un proceso psicoterapeutico con objetivos clinicos claros
 - C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - D. derivar sin contencion ni valoracion inicial
2. **[Facil] Asesoramiento.** Una estudiante universitaria solicita orientacion para tomar decisiones academicas ante estres leve y dudas vocacionales, sin sintomas psicopatologicos graves. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?
 - A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
 - B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - C. brindar asesoramiento focalizado y orientacion psicologica
 - D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
3. **[Dificil] Intervencion en crisis.** Una mujer llega a consulta minutos despues de presenciar un accidente grave; llora, tiembla, esta desorientada y dice que no puede respirar. Cual seria la prioridad clinica?
 - A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
 - B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
 - C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
 - D. aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata
4. **[Media] Rol del psicologo clinico en grupos.** En un grupo terapeutico, dos participantes discuten intensamente y el clima grupal se vuelve tenso. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?
 - A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
 - B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
 - C. facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal
 - D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
5. **[Facil] Grupos de contencion emocional.** Tras una emergencia institucional, se organiza un espacio grupal para estudiantes afectados emocionalmente. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?
 - A. crear un grupo de contencion emocional
 - B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
 - D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
6. **[Dificil] Grupos psicoeducativos.** Una comunidad solicita informacion para reconocer senales de ansiedad y estrategias basicas de afrontamiento. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?
 - A. organizar un grupo psicoeducativo
 - B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
 - D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
7. **[Media] Grupos psicoterapeuticos.** Un centro de salud propone un espacio continuo para pacientes con dificultades interpersonales que buscan cambio emocional profundo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?
 - A. planificar un grupo psicoterapeutico
 - B. trabajar sin consentimiento informado
 - C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
8. **[Facil] Fase inicial.** En la primera sesion, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones basicas del proceso. Cual es la opcion mas pertinente?
 - A. establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre
 - B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
 - D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
9. **[Dificil] Fase media.** El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican tecnicas para modificar patrones de pensamiento, emocion y conducta. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual seria la prioridad clinica?
 - A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
 - B. ejecutar el plan de intervencion
 - C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
 - D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

- 10. [Media] Fase final.** El paciente alcanzo los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaídas. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?
- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
 - B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - C. realizar cierre y seguimiento
 - D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- 11. [Facil] Motivo de consulta-demanda.** Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?
- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
 - B. diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica
 - C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
 - D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- 12. [Dificil] Encuadre psicoterapeutico.** Antes de iniciar el tratamiento, el psicologo explica horarios, confidencialidad, honorarios, limites y modalidad de trabajo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?
- A. establecer encuadre psicoterapeutico
 - B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
 - C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- 13. [Media] Objetivos de intervencion.** Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. Cual seria la prioridad clinica?
- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
 - B. definir objetivos de intervencion
 - C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
 - D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- 14. [Facil] Psicoterapia.** Un paciente consulta por malestar emocional persistente, dificultad para manejar pensamientos negativos y problemas en sus vinculos. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual seria la prioridad clinica?
- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - B. realizar psicoterapia orientada a la comprension y modificacion de patrones
 - C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- 15. [Dificil] Asesoramiento.** Un padre consulta por pautas para mejorar comunicacion familiar sin presencia de crisis ni trastorno mental identificado. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?
- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
 - B. trabajar sin consentimiento informado
 - C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - D. realizar consejeria psicologica orientativa
- 16. [Media] Intervencion en crisis.** Un adolescente fue victima de violencia reciente y presenta agitacion, bloqueo emocional y miedo intenso. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?
- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
 - B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
 - D. priorizar contencion, seguridad y evaluacion de riesgo
- 17. [Facil] Rol del psicologo clinico en grupos.** Durante una sesion grupal, un integrante monopoliza la palabra e impide la participacion de otros. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?
- A. trabajar sin consentimiento informado
 - B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
 - D. regular la dinamica y favorecer participacion equilibrada
- 18. [Dificil] Grupos de contencion emocional.** Un equipo de salud vivio la muerte inesperada de un paciente y requiere un espacio breve de apoyo. Cual es la accion mas adecuada?
- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
 - B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
 - C. implementar contencion emocional grupal
 - D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

19. [Media] Grupos psicoeducativos. Familiares de pacientes con depresión desean aprender sobre síntomas, adherencia y apoyo familiar. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. derivar sin contención ni valoración inicial
- D. realizar psicoeducación grupal

20. [Facil] Grupos psicoterapéuticos. Un grupo cerrado de adultos trabaja objetivos clínicos compartidos durante varias sesiones estructuradas. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. mantener proceso psicoterapéutico grupal
- B. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

21. [Difícil] Fase inicial. En la primera sesión, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones básicas del proceso. En el caso se observa impacto funcional. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. derivar sin contención ni valoración inicial
- C. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. establecer alianza, evaluación inicial y encuadre

22. [Media] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican técnicas para modificar patrones de pensamiento, emoción y conducta. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. ejecutar el plan de intervención
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- C. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. derivar sin contención ni valoración inicial

23. [Facil] Fase final. El paciente alcanza los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaídas. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. realizar cierre y seguimiento
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa

24. [Difícil] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- B. diferenciar motivo manifiesto y demanda clínica
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa

25. [Media] Encuadre psicoterapéutico. Antes de iniciar el tratamiento, el psicólogo explica horarios, confidencialidad, honorarios, límites y modalidad de trabajo. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- C. establecer encuadre psicoterapéutico
- D. trabajar sin consentimiento informado

26. [Facil] Objetivos de intervención. Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. En el caso se observa impacto funcional. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- D. definir objetivos de intervención

27. [Difícil] Psicoterapia. Una persona adulta acude por conflictos repetidos con su pareja y desea comprender patrones emocionales que se repiten en sus relaciones. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- B. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- C. iniciar un proceso psicoterapéutico con objetivos clínicos claros

D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

28. [Media] Asesoramiento. Una estudiante universitaria solicita orientacion para tomar decisiones academicas ante estres leve y dudas vocacionales, sin sintomas psicopatologicos graves. Cual seria la prioridad clinica?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. brindar asesoramiento focalizado y orientacion psicologica
- D. trabajar sin consentimiento informado

29. [Facil] Intervencion en crisis. Una mujer llega a consulta minutos despues de presenciar un accidente grave; llora, tiembla, esta desorientada y dice que no puede respirar. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

30. [Dificil] Rol del psicologo clinico en grupos. En un grupo terapeutico, dos participantes discuten intensamente y el clima grupal se vuelve tenso. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

31. [Media] Grupos de contencion emocional. Tras una emergencia institucional, se organiza un espacio grupal para estudiantes afectados emocionalmente. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. crear un grupo de contencion emocional

32. [Facil] Grupos psicoeducativos. Una comunidad solicita informacion para reconocer senales de ansiedad y estrategias basicas de afrontamiento. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. organizar un grupo psicoeducativo
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

33. [Dificil] Grupos psicoterapeuticos. Un centro de salud propone un espacio continuo para pacientes con dificultades interpersonales que buscan cambio emocional profundo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. planificar un grupo psicoterapeutico
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

34. [Media] Fase inicial. En la primera sesion, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones basicas del proceso. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre

35. [Facil] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican tecnicas para modificar patrones de pensamiento, emocion y conducta. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. ejecutar el plan de intervencion
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

36. [Dificil] Fase final. El paciente alcanza los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaidas. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. realizar cierre y seguimiento

37. [Media] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica

38. [Facil] Encuadre psicoterapeutico. Antes de iniciar el tratamiento, el psicologo explica horarios, confidencialidad, honorarios, limites y modalidad de trabajo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. establecer encuadre psicoterapeutico
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

39. [Dificil] Objetivos de intervencion. Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. definir objetivos de intervencion
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

40. [Media] Psicoterapia. Un paciente consulta por malestar emocional persistente, dificultad para manejar pensamientos negativos y problemas en sus vinculos. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. realizar psicoterapia orientada a la comprension y modificacion de patrones

41. [Facil] Asesoramiento. Un padre consulta por pautas para mejorar comunicacion familiar sin presencia de crisis ni trastorno mental identificado. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. realizar consejeria psicologica orientativa
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

42. [Dificil] Intervencion en crisis. Un adolescente fue victima de violencia reciente y presenta agitacion, bloqueo emocional y miedo intenso. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. priorizar contencion, seguridad y evaluacion de riesgo
- D. trabajar sin consentimiento informado

43. [Media] Rol del psicologo clinico en grupos. Durante una sesion grupal, un integrante monopoliza la palabra e impide la participacion de otros. Que procedimiento corresponde?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. regular la dinamica y favorecer participacion equilibrada

44. [Facil] Grupos de contencion emocional. Un equipo de salud vivio la muerte inesperada de un paciente y requiere un espacio breve de apoyo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. implementar contencion emocional grupal
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

45. [Dificil] Grupos psicoeducativos. Familiares de pacientes con depresion desean aprender sobre sintomas, adherencia y apoyo familiar. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. trabajar sin consentimiento informado

- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. realizar psicoeducación grupal

46. [Media] Grupos psicoterapéuticos. Un grupo cerrado de adultos trabaja objetivos clínicos compartidos durante varias sesiones estructuradas. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- B. mantener proceso psicoterapéutico grupal
- C. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

47. [Facil] Fase inicial. En la primera sesión, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones básicas del proceso. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. establecer alianza, evaluación inicial y encuadre
- D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

48. [Difícil] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican técnicas para modificar patrones de pensamiento, emoción y conducta. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. ejecutar el plan de intervención
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión

49. [Media] Fase final. El paciente alcanza los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaídas. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. realizar cierre y seguimiento
- C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

50. [Facil] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. diferenciar motivo manifiesto y demanda clínica

51. [Difícil] Encuadre psicoterapéutico. Antes de iniciar el tratamiento, el psicólogo explica horarios, confidencialidad, honorarios, límites y modalidad de trabajo. En el caso se observa impacto funcional. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- B. establecer encuadre psicoterapéutico
- C. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa

52. [Media] Objetivos de intervención. Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. derivar sin contención ni valoración inicial
- B. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- C. definir objetivos de intervención
- D. trabajar sin consentimiento informado

53. [Facil] Psicoterapia. Una persona adulta acude por conflictos repetidos con su pareja y desea comprender patrones emocionales que se repiten en sus relaciones. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- B. iniciar un proceso psicoterapéutico con objetivos clínicos claros
- C. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión

54. [Difícil] Asesoramiento. Una estudiante universitaria solicita orientación para tomar decisiones académicas ante estrés leve y dudas vocacionales, sin síntomas psicopatológicos graves. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. brindar asesoramiento focalizado y orientación psicológica

- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. trabajar sin consentimiento informado

55. [Media] Intervencion en crisis. Una mujer llega a consulta minutos despues de presenciar un accidente grave; llora, tiembla, esta desorientada y dice que no puede respirar. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

56. [Facil] Rol del psicologo clinico en grupos. En un grupo terapeutico, dos participantes discuten intensamente y el clima grupal se vuelve tenso. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal

57. [Dificil] Grupos de contencion emocional. Tras una emergencia institucional, se organiza un espacio grupal para estudiantes afectados emocionalmente. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. crear un grupo de contencion emocional
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

58. [Media] Grupos psicoeducativos. Una comunidad solicita informacion para reconocer senales de ansiedad y estrategias basicas de afrontamiento. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. organizar un grupo psicoeducativo
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

59. [Facil] Grupos psicoterapeuticos. Un centro de salud propone un espacio continuo para pacientes con dificultades interpersonales que buscan cambio emocional profundo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. planificar un grupo psicoterapeutico
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

60. [Dificil] Fase inicial. En la primera sesion, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones basicas del proceso. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre

61. [Media] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican tecnicas para modificar patrones de pensamiento, emocion y conducta. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. ejecutar el plan de intervencion
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

62. [Facil] Fase final. El paciente alcanzo los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaidas. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. realizar cierre y seguimiento

63. [Dificil] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

- B. diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

64. [Media] Encuadre psicoterapeutico. Antes de iniciar el tratamiento, el psicologo explica horarios, confidencialidad, honorarios, limites y modalidad de trabajo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. establecer encuadre psicoterapeutico

65. [Facil] Objetivos de intervencion. Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. definir objetivos de intervencion

66. [Dificil] Psicoterapia. Un paciente consulta por malestar emocional persistente, dificultad para manejar pensamientos negativos y problemas en sus vinculos. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. realizar psicoterapia orientada a la comprension y modificacion de patrones
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

67. [Media] Asesoramiento. Un padre consulta por pautas para mejorar comunicacion familiar sin presencia de crisis ni trastorno mental identificado. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. realizar consejeria psicologica orientativa

68. [Facil] Intervencion en crisis. Un adolescente fue victima de violencia reciente y presenta agitacion, bloqueo emocional y miedo intenso. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. priorizar contencion, seguridad y evaluacion de riesgo
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

69. [Dificil] Rol del psicologo clinico en grupos. Durante una sesion grupal, un integrante monopoliza la palabra e impide la participacion de otros. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. regular la dinamica y favorecer participacion equilibrada

70. [Media] Grupos de contencion emocional. Un equipo de salud vivio la muerte inesperada de un paciente y requiere un espacio breve de apoyo. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. implementar contencion emocional grupal
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

71. [Facil] Grupos psicoeducativos. Familiares de pacientes con depresion desean aprender sobre sintomas, adherencia y apoyo familiar. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. realizar psicoeducacion grupal

72. [Dificil] Grupos psicoterapeuticos. Un grupo cerrado de adultos trabaja objetivos clinicos compartidos durante varias sesiones estructuradas. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. mantener proceso psicoterapeutico grupal

- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

73. [Media] Fase inicial. En la primera sesion, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones basicas del proceso. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

74. [Facil] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican tecnicas para modificar patrones de pensamiento, emocion y conducta. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. ejecutar el plan de intervencion

75. [Dificil] Fase final. El paciente alcanzo los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaidas. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. realizar cierre y seguimiento

76. [Media] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

77. [Facil] Encuadre psicoterapeutico. Antes de iniciar el tratamiento, el psicologo explica horarios, confidencialidad, honorarios, limites y modalidad de trabajo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. establecer encuadre psicoterapeutico

78. [Dificil] Objetivos de intervencion. Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. definir objetivos de intervencion

79. [Media] Psicoterapia. Una persona adulta acude por conflictos repetidos con su pareja y desea comprender patrones emocionales que se repiten en sus relaciones. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. iniciar un proceso psicoterapeutico con objetivos clinicos claros
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

80. [Facil] Asesoramiento. Una estudiante universitaria solicita orientacion para tomar decisiones academicas ante estres leve y dudas vocacionales, sin sintomas psicopatologicos graves. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. brindar asesoramiento focalizado y orientacion psicologica
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

81. [Dificil] Intervencion en crisis. Una mujer llega a consulta minutos despues de presenciar un accidente grave; llora, tiembla, esta desorientada y dice que no puede respirar. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

82. [Media] Rol del psicologo clinico en grupos. En un grupo terapeutico, dos participantes discuten intensamente y el clima grupal se vuelve tenso. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. trabajar sin consentimiento informado

83. [Facil] Grupos de contencion emocional. Tras una emergencia institucional, se organiza un espacio grupal para estudiantes afectados emocionalmente. Cual es la accion mas adecuada?

- A. crear un grupo de contencion emocional
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

84. [Dificil] Grupos psicoeducativos. Una comunidad solicita informacion para reconocer senales de ansiedad y estrategias basicas de afrontamiento. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. organizar un grupo psicoeducativo
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

85. [Media] Grupos psicoterapeuticos. Un centro de salud propone un espacio continuo para pacientes con dificultades interpersonales que buscan cambio emocional profundo. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. planificar un grupo psicoterapeutico
- D. trabajar sin consentimiento informado

86. [Facil] Fase inicial. En la primera sesion, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones basicas del proceso. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

87. [Dificil] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican tecnicas para modificar patrones de pensamiento, emocion y conducta. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. ejecutar el plan de intervencion
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

88. [Media] Fase final. El paciente alcanzo los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaidas. Cual es la accion mas adecuada?

- A. realizar cierre y seguimiento
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

89. [Facil] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

- 90. [Difícil] Encuadre psicoterapéutico.** Antes de iniciar el tratamiento, el psicólogo explica horarios, confidencialidad, honorarios, límites y modalidad de trabajo. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál sería la prioridad clínica?
- A. establecer encuadre psicoterapéutico
 - B. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
 - C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- 91. [Media] Objetivos de intervención.** Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - C. trabajar sin consentimiento informado
 - D. definir objetivos de intervención
- 92. [Fácil] Psicoterapia.** Un paciente consulta por malestar emocional persistente, dificultad para manejar pensamientos negativos y problemas en sus vínculos. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - B. realizar psicoterapia orientada a la comprensión y modificación de patrones
 - C. trabajar sin consentimiento informado
 - D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- 93. [Difícil] Asesoramiento.** Un padre consulta por pautas para mejorar comunicación familiar sin presencia de crisis ni trastorno mental identificado. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?
- A. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
 - B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - C. trabajar sin consentimiento informado
 - D. realizar consejería psicológica orientativa
- 94. [Media] Intervención en crisis.** Un adolescente fue víctima de violencia reciente y presenta agitación, bloqueo emocional y miedo intenso. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - B. priorizar contención, seguridad y evaluación de riesgo
 - C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
 - D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- 95. [Fácil] Rol del psicólogo clínico en grupos.** Durante una sesión grupal, un integrante monopoliza la palabra e impide la participación de otros. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?
- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
 - B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - C. trabajar sin consentimiento informado
 - D. regular la dinámica y favorecer participación equilibrada
- 96. [Difícil] Grupos de contención emocional.** Un equipo de salud vivió la muerte inesperada de un paciente y requiere un espacio breve de apoyo. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la opción más pertinente?
- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
 - B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
 - C. implementar contención emocional grupal
 - D. trabajar sin consentimiento informado
- 97. [Media] Grupos psicoeducativos.** Familiares de pacientes con depresión desean aprender sobre síntomas, adherencia y apoyo familiar. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál sería la prioridad clínica?
- A. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
 - B. realizar psicoeducación grupal
 - C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
 - D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- 98. [Fácil] Grupos psicoterapéuticos.** Un grupo cerrado de adultos trabaja objetivos clínicos compartidos durante varias sesiones estructuradas. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?
- A. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
 - B. derivar sin contención ni valoración inicial
 - C. mantener proceso psicoterapéutico grupal
 - D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

99. [Difícil] Fase inicial. En la primera sesión, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones básicas del proceso. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. establecer alianza, evaluación inicial y encuadre

100. [Media] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican técnicas para modificar patrones de pensamiento, emoción y conducta. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- B. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. ejecutar el plan de intervención

101. [Fácil] Fase final. El paciente alcanza los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaídas. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- B. realizar cierre y seguimiento
- C. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

102. [Difícil] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. diferenciar motivo manifiesto y demanda clínica
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión

103. [Media] Encuadre psicoterapéutico. Antes de iniciar el tratamiento, el psicólogo explica horarios, confidencialidad, honorarios, límites y modalidad de trabajo. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- D. establecer encuadre psicoterapéutico

104. [Fácil] Objetivos de intervención. Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- C. definir objetivos de intervención
- D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

105. [Difícil] Psicoterapia. Una persona adulta acude por conflictos repetidos con su pareja y desea comprender patrones emocionales que se repiten en sus relaciones. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. iniciar un proceso psicoterapéutico con objetivos clínicos claros
- D. trabajar sin consentimiento informado

106. [Media] Asesoramiento. Una estudiante universitaria solicita orientación para tomar decisiones académicas ante estrés leve y dudas vocacionales, sin síntomas psicopatológicos graves. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. brindar asesoramiento focalizado y orientación psicológica
- B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión

107. [Fácil] Intervención en crisis. Una mujer llega a consulta minutos después de presenciar un accidente grave; llora, tiembla, está desorientada y dice que no puede respirar. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. aplicar primeros auxilios psicológicos y estabilización inmediata

- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

108. [Dificil] Rol del psicologo clinico en grupos. En un grupo terapeutico, dos participantes discuten intensamente y el clima grupal se vuelve tenso. Cual es la accion mas adecuada?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

109. [Media] Grupos de contencion emocional. Tras una emergencia institucional, se organiza un espacio grupal para estudiantes afectados emocionalmente. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. crear un grupo de contencion emocional

110. [Facil] Grupos psicoeducativos. Una comunidad solicita informacion para reconocer senales de ansiedad y estrategias basicas de afrontamiento. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. organizar un grupo psicoeducativo

111. [Dificil] Grupos psicoterapeuticos. Un centro de salud propone un espacio continuo para pacientes con dificultades interpersonales que buscan cambio emocional profundo. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. planificar un grupo psicoterapeutico
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

112. [Media] Fase inicial. En la primera sesion, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones basicas del proceso. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre

113. [Facil] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican tecnicas para modificar patrones de pensamiento, emocion y conducta. Que procedimiento corresponde?

- A. ejecutar el plan de intervencion
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

114. [Dificil] Fase final. El paciente alcanza los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaidas. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. realizar cierre y seguimiento
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

115. [Media] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

116. [Facil] Encuadre psicoterapeutico. Antes de iniciar el tratamiento, el psicologo explica horarios, confidencialidad, honorarios, limites y modalidad de trabajo. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. trabajar sin consentimiento informado

- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. establecer encuadre psicoterapeutico
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

117. [Difícil] Objetivos de intervencion. Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. definir objetivos de intervencion
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

118. [Media] Psicoterapia. Un paciente consulta por malestar emocional persistente, dificultad para manejar pensamientos negativos y problemas en sus vinculos. Que procedimiento corresponde?

- A. realizar psicoterapia orientada a la comprension y modificacion de patrones
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

119. [Facil] Asesoramiento. Un padre consulta por pautas para mejorar comunicacion familiar sin presencia de crisis ni trastorno mental identificado. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. realizar consejeria psicologica orientativa
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

120. [Difícil] Intervencion en crisis. Un adolescente fue victima de violencia reciente y presenta agitacion, bloqueo emocional y miedo intenso. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. priorizar contencion, seguridad y evaluacion de riesgo
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

121. [Media] Rol del psicologo clinico en grupos. Durante una sesion grupal, un integrante monopoliza la palabra e impide la participacion de otros. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. regular la dinamica y favorecer participacion equilibrada
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

122. [Facil] Grupos de contencion emocional. Un equipo de salud vivio la muerte inesperada de un paciente y requiere un espacio breve de apoyo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. implementar contencion emocional grupal
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

123. [Difícil] Grupos psicoeducativos. Familiares de pacientes con depresion desean aprender sobre sintomas, adherencia y apoyo familiar. Cual es la accion mas adecuada?

- A. realizar psicoeducacion grupal
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

124. [Media] Grupos psicoterapeuticos. Un grupo cerrado de adultos trabaja objetivos clinicos compartidos durante varias sesiones estructuradas. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. mantener proceso psicoterapeutico grupal
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

125. [Facil] Fase inicial. En la primera sesion, el profesional recoge el motivo de consulta, expectativas, antecedentes y acuerda condiciones basicas del proceso. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

126. [Dificil] Fase media. El proceso ya cuenta con objetivos definidos y se aplican tecnicas para modificar patrones de pensamiento, emocion y conducta. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. ejecutar el plan de intervencion
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

127. [Media] Fase final. El paciente alcanzo los objetivos principales y se planifican sesiones espaciadas para prevenir recaidas. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. realizar cierre y seguimiento
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

128. [Facil] Motivo de consulta-demanda. Una persona dice que consulta porque su familia la obliga, pero durante la entrevista aparece malestar propio por ansiedad. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

129. [Dificil] Encuadre psicoterapeutico. Antes de iniciar el tratamiento, el psicologo explica horarios, confidencialidad, honorarios, limites y modalidad de trabajo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. establecer encuadre psicoterapeutico
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

130. [Media] Objetivos de intervencion. Tras evaluar el caso, se acuerdan metas observables, alcanzables y relacionadas con el problema principal. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. definir objetivos de intervencion
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

131. [Facil] Psicoterapia. Una persona adulta acude por conflictos repetidos con su pareja y desea comprender patrones emocionales que se repiten en sus relaciones. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. iniciar un proceso psicoterapeutico con objetivos clinicos claros

132. [Dificil] Asesoramiento. Una estudiante universitaria solicita orientacion para tomar decisiones academicas ante estres leve y dudas vocacionales, sin sintomas psicopatologicos graves. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. brindar asesoramiento focalizado y orientacion psicologica

133. [Media] Intervencion en crisis. Una mujer llega a consulta minutos despues de presenciar un accidente grave; llora, tiembla, esta desorientada y dice que no puede respirar. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

134. [Facil] Rol del psicologo clinico en grupos. En un grupo terapeutico, dos participantes discuten intensamente y el clima grupal se vuelve tenso. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal

D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

135. [Dificil] Grupos de contencion emocional. Tras una emergencia institucional, se organiza un espacio grupal para estudiantes afectados emocionalmente. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. crear un grupo de contencion emocional
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

Evaluacion psicologica y psicodiagnostico

136. [Media] Pruebas de inteligencia. Un nino presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

137. [Facil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

138. [Dificil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas despues de un traumatismo craneal. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

139. [Media] Pruebas de desarrollo. Un nino de 4 anos presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. utilizar pruebas de desarrollo
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

140. [Facil] Pruebas proyectivas. En una evaluacion clinica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como unico criterio diagnostico. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. emplear pruebas proyectivas como complemento
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

141. [Dificil] Pruebas clinicas. Una paciente presenta sintomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervencion. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. usar una escala clinica validada
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

142. [Media] Entrevista clinica. En la primera consulta, el psicologo explora motivo, antecedentes, sintomas, contexto familiar y recursos personales. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

143. [Facil] Seleccion de instrumentos. El profesional ya tiene hipotesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. trabajar sin consentimiento informado

- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. seleccionar instrumentos pertinentes y validos

144. [Difícil] Devolucion diagnostica. Luego de la evaluacion, el psicologo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. realizar devolucion diagnostica
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

145. [Media] Historia clinica psicologica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolucion y plan de intervencion. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. elaborar historia clinica psicologica

146. [Facil] Hipotesis diagnostica. Con datos aun incompletos, el psicologo plantea explicaciones provisionales que guian nuevas preguntas y pruebas. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. formular hipotesis diagnostica

147. [Difícil] Informe psicologico. Una institucion solicita un documento con motivo de evaluacion, metodologia, resultados, conclusiones y recomendaciones. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. redactar informe psicologico
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

148. [Media] Pruebas de inteligencia. Un nino presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. Cual seria la prioridad clinica?

- A. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

149. [Facil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes

150. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas despues de un traumatismo craneal. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

151. [Media] Pruebas de desarrollo. Un nino de 4 anos presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. utilizar pruebas de desarrollo

152. [Facil] Pruebas proyectivas. En una evaluacion clinica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como unico criterio diagnostico. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

- B. emplear pruebas proyectivas como complemento
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

153. [Difícil] Pruebas clinicas. Una paciente presenta sintomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervencion. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. usar una escala clinica validada
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

154. [Media] Entrevista clinica. En la primera consulta, el psicologo explora motivo, antecedentes, sintomas, contexto familiar y recursos personales. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

155. [Facil] Seleccion de instrumentos. El profesional ya tiene hipotesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. seleccionar instrumentos pertinentes y validos

156. [Difícil] Devolucion diagnostica. Luego de la evaluacion, el psicologo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. realizar devolucion diagnostica
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

157. [Media] Historia clinica psicologica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolucion y plan de intervencion. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. elaborar historia clinica psicologica
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. trabajar sin consentimiento informado

158. [Facil] Hipotesis diagnostica. Con datos aun incompletos, el psicologo plantea explicaciones provisionales que guian nuevas preguntas y pruebas. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. formular hipotesis diagnostica
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

159. [Difícil] Informe psicologico. Una institucion solicita un documento con motivo de evaluacion, metodologia, resultados, conclusiones y recomendaciones. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. redactar informe psicologico
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

160. [Media] Pruebas de inteligencia. Un nino presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada

161. [Facil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

162. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas despues de un traumatismo craneal. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. trabajar sin consentimiento informado

163. [Media] Pruebas de desarrollo. Un nino de 4 anos presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. Que procedimiento corresponde?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. utilizar pruebas de desarrollo

164. [Facil] Pruebas proyectivas. En una evaluacion clinica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como unico criterio diagnostico. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. emplear pruebas proyectivas como complemento

165. [Difícil] Pruebas clinicas. Una paciente presenta sintomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervencion. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. usar una escala clinica validada
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

166. [Media] Entrevista clinica. En la primera consulta, el psicologo explora motivo, antecedentes, sintomas, contexto familiar y recursos personales. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada

167. [Facil] Seleccion de instrumentos. El profesional ya tiene hipotesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. seleccionar instrumentos pertinentes y validos
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

168. [Difícil] Devolucion diagnostica. Luego de la evaluacion, el psicologo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. realizar devolucion diagnostica
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

169. [Media] Historia clinica psicologica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolucion y plan de intervencion. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. elaborar historia clinica psicologica
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

170. [Facil] Hipotesis diagnostica. Con datos aun incompletos, el psicologo plantea explicaciones provisionales que guian nuevas preguntas y pruebas. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. formular hipotesis diagnostica

- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

171. [Difícil] Informe psicológico. Una institucion solicita un documento con motivo de evaluacion, metodologia, resultados, conclusiones y recomendaciones. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. redactar informe psicologico
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

172. [Media] Pruebas de inteligencia. Un niño presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

173. [Facil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes

174. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas despues de un traumatismo craneal. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas

175. [Media] Pruebas de desarrollo. Un niño de 4 años presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. utilizar pruebas de desarrollo
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

176. [Facil] Pruebas proyectivas. En una evaluacion clinica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como unico criterio diagnostico. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. emplear pruebas proyectivas como complemento
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

177. [Difícil] Pruebas clinicas. Una paciente presenta sintomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervencion. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. usar una escala clinica validada

178. [Media] Entrevista clinica. En la primera consulta, el psicologo explora motivo, antecedentes, sintomas, contexto familiar y recursos personales. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

179. [Facil] Seleccion de instrumentos. El profesional ya tiene hipotesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. seleccionar instrumentos pertinentes y validos
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

180. [Difícil] Devolucion diagnostica. Luego de la evaluacion, el psicologo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. realizar devolucion diagnostica

181. [Media] Historia clinica psicologica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolucion y plan de intervencion. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. elaborar historia clinica psicologica
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

182. [Facil] Hipotesis diagnostica. Con datos aun incompletos, el psicologo plantea explicaciones provisionales que guian nuevas preguntas y pruebas. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. formular hipotesis diagnostica

183. [Difícil] Informe psicologico. Una institucion solicita un documento con motivo de evaluacion, metodologia, resultados, conclusiones y recomendaciones. Cual es la accion mas adecuada?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. redactar informe psicologico
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

184. [Media] Pruebas de inteligencia. Un nino presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

185. [Facil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes

186. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas despues de un traumatismo craneal. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas

187. [Media] Pruebas de desarrollo. Un nino de 4 anos presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. utilizar pruebas de desarrollo
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

188. [Facil] Pruebas proyectivas. En una evaluacion clinica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como unico criterio diagnostico. Que procedimiento corresponde?

- A. emplear pruebas proyectivas como complemento
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

189. [Difícil] Pruebas clínicas. Una paciente presenta síntomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervención. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- D. usar una escala clínica validada

190. [Media] Entrevista clínica. En la primera consulta, el psicólogo explora motivo, antecedentes, síntomas, contexto familiar y recursos personales. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- B. realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

191. [Fácil] Selección de instrumentos. El profesional ya tiene hipótesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. En el caso se observa impacto funcional. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. seleccionar instrumentos pertinentes y válidos
- B. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- C. derivar sin contención ni valoración inicial
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

192. [Difícil] Devolución diagnóstica. Luego de la evaluación, el psicólogo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- C. derivar sin contención ni valoración inicial
- D. realizar devolución diagnóstica

193. [Media] Historia clínica psicológica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolución y plan de intervención. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- D. elaborar historia clínica psicológica

194. [Fácil] Hipótesis diagnóstica. Con datos aún incompletos, el psicólogo plantea explicaciones provisionales que guían nuevas preguntas y pruebas. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. formular hipótesis diagnóstica

195. [Difícil] Informe psicológico. Una institución solicita un documento con motivo de evaluación, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. redactar informe psicológico

196. [Media] Pruebas de inteligencia. Un niño presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada
- B. derivar sin contención ni valoración inicial
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

197. [Fácil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- B. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- C. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

D. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes

198. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas después de un traumatismo craneal. ¿Que alternativa responde mejor al caso?

- A. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- D. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas

199. [Media] Pruebas de desarrollo. Un niño de 4 años presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- C. utilizar pruebas de desarrollo
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico

200. [Fácil] Pruebas proyectivas. En una evaluación clínica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como único criterio diagnóstico. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. emplear pruebas proyectivas como complemento
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- D. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos

201. [Difícil] Pruebas clínicas. Una paciente presenta síntomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervención. En el caso se observa impacto funcional. ¿Que alternativa responde mejor al caso?

- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- B. usar una escala clínica validada
- C. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

202. [Media] Entrevista clínica. En la primera consulta, el psicólogo explora motivo, antecedentes, síntomas, contexto familiar y recursos personales. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

203. [Fácil] Selección de instrumentos. El profesional ya tiene hipótesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. ¿Que procedimiento corresponde?

- A. seleccionar instrumentos pertinentes y válidos
- B. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

204. [Difícil] Devolución diagnóstica. Luego de la evaluación, el psicólogo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- B. derivar sin contención ni valoración inicial
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. realizar devolución diagnóstica

205. [Media] Historia clínica psicológica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolución y plan de intervención. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. elaborar historia clínica psicológica
- B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- C. derivar sin contención ni valoración inicial
- D. trabajar sin consentimiento informado

206. [Fácil] Hipótesis diagnóstica. Con datos aún incompletos, el psicólogo plantea explicaciones provisionales que guían nuevas preguntas y pruebas. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. formular hipótesis diagnóstica
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

207. [Difícil] Informe psicológico. Una institución solicita un documento con motivo de evaluación, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- B. redactar informe psicológico
- C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión

208. [Media] Pruebas de inteligencia. Un niño presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa

209. [Fácil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes
- B. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- C. derivar sin contención ni valoración inicial
- D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

210. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas después de un traumatismo craneal. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- C. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- D. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas

211. [Media] Pruebas de desarrollo. Un niño de 4 años presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. En el caso se observa impacto funcional. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- D. utilizar pruebas de desarrollo

212. [Fácil] Pruebas proyectivas. En una evaluación clínica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como único criterio diagnóstico. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. emplear pruebas proyectivas como complemento
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

213. [Difícil] Pruebas clínicas. Una paciente presenta síntomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervención. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. usar una escala clínica validada
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

214. [Media] Entrevista clínica. En la primera consulta, el psicólogo explora motivo, antecedentes, síntomas, contexto familiar y recursos personales. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada
- D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

215. [Fácil] Selección de instrumentos. El profesional ya tiene hipótesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. seleccionar instrumentos pertinentes y válidos

D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

216. [Difícil] Devolucion diagnostica. Luego de la evaluacion, el psicologo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. realizar devolucion diagnostica

217. [Media] Historia clinica psicologica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolucion y plan de intervencion. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. elaborar historia clinica psicologica

218. [Facil] Hipotesis diagnostica. Con datos aun incompletos, el psicologo plantea explicaciones provisionales que guian nuevas preguntas y pruebas. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. formular hipotesis diagnostica
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

219. [Difícil] Informe psicologico. Una institucion solicita un documento con motivo de evaluacion, metodologia, resultados, conclusiones y recomendaciones. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. redactar informe psicologico
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

220. [Media] Pruebas de inteligencia. Un nino presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

221. [Facil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. trabajar sin consentimiento informado

222. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas despues de un traumatismo craneal. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

223. [Media] Pruebas de desarrollo. Un nino de 4 anos presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. Cual seria la prioridad clinica?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. utilizar pruebas de desarrollo
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. trabajar sin consentimiento informado

224. [Facil] Pruebas proyectivas. En una evaluacion clinica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como unico criterio diagnostico. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. emplear pruebas proyectivas como complemento
- C. trabajar sin consentimiento informado

D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

225. [Difícil] Pruebas clinicas. Una paciente presenta sintomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervencion. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. usar una escala clinica validada

226. [Media] Entrevista clinica. En la primera consulta, el psicologo explora motivo, antecedentes, sintomas, contexto familiar y recursos personales. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

227. [Facil] Seleccion de instrumentos. El profesional ya tiene hipotesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. seleccionar instrumentos pertinentes y validos
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

228. [Difícil] Devolucion diagnostica. Luego de la evaluacion, el psicologo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. Que procedimiento corresponde?

- A. realizar devolucion diagnostica
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

229. [Media] Historia clinica psicologica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolucion y plan de intervencion. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. elaborar historia clinica psicologica

230. [Facil] Hipotesis diagnostica. Con datos aun incompletos, el psicologo plantea explicaciones provisionales que guian nuevas preguntas y pruebas. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. formular hipotesis diagnostica
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

231. [Difícil] Informe psicologico. Una institucion solicita un documento con motivo de evaluacion, metodologia, resultados, conclusiones y recomendaciones. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. redactar informe psicologico
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

232. [Media] Pruebas de inteligencia. Un nino presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

233. [Facil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. Cual seria la prioridad clinica?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

234. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas después de un traumatismo craneal. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas
- C. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

235. [Media] Pruebas de desarrollo. Un niño de 4 años presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. utilizar pruebas de desarrollo
- D. derivar sin contención ni valoración inicial

236. [Fácil] Pruebas proyectivas. En una evaluación clínica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como único criterio diagnóstico. En el caso se observa impacto funcional. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. emplear pruebas proyectivas como complemento
- B. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- C. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

237. [Difícil] Pruebas clínicas. Una paciente presenta síntomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervención. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- C. usar una escala clínica validada
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

238. [Media] Entrevista clínica. En la primera consulta, el psicólogo explora motivo, antecedentes, síntomas, contexto familiar y recursos personales. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos

239. [Fácil] Selección de instrumentos. El profesional ya tiene hipótesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- B. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- C. seleccionar instrumentos pertinentes y válidos
- D. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos

240. [Difícil] Devolución diagnóstica. Luego de la evaluación, el psicólogo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. realizar devolución diagnóstica
- B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

241. [Media] Historia clínica psicológica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolución y plan de intervención. En el caso se observa impacto funcional. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. elaborar historia clínica psicológica
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

242. [Fácil] Hipótesis diagnóstica. Con datos aún incompletos, el psicólogo plantea explicaciones provisionales que guían nuevas preguntas y pruebas. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. formular hipotesis diagnostica

243. [Difícil] Informe psicologico. Una institucion solicita un documento con motivo de evaluacion, metodologia, resultados, conclusiones y recomendaciones. Cual seria la prioridad clinica?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. redactar informe psicologico
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

244. [Media] Pruebas de inteligencia. Un nino presenta dificultades escolares generalizadas y se requiere estimar su funcionamiento intelectual. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. aplicar una prueba de inteligencia estandarizada

245. [Facil] Pruebas de personalidad. Una adulta presenta patrones persistentes de inestabilidad interpersonal y se necesita explorar rasgos de personalidad. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. seleccionar pruebas de personalidad pertinentes
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

246. [Difícil] Funciones ejecutivas. Un paciente refiere fallas para planificar, inhibir respuestas y organizar tareas despues de un traumatismo craneal. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

247. [Media] Pruebas de desarrollo. Un nino de 4 anos presenta retraso en lenguaje, juego social limitado y dudas sobre hitos madurativos. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. utilizar pruebas de desarrollo
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

248. [Facil] Pruebas proyectivas. En una evaluacion clinica se busca explorar contenidos emocionales de manera complementaria, sin usar el resultado como unico criterio diagnostico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. emplear pruebas proyectivas como complemento
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

249. [Difícil] Pruebas clinicas. Una paciente presenta sintomas depresivos y se requiere medir severidad antes de iniciar intervencion. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. usar una escala clinica validada

250. [Media] Entrevista clinica. En la primera consulta, el psicologo explora motivo, antecedentes, sintomas, contexto familiar y recursos personales. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

251. [Facil] Seleccion de instrumentos. El profesional ya tiene hipotesis inicial y debe escoger pruebas coherentes con edad, motivo de consulta y objetivo evaluativo. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. seleccionar instrumentos pertinentes y validos
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

252. [Difícil] Devolucion diagnostica. Luego de la evaluacion, el psicologo comunica resultados en lenguaje claro, resuelve dudas y orienta pasos siguientes. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. realizar devolucion diagnostica

253. [Media] Historia clinica psicologica. El profesional registra antecedentes, motivo de consulta, examen mental, evolucion y plan de intervencion. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. elaborar historia clinica psicologica
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

254. [Facil] Hipotesis diagnostica. Con datos aun incompletos, el psicologo plantea explicaciones provisionales que guian nuevas preguntas y pruebas. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. formular hipotesis diagnostica
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

255. [Difícil] Informe psicologico. Una institucion solicita un documento con motivo de evaluacion, metodologia, resultados, conclusiones y recomendaciones. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. redactar informe psicologico
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

Fundamentos de psicopatologia en la Psicologia

256. [Media] Autismo en la ninez. Un nino evita contacto visual, tiene intereses restringidos, dificultad en reciprocidad social y conductas repetitivas desde edades tempranas. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. considerar trastorno del espectro autista

257. [Facil] Trastornos hipercineticos. Un escolar presenta inatencion persistente, impulsividad, inquietud motora y dificultades en casa y escuela. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. sospechar trastorno hipercinetico/TDAH
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

258. [Difícil] Trastorno opositor desafiante. Un nino discute con adultos, desafia normas, se muestra irritable y culpa a otros de sus errores de forma persistente. Cual seria la prioridad clinica?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. considerar trastorno opositor desafiante
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

259. [Media] Anorexia nerviosa. Una adolescente restringe comida, tiene miedo intenso a subir de peso y distorsion de imagen corporal pese a bajo peso. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. identificar anorexia nerviosa
- D. trabajar sin consentimiento informado

260. [Facil] Bulimia nerviosa. Una joven presenta atracones recurrentes seguidos de vomitos autoinducidos y preocupacion excesiva por peso. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. identificar bulimia nerviosa
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

261. [Difícil] Uso de sustancias. Un adolescente consume cannabis con deterioro academico, conflictos familiares y dificultad para controlar el consumo. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. evaluar trastorno por uso de sustancias
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

262. [Media] Trastorno de conducta. Un adolescente participa en robos, agresiones y violaciones graves de normas con escasa culpa. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. considerar trastorno de conducta
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

263. [Facil] Trastornos de personalidad. Una adulta mantiene un patron estable de impulsividad, relaciones intensas e inestables y temor al abandono. Que procedimiento corresponde?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. explorar trastorno de personalidad
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

264. [Difícil] Esquizofrenia. Un adulto escucha voces que comentan sus actos, presenta ideas delirantes y deterioro social progresivo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. sospechar esquizofrenia
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

265. [Media] Trastornos de ansiedad. Una persona presenta preocupacion excesiva, dificil de controlar, tension muscular e insomnio durante varios meses. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. considerar trastorno de ansiedad generalizada
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

266. [Facil] Alzheimer. Un adulto mayor muestra perdida progresiva de memoria reciente, desorientacion y deterioro funcional. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. sospechar demencia tipo Alzheimer
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

267. [Difícil] Trastornos depresivos. Una persona presenta anhedonia, tristeza persistente, fatiga, culpa, insomnio y dificultad para concentrarse por mas de dos semanas. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. considerar episodio depresivo
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

268. [Media] Trastornos de adaptacion. Tras perder el empleo, una persona desarrolla ansiedad y tristeza desproporcionadas que afectan su funcionamiento, sin cumplir criterios de otro trastorno mayor. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. considerar trastorno de adaptacion
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

269. [Facil] Antidepresivos. Un paciente inicia antidepresivo y pregunta por posibles molestias iniciales como nauseas, cefalea o cambios del sueno. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento medico
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

270. [Difícil] Ansiolíticos. Una paciente usa benzodiacepinas por cuenta propia y presenta somnolencia y dependencia psicologica al medicamento. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. advertir riesgos y derivar a evaluacion medica
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

271. [Media] Antipsicoticos. Un paciente con tratamiento antipsicotico presenta rigidez, temblor y lentitud motora. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatria
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

272. [Facil] Estabilizadores del estado de animo. Una persona con trastorno bipolar usa estabilizador del animo y requiere adherencia y monitoreo medico. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

273. [Difícil] Efectos secundarios. Un usuario de psicofarmacos reporta somnolencia, aumento de peso y disminucion de energia que afectan adherencia. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

274. [Media] Autismo en la ninez. Un nino evita contacto visual, tiene intereses restringidos, dificultad en reciprocidad social y conductas repetitivas desde edades tempranas. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. considerar trastorno del espectro autista

275. [Facil] Trastornos hipercineticos. Un escolar presenta inatencion persistente, impulsividad, inquietud motora y dificultades en casa y escuela. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. sospechar trastorno hipercinetico/TDAH

276. [Difícil] Trastorno opositor desafiante. Un nino discute con adultos, desafia normas, se muestra irritable y culpa a otros de sus errores de forma persistente. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. considerar trastorno opositor desafiante
- D. trabajar sin consentimiento informado

277. [Media] Anorexia nerviosa. Una adolescente restringe comida, tiene miedo intenso a subir de peso y distorsion de imagen corporal pese a bajo peso. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. identificar anorexia nerviosa
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

278. [Facil] Bulimia nerviosa. Una joven presenta atracones recurrentes seguidos de vomitos autoinducidos y preocupacion excesiva por peso. Cual es la accion mas adecuada?

- A. identificar bulimia nerviosa

- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

279. [Difícil] Uso de sustancias. Un adolescente consume cannabis con deterioro academico, conflictos familiares y dificultad para controlar el consumo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. evaluar trastorno por uso de sustancias
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

280. [Media] Trastorno de conducta. Un adolescente participa en robos, agresiones y violaciones graves de normas con escasa culpa. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. considerar trastorno de conducta
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

281. [Facil] Trastornos de personalidad. Una adulta mantiene un patron estable de impulsividad, relaciones intensas e inestables y temor al abandono. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. explorar trastorno de personalidad
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. trabajar sin consentimiento informado

282. [Difícil] Esquizofrenia. Un adulto escucha voces que comentan sus actos, presenta ideas delirantes y deterioro social progresivo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. sospechar esquizofrenia
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

283. [Media] Trastornos de ansiedad. Una persona presenta preocupacion excesiva, dificil de controlar, tension muscular e insomnio durante varios meses. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. considerar trastorno de ansiedad generalizada
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

284. [Facil] Alzheimer. Un adulto mayor muestra perdida progresiva de memoria reciente, desorientacion y deterioro funcional. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. sospechar demencia tipo Alzheimer
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

285. [Difícil] Trastornos depresivos. Una persona presenta anhedonia, tristeza persistente, fatiga, culpa, insomnio y dificultad para concentrarse por mas de dos semanas. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. considerar episodio depresivo

286. [Media] Trastornos de adaptacion. Tras perder el empleo, una persona desarrolla ansiedad y tristeza desproporcionadas que afectan su funcionamiento, sin cumplir criterios de otro trastorno mayor. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. considerar trastorno de adaptacion
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

287. [Facil] Antidepresivos. Un paciente inicia antidepresivo y pregunta por posibles molestias iniciales como nauseas, cefalea o cambios del sueno. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

- B. psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento medico
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

288. [Difícil] Ansiolíticos. Una paciente usa benzodiacepinas por cuenta propia y presenta somnolencia y dependencia psicologica al medicamento. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. advertir riesgos y derivar a evaluacion medica

289. [Media] Antipsicoticos. Un paciente con tratamiento antipsicotico presenta rigidez, temblor y lentitud motora. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatria
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

290. [Facil] Estabilizadores del estado de animo. Una persona con trastorno bipolar usa estabilizador del animo y requiere adherencia y monitoreo medico. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales

291. [Difícil] Efectos secundarios. Un usuario de psicofarmacos reporta somnolencia, aumento de peso y disminucion de energia que afectan adherencia. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

292. [Media] Autismo en la ninez. Un nino evita contacto visual, tiene intereses restringidos, dificultad en reciprocidad social y conductas repetitivas desde edades tempranas. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. considerar trastorno del espectro autista

293. [Facil] Trastornos hipercineticos. Un escolar presenta inatencion persistente, impulsividad, inquietud motora y dificultades en casa y escuela. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. sospechar trastorno hipercinetico/TDAH
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

294. [Difícil] Trastorno opositor desafiante. Un nino discute con adultos, desafía normas, se muestra irritable y culpa a otros de sus errores de forma persistente. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. considerar trastorno opositor desafiante
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

295. [Media] Anorexia nerviosa. Una adolescente restringe comida, tiene miedo intenso a subir de peso y distorsion de imagen corporal pese a bajo peso. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. identificar anorexia nerviosa
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

296. [Facil] Bulimia nerviosa. Una joven presenta atracones recurrentes seguidos de vomitos autoinducidos y preocupacion excesiva por peso. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. identificar bulimia nerviosa

- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. trabajar sin consentimiento informado

297. [Difícil] Uso de sustancias. Un adolescente consume cannabis con deterioro academico, conflictos familiares y dificultad para controlar el consumo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. evaluar trastorno por uso de sustancias
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

298. [Media] Trastorno de conducta. Un adolescente participa en robos, agresiones y violaciones graves de normas con escasa culpa. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. considerar trastorno de conducta
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

299. [Facil] Trastornos de personalidad. Una adulta mantiene un patron estable de impulsividad, relaciones intensas e inestables y temor al abandono. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. explorar trastorno de personalidad
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

300. [Difícil] Esquizofrenia. Un adulto escucha voces que comentan sus actos, presenta ideas delirantes y deterioro social progresivo. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. sospechar esquizofrenia
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

301. [Media] Trastornos de ansiedad. Una persona presenta preocupacion excesiva, dificil de controlar, tension muscular e insomnio durante varios meses. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. considerar trastorno de ansiedad generalizada
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

302. [Facil] Alzheimer. Un adulto mayor muestra perdida progresiva de memoria reciente, desorientacion y deterioro funcional. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. sospechar demencia tipo Alzheimer
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

303. [Difícil] Trastornos depresivos. Una persona presenta anhedonia, tristeza persistente, fatiga, culpa, insomnio y dificultad para concentrarse por mas de dos semanas. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. considerar episodio depresivo
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

304. [Media] Trastornos de adaptacion. Tras perder el empleo, una persona desarrolla ansiedad y tristeza desproporcionadas que afectan su funcionamiento, sin cumplir criterios de otro trastorno mayor. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. considerar trastorno de adaptacion
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

305. [Facil] Antidepresivos. Un paciente inicia antidepresivo y pregunta por posibles molestias iniciales como nauseas, cefalea o cambios del sueno. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento medico
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

306. [Difícil] Ansiolíticos. Una paciente usa benzodiacepinas por cuenta propia y presenta somnolencia y dependencia psicologica al medicamento. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. advertir riesgos y derivar a evaluacion medica
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

307. [Media] Antipsicoticos. Un paciente con tratamiento antipsicotico presenta rigidez, temblor y lentitud motora. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatria
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

308. [Facil] Estabilizadores del estado de animo. Una persona con trastorno bipolar usa estabilizador del animo y requiere adherencia y monitoreo medico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

309. [Difícil] Efectos secundarios. Un usuario de psicofarmacos reporta somnolencia, aumento de peso y disminucion de energia que afectan adherencia. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

310. [Media] Autismo en la ninez. Un nino evita contacto visual, tiene intereses restringidos, dificultad en reciprocidad social y conductas repetitivas desde edades tempranas. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. considerar trastorno del espectro autista
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

311. [Facil] Trastornos hipercineticos. Un escolar presenta inatencion persistente, impulsividad, inquietud motora y dificultades en casa y escuela. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. sospechar trastorno hipercinetico/TDAH
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

312. [Difícil] Trastorno opositor desafiante. Un nino discute con adultos, desafia normas, se muestra irritable y culpa a otros de sus errores de forma persistente. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. considerar trastorno opositor desafiante
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

313. [Media] Anorexia nerviosa. Una adolescente restringe comida, tiene miedo intenso a subir de peso y distorsion de imagen corporal pese a bajo peso. Cual es la accion mas adecuada?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. identificar anorexia nerviosa

314. [Facil] Bulimia nerviosa. Una joven presenta atracones recurrentes seguidos de vomitos autoinducidos y preocupacion excesiva por peso. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. identificar bulimia nerviosa
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

315. [Difícil] Uso de sustancias. Un adolescente consume cannabis con deterioro academico, conflictos familiares y dificultad para controlar el consumo. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. evaluar trastorno por uso de sustancias
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. trabajar sin consentimiento informado

316. [Media] Trastorno de conducta. Un adolescente participa en robos, agresiones y violaciones graves de normas con escasa culpa. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. considerar trastorno de conducta
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. trabajar sin consentimiento informado

317. [Facil] Trastornos de personalidad. Una adulta mantiene un patron estable de impulsividad, relaciones intensas e inestables y temor al abandono. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. explorar trastorno de personalidad
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

318. [Difícil] Esquizofrenia. Un adulto escucha voces que comentan sus actos, presenta ideas delirantes y deterioro social progresivo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. sospechar esquizofrenia
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

319. [Media] Trastornos de ansiedad. Una persona presenta preocupacion excesiva, dificil de controlar, tension muscular e insomnio durante varios meses. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. considerar trastorno de ansiedad generalizada
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

320. [Facil] Alzheimer. Un adulto mayor muestra perdida progresiva de memoria reciente, desorientacion y deterioro funcional. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. sospechar demencia tipo Alzheimer
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

321. [Difícil] Trastornos depresivos. Una persona presenta anhedonia, tristeza persistente, fatiga, culpa, insomnio y dificultad para concentrarse por mas de dos semanas. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. considerar episodio depresivo
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

322. [Media] Trastornos de adaptacion. Tras perder el empleo, una persona desarrolla ansiedad y tristeza desproporcionadas que afectan su funcionamiento, sin cumplir criterios de otro trastorno mayor. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. considerar trastorno de adaptacion
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

323. [Facil] Antidepresivos. Un paciente inicia antidepresivo y pregunta por posibles molestias iniciales como nauseas, cefalea o cambios del sueno. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento medico
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

324. [Dificil] Ansioliticos. Una paciente usa benzodiacepinas por cuenta propia y presenta somnolencia y dependencia psicologica al medicamento. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. advertir riesgos y derivar a evaluacion medica
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

325. [Media] Antipsicoticos. Un paciente con tratamiento antipsicotico presenta rigidez, temblor y lentitud motora. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatria
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

326. [Facil] Estabilizadores del estado de animo. Una persona con trastorno bipolar usa estabilizador del animo y requiere adherencia y monitoreo medico. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales

327. [Dificil] Efectos secundarios. Un usuario de psicofarmacos reporta somnolencia, aumento de peso y disminucion de energia que afectan adherencia. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

328. [Media] Autismo en la ninez. Un nino evita contacto visual, tiene intereses restringidos, dificultad en reciprocidad social y conductas repetitivas desde edades tempranas. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. considerar trastorno del espectro autista
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

329. [Facil] Trastornos hipercineticos. Un escolar presenta inatencion persistente, impulsividad, inquietud motora y dificultades en casa y escuela. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. sospechar trastorno hipercinetico/TDAH

330. [Dificil] Trastorno opositor desafiante. Un nino discute con adultos, desafia normas, se muestra irritable y culpa a otros de sus errores de forma persistente. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. considerar trastorno opositor desafiante
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

331. [Media] Anorexia nerviosa. Una adolescente restringe comida, tiene miedo intenso a subir de peso y distorsion de imagen corporal pese a bajo peso. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. identificar anorexia nerviosa
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

332. [Facil] Bulimia nerviosa. Una joven presenta atracones recurrentes seguidos de vomitos autoinducidos y preocupacion excesiva por peso. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

D. identificar bulimia nerviosa

333. [Difícil] Uso de sustancias. Un adolescente consume cannabis con deterioro académico, conflictos familiares y dificultad para controlar el consumo. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- C. evaluar trastorno por uso de sustancias
- D. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos

334. [Media] Trastorno de conducta. Un adolescente participa en robos, agresiones y violaciones graves de normas con escasa culpa. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- B. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- C. considerar trastorno de conducta
- D. derivar sin contención ni valoración inicial

335. [Fácil] Trastornos de personalidad. Una adulta mantiene un patrón estable de impulsividad, relaciones intensas e inestables y temor al abandono. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. explorar trastorno de personalidad
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

336. [Difícil] Esquizofrenia. Un adulto escucha voces que comentan sus actos, presenta ideas delirantes y deterioro social progresivo. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. sospechar esquizofrenia
- B. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

337. [Media] Trastornos de ansiedad. Una persona presenta preocupación excesiva, difícil de controlar, tensión muscular e insomnio durante varios meses. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. considerar trastorno de ansiedad generalizada
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

338. [Fácil] Alzheimer. Un adulto mayor muestra pérdida progresiva de memoria reciente, desorientación y deterioro funcional. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. sospechar demencia tipo Alzheimer
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

339. [Difícil] Trastornos depresivos. Una persona presenta anhedonia, tristeza persistente, fatiga, culpa, insomnio y dificultad para concentrarse por más de dos semanas. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. considerar episodio depresivo
- B. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

340. [Media] Trastornos de adaptación. Tras perder el empleo, una persona desarrolla ansiedad y tristeza desproporcionadas que afectan su funcionamiento, sin cumplir criterios de otro trastorno mayor. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. derivar sin contención ni valoración inicial
- B. considerar trastorno de adaptación
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión

341. [Fácil] Antidepresivos. Un paciente inicia antidepresivo y pregunta por posibles molestias iniciales como náuseas, cefalea o cambios del sueño. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento médico
- B. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

- 342. [Difícil] Ansiolíticos.** Una paciente usa benzodiacepinas por cuenta propia y presenta somnolencia y dependencia psicológica al medicamento. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - B. advertir riesgos y derivar a evaluación médica
 - C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
 - D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- 343. [Media] Antipsicóticos.** Un paciente con tratamiento antipsicótico presenta rigidez, temblor y lentitud motora. ¿Cuál sería la prioridad clínica?
- A. reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatría
 - B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - C. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- 344. [Fácil] Estabilizadores del estado de ánimo.** Una persona con trastorno bipolar usa estabilizador del ánimo y requiere adherencia y monitoreo médico. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
 - B. reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales
 - C. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
 - D. derivar sin contención ni valoración inicial
- 345. [Difícil] Efectos secundarios.** Un usuario de psicofarmacos reporta somnolencia, aumento de peso y disminución de energía que afectan adherencia. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - B. explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor
 - C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
 - D. derivar sin contención ni valoración inicial
- 346. [Media] Autismo en la niñez.** Un niño evita contacto visual, tiene intereses restringidos, dificultad en reciprocidad social y conductas repetitivas desde edades tempranas. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. trabajar sin consentimiento informado
 - B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - C. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
 - D. considerar trastorno del espectro autista
- 347. [Fácil] Trastornos hipercinéticos.** Un escolar presenta inatención persistente, impulsividad, inquietud motora y dificultades en casa y escuela. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. sospechar trastorno hipercinético/TDAH
 - B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
 - C. trabajar sin consentimiento informado
 - D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- 348. [Difícil] Trastorno opositor desafiante.** Un niño discute con adultos, desafía normas, se muestra irritable y culpa a otros de sus errores de forma persistente. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
 - B. derivar sin contención ni valoración inicial
 - C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
 - D. considerar trastorno opositor desafiante
- 349. [Media] Anorexia nerviosa.** Una adolescente restringe comida, tiene miedo intenso a subir de peso y distorsión de imagen corporal pese a bajo peso. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
 - B. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
 - C. identificar anorexia nerviosa
 - D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- 350. [Fácil] Bulimia nerviosa.** Una joven presenta atracones recurrentes seguidos de vómitos autoinducidos y preocupación excesiva por peso. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?
- A. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. identificar bulimia nerviosa

351. [Difícil] Uso de sustancias. Un adolescente consume cannabis con deterioro academico, conflictos familiares y dificultad para controlar el consumo. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. evaluar trastorno por uso de sustancias
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. trabajar sin consentimiento informado

352. [Media] Trastorno de conducta. Un adolescente participa en robos, agresiones y violaciones graves de normas con escasa culpa. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. considerar trastorno de conducta
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

353. [Facil] Trastornos de personalidad. Una adulta mantiene un patron estable de impulsividad, relaciones intensas e inestables y temor al abandono. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. explorar trastorno de personalidad

354. [Difícil] Esquizofrenia. Un adulto escucha voces que comentan sus actos, presenta ideas delirantes y deterioro social progresivo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. sospechar esquizofrenia
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

355. [Media] Trastornos de ansiedad. Una persona presenta preocupacion excesiva, dificil de controlar, tension muscular e insomnio durante varios meses. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. considerar trastorno de ansiedad generalizada
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

Etica, deontologia y marco legal

356. [Difícil] Principios eticos APA. Un psicologo debe decidir entre beneficio del paciente, limites de competencia y proteccion de derechos. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. aplicar principios eticos profesionales
- D. trabajar sin consentimiento informado

357. [Media] Beneficencia. El profesional elige una intervencion con mayor probabilidad de ayudar al paciente y menor carga posible. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. actuar con beneficencia
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

358. [Facil] No maleficencia. Una tecnica puede intensificar el malestar de una persona en crisis si se aplica sin preparacion. Cual es la accion mas adecuada?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. evitar dano y actuar con prudencia
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

359. [Difícil] Autonomia. Un adulto competente recibe informacion clara y decide libremente participar en un proceso terapeutico. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. respetar autonomia

360. [Media] Justicia. Un servicio debe asignar atencion psicologica sin discriminar por genero, etnia, discapacidad o condicion social. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. aplicar principio de justicia
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

361. [Facil] Etica en psicoterapia. Un psicologo atiende a un paciente y recibe una invitacion a una relacion comercial fuera de consulta. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. evitar relaciones duales que afecten objetividad
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

362. [Dificil] Consentimiento y asentimiento. Un menor inicia evaluacion psicologica; sus representantes autorizan y el menor tambien debe comprender y aceptar participar. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. obtener consentimiento informado y asentimiento
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

363. [Media] Confidencialidad y datos sensibles. Una universidad solicita detalles del tratamiento de un estudiante sin autorizacion escrita. Que procedimiento corresponde?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. proteger confidencialidad y datos sensibles
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

364. [Facil] Autocuidado profesional. Un psicologo nota agotamiento emocional, irritabilidad y menor empatia luego de atender casos traumaticos consecutivos. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. implementar autocuidado y supervision
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

365. [Dificil] Investigacion con seres humanos. Se planea estudiar sintomas depresivos en estudiantes y recoger informacion sensible. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

366. [Media] Etica en evaluaciones. Una empresa pide interpretar una prueba no validada para decidir contrataciones. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. usar instrumentos validos y dentro de competencia
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

367. [Facil] Etica en informes psicologicos. Un informe sera enviado a una institucion y contiene informacion intima no relacionada con el objetivo evaluativo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. incluir solo informacion pertinente y necesaria
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

368. [Dificil] Principios eticos APA. Un psicologo debe decidir entre beneficio del paciente, limites de competencia y proteccion de derechos. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

D. aplicar principios eticos profesionales

369. [Media] Beneficencia. El profesional elige una intervencion con mayor probabilidad de ayudar al paciente y menor carga posible. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. actuar con beneficencia

370. [Facil] No maleficencia. Una tecnica puede intensificar el malestar de una persona en crisis si se aplica sin preparacion. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. evitar dano y actuar con prudencia
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

371. [Dificil] Autonomia. Un adulto competente recibe informacion clara y decide libremente participar en un proceso terapeutico. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. respetar autonomia
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

372. [Media] Justicia. Un servicio debe asignar atencion psicologica sin discriminar por genero, etnia, discapacidad o condicion social. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. aplicar principio de justicia

373. [Facil] Etica en psicoterapia. Un psicologo atiende a un paciente y recibe una invitacion a una relacion comercial fuera de consulta. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. evitar relaciones duales que afecten objetividad
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

374. [Dificil] Consentimiento y asentimiento. Un menor inicia evaluacion psicologica; sus representantes autorizan y el menor tambien debe comprender y aceptar participar. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. obtener consentimiento informado y asentimiento
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

375. [Media] Confidencialidad y datos sensibles. Una universidad solicita detalles del tratamiento de un estudiante sin autorizacion escrita. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. proteger confidencialidad y datos sensibles
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

376. [Facil] Autocuidado profesional. Un psicologo nota agotamiento emocional, irritabilidad y menor empatia luego de atender casos traumaticos consecutivos. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. implementar autocuidado y supervision
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

377. [Dificil] Investigacion con seres humanos. Se planea estudiar sintomas depresivos en estudiantes y recoger informacion sensible. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

378. [Media] Etica en evaluaciones. Una empresa pide interpretar una prueba no validada para decidir contrataciones. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. usar instrumentos validos y dentro de competencia
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

379. [Facil] Etica en informes psicologicos. Un informe sera enviado a una institucion y contiene informacion intima no relacionada con el objetivo evaluativo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. incluir solo informacion pertinente y necesaria
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

380. [Dificil] Principios eticos APA. Un psicologo debe decidir entre beneficio del paciente, limites de competencia y proteccion de derechos. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. aplicar principios eticos profesionales
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

381. [Media] Beneficencia. El profesional elige una intervencion con mayor probabilidad de ayudar al paciente y menor carga posible. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. actuar con beneficencia
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

382. [Facil] No maleficencia. Una tecnica puede intensificar el malestar de una persona en crisis si se aplica sin preparacion. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. evitar dano y actuar con prudencia
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

383. [Dificil] Autonomia. Un adulto competente recibe informacion clara y decide libremente participar en un proceso terapeutico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. respetar autonomia
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

384. [Media] Justicia. Un servicio debe asignar atencion psicologica sin discriminar por genero, etnia, discapacidad o condicion social. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. aplicar principio de justicia
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

385. [Facil] Etica en psicoterapia. Un psicologo atiende a un paciente y recibe una invitacion a una relacion comercial fuera de consulta. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. evitar relaciones duales que afecten objetividad
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

386. [Dificil] Consentimiento y asentimiento. Un menor inicia evaluacion psicologica; sus representantes autorizan y el menor tambien debe comprender y aceptar participar. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. obtener consentimiento informado y asentimiento
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

387. [Media] Confidencialidad y datos sensibles. Una universidad solicita detalles del tratamiento de un estudiante sin autorizacion escrita. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. proteger confidencialidad y datos sensibles

388. [Facil] Autocuidado profesional. Un psicologo nota agotamiento emocional, irritabilidad y menor empatia luego de atender casos traumaticos consecutivos. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. implementar autocuidado y supervision
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

389. [Dificil] Investigacion con seres humanos. Se planea estudiar sintomas depresivos en estudiantes y recoger informacion sensible. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica

390. [Media] Etica en evaluaciones. Una empresa pide interpretar una prueba no validada para decidir contrataciones. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. usar instrumentos validos y dentro de competencia
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

391. [Facil] Etica en informes psicologicos. Un informe sera enviado a una institucion y contiene informacion intima no relacionada con el objetivo evaluativo. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. incluir solo informacion pertinente y necesaria

392. [Dificil] Principios eticos APA. Un psicologo debe decidir entre beneficio del paciente, limites de competencia y proteccion de derechos. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual seria la prioridad clinica?

- A. aplicar principios eticos profesionales
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

393. [Media] Beneficencia. El profesional elige una intervencion con mayor probabilidad de ayudar al paciente y menor carga posible. Cual seria la prioridad clinica?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. actuar con beneficencia

394. [Facil] No maleficencia. Una tecnica puede intensificar el malestar de una persona en crisis si se aplica sin preparacion. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. evitar dano y actuar con prudencia

395. [Dificil] Autonomia. Un adulto competente recibe informacion clara y decide libremente participar en un proceso terapeutico. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. respetar autonomia
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

396. [Media] Justicia. Un servicio debe asignar atencion psicologica sin discriminar por genero, etnia, discapacidad o condicion social. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. aplicar principio de justicia

397. [Facil] Etica en psicoterapia. Un psicologo atiende a un paciente y recibe una invitacion a una relacion comercial fuera de consulta. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. evitar relaciones duales que afecten objetividad
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

398. [Difícil] Consentimiento y asentimiento. Un menor inicia evaluacion psicologica; sus representantes autorizan y el menor tambien debe comprender y aceptar participar. Cual seria la prioridad clinica?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. obtener consentimiento informado y asentimiento

399. [Media] Confidencialidad y datos sensibles. Una universidad solicita detalles del tratamiento de un estudiante sin autorizacion escrita. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. proteger confidencialidad y datos sensibles
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

400. [Facil] Autocuidado profesional. Un psicologo nota agotamiento emocional, irritabilidad y menor empatia luego de atender casos traumaticos consecutivos. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. implementar autocuidado y supervision
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

401. [Difícil] Investigacion con seres humanos. Se planea estudiar sintomas depresivos en estudiantes y recoger informacion sensible. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la accion mas adecuada?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica

402. [Media] Etica en evaluaciones. Una empresa pide interpretar una prueba no validada para decidir contrataciones. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. usar instrumentos validos y dentro de competencia
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

403. [Facil] Etica en informes psicologicos. Un informe sera enviado a una institucion y contiene informacion intima no relacionada con el objetivo evaluativo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. incluir solo informacion pertinente y necesaria
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

404. [Difícil] Principios eticos APA. Un psicologo debe decidir entre beneficio del paciente, limites de competencia y proteccion de derechos. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar principios eticos profesionales
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

405. [Media] Beneficencia. El profesional elige una intervencion con mayor probabilidad de ayudar al paciente y menor carga posible. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. actuar con beneficencia
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

406. [Facil] No maleficencia. Una tecnica puede intensificar el malestar de una persona en crisis si se aplica sin preparacion. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. evitar dano y actuar con prudencia
- C. trabajar sin consentimiento informado

D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

407. [Difícil] Autonomia. Un adulto competente recibe informacion clara y decide libremente participar en un proceso terapeutico. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. respetar autonomia

408. [Media] Justicia. Un servicio debe asignar atencion psicologica sin discriminar por genero, etnia, discapacidad o condicion social. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. aplicar principio de justicia
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

409. [Facil] Etica en psicoterapia. Un psicologo atiende a un paciente y recibe una invitacion a una relacion comercial fuera de consulta. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. evitar relaciones duales que afecten objetividad

410. [Difícil] Consentimiento y asentimiento. Un menor inicia evaluacion psicologica; sus representantes autorizan y el menor tambien debe comprender y aceptar participar. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. obtener consentimiento informado y asentimiento
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

411. [Media] Confidencialidad y datos sensibles. Una universidad solicita detalles del tratamiento de un estudiante sin autorizacion escrita. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. proteger confidencialidad y datos sensibles

412. [Facil] Autocuidado profesional. Un psicologo nota agotamiento emocional, irritabilidad y menor empatia luego de atender casos traumaticos consecutivos. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. implementar autocuidado y supervision
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

413. [Difícil] Investigacion con seres humanos. Se planea estudiar sintomas depresivos en estudiantes y recoger informacion sensible. Que procedimiento corresponde?

- A. solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

414. [Media] Etica en evaluaciones. Una empresa pide interpretar una prueba no validada para decidir contrataciones. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. usar instrumentos validos y dentro de competencia
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

415. [Facil] Etica en informes psicologicos. Un informe sera enviado a una institucion y contiene informacion intima no relacionada con el objetivo evaluativo. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. incluir solo informacion pertinente y necesaria

- 416. [Difícil] Principios éticos APA.** Un psicólogo debe decidir entre beneficio del paciente, límites de competencia y protección de derechos. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál sería la prioridad clínica?
- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - B. aplicar principios éticos profesionales
 - C. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- 417. [Media] Beneficencia.** El profesional elige una intervención con mayor probabilidad de ayudar al paciente y menor carga posible. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?
- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - B. actuar con beneficencia
 - C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
 - D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- 418. [Fácil] No maleficencia.** Una técnica puede intensificar el malestar de una persona en crisis si se aplica sin preparación. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. derivar sin contención ni valoración inicial
 - B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
 - D. evitar dano y actuar con prudencia
- 419. [Difícil] Autonomía.** Un adulto competente recibe información clara y decide libremente participar en un proceso terapéutico. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál sería la prioridad clínica?
- A. respetar autonomía
 - B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
 - C. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
 - D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- 420. [Media] Justicia.** Un servicio debe asignar atención psicológica sin discriminar por género, etnia, discapacidad o condición social. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la acción más adecuada?
- A. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - B. trabajar sin consentimiento informado
 - C. aplicar principio de justicia
 - D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- 421. [Fácil] Ética en psicoterapia.** Un psicólogo atiende a un paciente y recibe una invitación a una relación comercial fuera de consulta. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la opción más pertinente?
- A. evitar relaciones duales que afecten objetividad
 - B. trabajar sin consentimiento informado
 - C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
 - D. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- 422. [Difícil] Consentimiento y asentimiento.** Un menor inicia evaluación psicológica; sus representantes autorizan y el menor también debe comprender y aceptar participar. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
 - B. obtener consentimiento informado y asentimiento
 - C. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
 - D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- 423. [Media] Confidencialidad y datos sensibles.** Una universidad solicita detalles del tratamiento de un estudiante sin autorización escrita. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?
- A. proteger confidencialidad y datos sensibles
 - B. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
 - C. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
 - D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- 424. [Fácil] Autocuidado profesional.** Un psicólogo nota agotamiento emocional, irritabilidad y menor empatía luego de atender casos traumáticos consecutivos. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?
- A. trabajar sin consentimiento informado
 - B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
 - C. implementar autocuidado y supervisión
 - D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- 425. [Difícil] Investigación con seres humanos.** Se planea estudiar síntomas depresivos en estudiantes y recoger información sensible. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica

426. [Media] Etica en evaluaciones. Una empresa pide interpretar una prueba no validada para decidir contrataciones. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. usar instrumentos validos y dentro de competencia
- D. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente

427. [Facil] Etica en informes psicologicos. Un informe sera enviado a una institucion y contiene informacion intima no relacionada con el objetivo evaluativo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. incluir solo informacion pertinente y necesaria
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

428. [Dificil] Principios eticos APA. Un psicologo debe decidir entre beneficio del paciente, limites de competencia y proteccion de derechos. Cual es la accion mas adecuada?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. aplicar principios eticos profesionales

429. [Media] Beneficencia. El profesional elige una intervencion con mayor probabilidad de ayudar al paciente y menor carga posible. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. actuar con beneficencia
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

430. [Facil] No maleficencia. Una tecnica puede intensificar el malestar de una persona en crisis si se aplica sin preparacion. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que procedimiento corresponde?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. evitar dano y actuar con prudencia

431. [Dificil] Autonomia. Un adulto competente recibe informacion clara y decide libremente participar en un proceso terapeutico. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. respetar autonomia
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

432. [Media] Justicia. Un servicio debe asignar atencion psicologica sin discriminar por genero, etnia, discapacidad o condicion social. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. aplicar principio de justicia
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

433. [Facil] Etica en psicoterapia. Un psicologo atiende a un paciente y recibe una invitacion a una relacion comercial fuera de consulta. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. evitar relaciones duales que afecten objetividad
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. trabajar sin consentimiento informado

434. [Dificil] Consentimiento y asentimiento. Un menor inicia evaluacion psicologica; sus representantes autorizan y el menor tambien debe comprender y aceptar participar. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. obtener consentimiento informado y asentimiento

- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

435. [Media] Confidencialidad y datos sensibles. Una universidad solicita detalles del tratamiento de un estudiante sin autorizacion escrita. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. proteger confidencialidad y datos sensibles
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. trabajar sin consentimiento informado

436. [Facil] Autocuidado profesional. Un psicologo nota agotamiento emocional, irritabilidad y menor empatia luego de atender casos traumaticos consecutivos. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. implementar autocuidado y supervision

437. [Dificil] Investigacion con seres humanos. Se planea estudiar sintomas depresivos en estudiantes y recoger informacion sensible. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

438. [Media] Etica en evaluaciones. Una empresa pide interpretar una prueba no validada para decidir contrataciones. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. usar instrumentos validos y dentro de competencia
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

439. [Facil] Etica en informes psicologicos. Un informe sera enviado a una institucion y contiene informacion intima no relacionada con el objetivo evaluativo. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. incluir solo informacion pertinente y necesaria

440. [Dificil] Principios eticos APA. Un psicologo debe decidir entre beneficio del paciente, limites de competencia y proteccion de derechos. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. aplicar principios eticos profesionales

441. [Media] Beneficencia. El profesional elige una intervencion con mayor probabilidad de ayudar al paciente y menor carga posible. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. actuar con beneficencia
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

442. [Facil] No maleficencia. Una tecnica puede intensificar el malestar de una persona en crisis si se aplica sin preparacion. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. evitar dano y actuar con prudencia
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. derivar sin contencion ni valoracion inicial

443. [Dificil] Autonomia. Un adulto competente recibe informacion clara y decide libremente participar en un proceso terapeutico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. respetar autonomia

444. [Media] Justicia. Un servicio debe asignar atención psicológica sin discriminar por género, etnia, discapacidad o condición social. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- B. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- D. aplicar principio de justicia

445. [Facil] Ética en psicoterapia. Un psicólogo atiende a un paciente y recibe una invitación a una relación comercial fuera de consulta. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- B. evitar relaciones duales que afecten objetividad
- C. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

446. [Difícil] Consentimiento y asentimiento. Un menor inicia evaluación psicológica; sus representantes autorizan y el menor también debe comprender y aceptar participar. En el caso se observa impacto funcional. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. obtener consentimiento informado y asentimiento
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

447. [Media] Confidencialidad y datos sensibles. Una universidad solicita detalles del tratamiento de un estudiante sin autorización escrita. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- B. proteger confidencialidad y datos sensibles
- C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

448. [Facil] Autocuidado profesional. Un psicólogo nota agotamiento emocional, irritabilidad y menor empatía luego de atender casos traumáticos consecutivos. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. implementar autocuidado y supervisión
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión

449. [Difícil] Investigación con seres humanos. Se planea estudiar síntomas depresivos en estudiantes y recoger información sensible. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobación ética
- B. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- C. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- D. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos

450. [Media] Ética en evaluaciones. Una empresa pide interpretar una prueba no validada para decidir contrataciones. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. usar instrumentos válidos y dentro de competencia
- C. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

Intervenciones psicosociales desde la Psicología

451. [Media] Promoción de salud mental. Una comunidad quiere fortalecer bienestar, redes de apoyo y habilidades de afrontamiento antes de que aparezcan trastornos. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. realizar promoción de salud mental
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

452. [Facil] Prevención primaria. En una escuela se implementan talleres para reducir factores de riesgo antes de que aparezcan problemas de consumo. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar prevención primaria
- B. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

453. [Difícil] Prevencion secundaria. Se realiza tamizaje temprano de depresion en adolescentes para detectar casos iniciales. Cual es la accion mas adecuada?

- A. aplicar prevencion secundaria
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

454. [Media] Prevencion terciaria. Un programa apoya reinsercion social y prevencion de recaidas en personas con trastorno mental cronico. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. aplicar prevencion terciaria
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

455. [Facil] Diagnostico participativo. Antes de disenar un proyecto comunitario, se consulta a lideres, familias y usuarios sobre necesidades y recursos. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- D. realizar diagnostico participativo

456. [Difícil] Diseno de proyectos. Tras identificar violencia intrafamiliar como problema central, se plantean objetivos, actividades, indicadores y cronograma. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. disenar proyecto psicosocial
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento

457. [Media] Implementacion comunitaria. Un equipo inicia talleres, rutas de derivacion y seguimiento con actores locales segun el plan aprobado. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. implementar intervencion comunitaria
- C. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- D. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto

458. [Facil] Evaluacion de programas. Al finalizar una intervencion, se comparan indicadores iniciales y finales para conocer resultados. Que procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. evaluar programa psicosocial

459. [Difícil] Violencia. Una mujer revela violencia de pareja y miedo a regresar a casa. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- B. priorizar seguridad, contencion y ruta de proteccion
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

460. [Media] Duelo comunitario. Una comunidad pierde a varias personas en un desastre y presenta dolor colectivo, miedo e incertidumbre. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la accion mas adecuada?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. intervenir desde apoyo psicosocial comunitario

461. [Facil] Consumo de sustancias. Un barrio identifica aumento de consumo problemático en adolescentes y falta de espacios protectores. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- C. crear estrategia comunitaria de prevencion
- D. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision

462. [Difícil] Exclusion social. Un grupo migrante evita acudir a servicios por discriminación y barreras de acceso. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Que alternativa responde mejor al caso?

- A. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- B. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. promover inclusión y acceso equitativo
- D. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión

463. [Media] Crisis psicosocial. Tras una inundación, familias desplazadas presentan ansiedad, pérdida de redes y necesidades básicas no cubiertas. ¿Que alternativa responde mejor al caso?

- A. derivar sin contención ni valoración inicial
- B. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. coordinar intervención psicosocial en crisis

464. [Fácil] Promoción de salud mental. Una comunidad quiere fortalecer bienestar, redes de apoyo y habilidades de afrontamiento antes de que aparezcan trastornos. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Que alternativa responde mejor al caso?

- A. derivar sin contención ni valoración inicial
- B. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- C. realizar promoción de salud mental
- D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

465. [Difícil] Prevención primaria. En una escuela se implementan talleres para reducir factores de riesgo antes de que aparezcan problemas de consumo. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Que procedimiento corresponde?

- A. derivar sin contención ni valoración inicial
- B. aplicar prevención primaria
- C. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- D. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos

466. [Media] Prevención secundaria. Se realiza tamizaje temprano de depresión en adolescentes para detectar casos iniciales. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. aplicar prevención secundaria
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico

467. [Fácil] Prevención terciaria. Un programa apoya reinserción social y prevención de recaídas en personas con trastorno mental crónico. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. derivar sin contención ni valoración inicial
- C. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos
- D. aplicar prevención terciaria

468. [Difícil] Diagnóstico participativo. Antes de diseñar un proyecto comunitario, se consulta a líderes, familias y usuarios sobre necesidades y recursos. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- B. derivar sin contención ni valoración inicial
- C. realizar diagnóstico participativo
- D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa

469. [Media] Diseño de proyectos. Tras identificar violencia intrafamiliar como problema central, se plantean objetivos, actividades, indicadores y cronograma. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Que procedimiento corresponde?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- C. diseñar proyecto psicosocial
- D. ignorar la confidencialidad para obtener información externa

470. [Fácil] Implementación comunitaria. Un equipo inicia talleres, rutas de derivación y seguimiento con actores locales según el plan aprobado. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- B. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- C. implementar intervención comunitaria
- D. derivar sin contención ni valoración inicial

471. [Difícil] Evaluación de programas. Al finalizar una intervención, se comparan indicadores iniciales y finales para conocer resultados. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- B. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- C. evaluar programa psicosocial
- D. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos

472. [Media] Violencia. Una mujer revela violencia de pareja y miedo a regresar a casa. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener información externa
- B. priorizar seguridad, contención y ruta de protección
- C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- D. derivar sin contención ni valoración inicial

473. [Fácil] Duelo comunitario. Una comunidad pierde a varias personas en un desastre y presenta dolor colectivo, miedo e incertidumbre. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- C. intervenir desde apoyo psicosocial comunitario
- D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

474. [Difícil] Consumo de sustancias. Un barrio identifica aumento de consumo problemático en adolescentes y falta de espacios protectores. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- B. crear estrategia comunitaria de prevención
- C. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

475. [Media] Exclusión social. Un grupo migrante evita acudir a servicios por discriminación y barreras de acceso. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- C. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- D. promover inclusión y acceso equitativo

476. [Fácil] Crisis psicosocial. Tras una inundación, familias desplazadas presentan ansiedad, pérdida de redes y necesidades básicas no cubiertas. En el caso se observa impacto funcional. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia
- B. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- C. coordinar intervención psicosocial en crisis
- D. posponer la intervención hasta tener todos los datos administrativos

477. [Difícil] Promoción de salud mental. Una comunidad quiere fortalecer bienestar, redes de apoyo y habilidades de afrontamiento antes de que aparezcan trastornos. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clínico. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- B. realizar promoción de salud mental
- C. aplicar técnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clínico

478. [Media] Prevención primaria. En una escuela se implementan talleres para reducir factores de riesgo antes de que aparezcan problemas de consumo. ¿Cuál sería la prioridad clínica?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. derivar sin contención ni valoración inicial
- C. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento
- D. aplicar prevención primaria

479. [Fácil] Prevención secundaria. Se realiza tamizaje temprano de depresión en adolescentes para detectar casos iniciales. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. ¿Qué alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar una prueba proyectiva como única fuente de decisión
- B. aplicar prevención secundaria
- C. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente
- D. priorizar la interpretación personal del profesional sobre la evidencia

480. [Difícil] Prevención terciaria. Un programa apoya reinserción social y prevención de recaídas en personas con trastorno mental crónico. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿Cuál es la opción más pertinente?

- A. aplicar prevención terciaria

- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

481. [Media] Diagnostico participativo. Antes de disenar un proyecto comunitario, se consulta a lideres, familias y usuarios sobre necesidades y recursos. En el caso se observa impacto funcional. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. aplicar una prueba proyectiva como unica fuente de decision
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. realizar diagnostico participativo

482. [Facil] Diseno de proyectos. Tras identificar violencia intrafamiliar como problema central, se plantean objetivos, actividades, indicadores y cronograma. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. disenar proyecto psicosocial
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

483. [Dificil] Implementacion comunitaria. Un equipo inicia talleres, rutas de derivacion y seguimiento con actores locales segun el plan aprobado. Cual seria la prioridad clinica?

- A. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. implementar intervencion comunitaria

484. [Media] Evaluacion de programas. Al finalizar una intervencion, se comparan indicadores iniciales y finales para conocer resultados. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. evaluar programa psicosocial
- B. trabajar sin consentimiento informado
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente

485. [Facil] Violencia. Una mujer revela violencia de pareja y miedo a regresar a casa. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. priorizar seguridad, contencion y ruta de proteccion

486. [Dificil] Duelo comunitario. Una comunidad pierde a varias personas en un desastre y presenta dolor colectivo, miedo e incertidumbre. En el caso se observa impacto funcional. Que procedimiento corresponde?

- A. intervenir desde apoyo psicosocial comunitario
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

487. [Media] Consumo de sustancias. Un barrio identifica aumento de consumo problemático en adolescentes y falta de espacios protectores. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. crear estrategia comunitaria de prevencion
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

488. [Facil] Exclusion social. Un grupo migrante evita acudir a servicios por discriminacion y barreras de acceso. Que procedimiento corresponde?

- A. promover inclusion y acceso equitativo
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. usar el mismo instrumento para todos los casos sin criterio clinico

489. [Dificil] Crisis psicosocial. Tras una inundacion, familias desplazadas presentan ansiedad, perdida de redes y necesidades basicas no cubiertas. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. coordinar intervencion psicosocial en crisis
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

D. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos

490. [Media] Promocion de salud mental. Una comunidad quiere fortalecer bienestar, redes de apoyo y habilidades de afrontamiento antes de que aparezcan trastornos. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- B. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. realizar promocion de salud mental

491. [Facil] Prevencion primaria. En una escuela se implementan talleres para reducir factores de riesgo antes de que aparezcan problemas de consumo. En el caso se observa impacto funcional. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar prevencion primaria
- B. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos
- C. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

492. [Dificil] Prevencion secundaria. Se realiza tamizaje temprano de depresion en adolescentes para detectar casos iniciales. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Que alternativa responde mejor al caso?

- A. aplicar prevencion secundaria
- B. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. aplicar tecnicas avanzadas sin evaluar riesgos

493. [Media] Prevencion terciaria. Un programa apoya reinsercion social y prevencion de recaidas en personas con trastorno mental cronico. Cual es la opcion mas pertinente?

- A. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- B. aplicar prevencion terciaria
- C. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- D. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia

494. [Facil] Diagnostico participativo. Antes de disenar un proyecto comunitario, se consulta a lideres, familias y usuarios sobre necesidades y recursos. El profesional debe decidir sin perder el encuadre etico. Que procedimiento corresponde?

- A. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa
- B. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- C. realizar diagnostico participativo
- D. trabajar sin consentimiento informado

495. [Dificil] Diseno de proyectos. Tras identificar violencia intrafamiliar como problema central, se plantean objetivos, actividades, indicadores y cronograma. La decision debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual seria la prioridad clinica?

- A. disenar proyecto psicosocial
- B. emitir un diagnostico definitivo sin evaluacion suficiente
- C. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- D. trabajar sin consentimiento informado

496. [Media] Implementacion comunitaria. Un equipo inicia talleres, rutas de derivacion y seguimiento con actores locales segun el plan aprobado. En el caso se observa impacto funcional. Cual seria la prioridad clinica?

- A. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- B. implementar intervencion comunitaria
- C. priorizar la interpretacion personal del profesional sobre la evidencia
- D. trabajar sin consentimiento informado

497. [Facil] Evaluacion de programas. Al finalizar una intervencion, se comparan indicadores iniciales y finales para conocer resultados. Se requiere una respuesta basada en razonamiento clinico. Cual es la accion mas adecuada?

- A. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- B. finalizar el proceso sin devolucion ni seguimiento
- C. evaluar programa psicosocial
- D. ignorar la confidencialidad para obtener informacion externa

498. [Dificil] Violencia. Una mujer revela violencia de pareja y miedo a regresar a casa. Cual seria la prioridad clinica?

- A. posponer la intervencion hasta tener todos los datos administrativos
- B. priorizar seguridad, contencion y ruta de proteccion
- C. derivar sin contencion ni valoracion inicial
- D. trabajar sin consentimiento informado

499. [Media] Duelo comunitario. Una comunidad pierde a varias personas en un desastre y presenta dolor colectivo, miedo e incertidumbre. El profesional debe decidir sin perder el encuadre ético. Que procedimiento corresponde?

- A. trabajar sin consentimiento informado
- B. centrarse solo en consejos generales sin explorar el contexto
- C. intervenir desde apoyo psicosocial comunitario
- D. emitir un diagnóstico definitivo sin evaluación suficiente

500. [Facil] Consumo de sustancias. Un barrio identifica aumento de consumo problemático en adolescentes y falta de espacios protectores. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. Cual es la acción más adecuada?

- A. crear estrategia comunitaria de prevención
- B. atribuir el problema a falta de voluntad del paciente
- C. trabajar sin consentimiento informado
- D. finalizar el proceso sin devolución ni seguimiento

Clave de respuestas y justificaciones breves

- 1. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a psicoterapia y exige iniciar un proceso psicoterapeutico con objetivos clinicos claros. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 2. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a asesoramiento y exige brindar asesoramiento focalizado y orientacion psicologica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 3. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a intervencion en crisis y exige aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 4. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a rol del psicologo clinico en grupos y exige facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 5. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos de contencion emocional y exige crear un grupo de contencion emocional. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 6. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige organizar un grupo psicoeducativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 7. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos psicoterapeuticos y exige planificar un grupo psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 8. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 9. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 10. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 11. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 12. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a encuadre psicoterapeutico y exige establecer encuadre psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 13. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a objetivos de intervencion y exige definir objetivos de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 14. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a psicoterapia y exige realizar psicoterapia orientada a la comprension y modificacion de patrones. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 15. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a asesoramiento y exige realizar consejeria psicologica orientativa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 16. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a intervencion en crisis y exige priorizar contencion, seguridad y evaluacion de riesgo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 17. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a rol del psicologo clinico en grupos y exige regular la dinamica y favorecer participacion equilibrada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 18. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a grupos de contencion emocional y exige implementar contencion emocional grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 19. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige realizar psicoeducacion grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 20. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos psicoterapeuticos y exige mantener proceso psicoterapeutico grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 21. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 22. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.

- 23. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 24. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 25. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a encuadre psicoterapeutico y exige establecer encuadre psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 26. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a objetivos de intervencion y exige definir objetivos de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 27. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a psicoterapia y exige iniciar un proceso psicoterapeutico con objetivos clinicos claros. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 28. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a asesoramiento y exige brindar asesoramiento focalizado y orientacion psicologica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 29. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a intervencion en crisis y exige aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 30. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a rol del psicologo clinico en grupos y exige facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 31. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a grupos de contencion emocional y exige crear un grupo de contencion emocional. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 32. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige organizar un grupo psicoeducativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 33. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos psicoterapeuticos y exige planificar un grupo psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 34. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 35. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 36. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 37. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 38. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a encuadre psicoterapeutico y exige establecer encuadre psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 39. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a objetivos de intervencion y exige definir objetivos de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 40. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a psicoterapia y exige realizar psicoterapia orientada a la comprension y modificacion de patrones. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 41. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a asesoramiento y exige realizar consejeria psicologica orientativa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 42. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a intervencion en crisis y exige priorizar contencion, seguridad y evaluacion de riesgo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 43. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a rol del psicologo clinico en grupos y exige regular la dinamica y favorecer participacion equilibrada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 44. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a grupos de contencion emocional y exige implementar contencion emocional grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikue; Rodriguez Morejon; Brown.
- 45. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige realizar psicoeducacion grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:*

Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.

- 46. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a grupos psicoterapéuticos y exige mantener proceso psicoterapéutico grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 47. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluación inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 48. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervención. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 49. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 50. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clínica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 51. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a encuadre psicoterapéutico y exige establecer encuadre psicoterapéutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 52. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a objetivos de intervención y exige definir objetivos de intervención. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 53. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a psicoterapia y exige iniciar un proceso psicoterapéutico con objetivos clínicos claros. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 54. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a asesoramiento y exige brindar asesoramiento focalizado y orientación psicológica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 55. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a intervención en crisis y exige aplicar primeros auxilios psicológicos y estabilización inmediata. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 56. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a rol del psicólogo clínico en grupos y exige facilitar la comunicación y proteger el encuadre grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 57. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos de contención emocional y exige crear un grupo de contención emocional. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 58. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige organizar un grupo psicoeducativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 59. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos psicoterapéuticos y exige planificar un grupo psicoterapéutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 60. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluación inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 61. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervención. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 62. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 63. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clínica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 64. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a encuadre psicoterapéutico y exige establecer encuadre psicoterapéutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 65. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a objetivos de intervención y exige definir objetivos de intervención. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 66. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a psicoterapia y exige realizar psicoterapia orientada a la comprensión y modificación de patrones. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.
- 67. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a asesoramiento y exige realizar consejería psicológica orientativa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikau; Rodríguez Morejón; Brown.

- 68. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a intervencion en crisis y exige priorizar contencion, seguridad y evaluacion de riesgo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 69. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a rol del psicologo clinico en grupos y exige regular la dinamica y favorecer participacion equilibrada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 70. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos de contencion emocional y exige implementar contencion emocional grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 71. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige realizar psicoeducacion grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 72. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a grupos psicoterapeuticos y exige mantener proceso psicoterapeutico grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 73. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 74. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 75. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 76. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 77. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a encuadre psicoterapeutico y exige establecer encuadre psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 78. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a objetivos de intervencion y exige definir objetivos de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 79. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a psicoterapia y exige iniciar un proceso psicoterapeutico con objetivos clinicos claros. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 80. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a asesoramiento y exige brindar asesoramiento focalizado y orientacion psicologica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 81. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a intervencion en crisis y exige aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 82. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a rol del psicologo clinico en grupos y exige facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 83. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos de contencion emocional y exige crear un grupo de contencion emocional. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 84. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige organizar un grupo psicoeducativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 85. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a grupos psicoterapeuticos y exige planificar un grupo psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 86. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 87. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 88. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 89. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 90. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a encuadre psicoterapeutico y exige establecer encuadre psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia

clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

91. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a objetivos de intervención y exige definir objetivos de intervención. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

92. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a psicoterapia y exige realizar psicoterapia orientada a la comprensión y modificación de patrones. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

93. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a asesoramiento y exige realizar consejería psicológica orientativa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

94. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a intervención en crisis y exige priorizar contención, seguridad y evaluación de riesgo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

95. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a rol del psicólogo clínico en grupos y exige regular la dinámica y favorecer participación equilibrada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

96. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a grupos de contención emocional y exige implementar contención emocional grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

97. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige realizar psicoeducación grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

98. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a grupos psicoterapéuticos y exige mantener proceso psicoterapéutico grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

99. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluación inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

100. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervención. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

101. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

102. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clínica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

103. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a encuadre psicoterapéutico y exige establecer encuadre psicoterapéutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

104. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a objetivos de intervención y exige definir objetivos de intervención. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

105. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a psicoterapia y exige iniciar un proceso psicoterapéutico con objetivos clínicos claros. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

106. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a asesoramiento y exige brindar asesoramiento focalizado y orientación psicológica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

107. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a intervención en crisis y exige aplicar primeros auxilios psicológicos y estabilización inmediata. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

108. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a rol del psicólogo clínico en grupos y exige facilitar la comunicación y proteger el encuadre grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

109. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a grupos de contención emocional y exige crear un grupo de contención emocional. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

110. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige organizar un grupo psicoeducativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

111. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos psicoterapéuticos y exige planificar un grupo psicoterapéutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

112. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluación inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejon; Brown.

- 113. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 114. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 115. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 116. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a encuadre psicoterapeutico y exige establecer encuadre psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 117. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a objetivos de intervencion y exige definir objetivos de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 118. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a psicoterapia y exige realizar psicoterapia orientada a la comprension y modificacion de patrones. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 119. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a asesoramiento y exige realizar consejeria psicologica orientativa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 120. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a intervencion en crisis y exige priorizar contencion, seguridad y evaluacion de riesgo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 121. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a rol del psicologo clinico en grupos y exige regular la dinamica y favorecer participacion equilibrada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 122. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos de contencion emocional y exige implementar contencion emocional grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 123. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a grupos psicoeducativos y exige realizar psicoeducacion grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 124. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a grupos psicoterapeuticos y exige mantener proceso psicoterapeutico grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 125. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a fase inicial y exige establecer alianza, evaluacion inicial y encuadre. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 126. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a fase media y exige ejecutar el plan de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 127. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a fase final y exige realizar cierre y seguimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 128. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a motivo de consulta-demanda y exige diferenciar motivo manifiesto y demanda clinica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 129. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a encuadre psicoterapeutico y exige establecer encuadre psicoterapeutico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 130. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a objetivos de intervencion y exige definir objetivos de intervencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 131. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a psicoterapia y exige iniciar un proceso psicoterapeutico con objetivos clinicos claros. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 132. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a asesoramiento y exige brindar asesoramiento focalizado y orientacion psicologica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 133. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a intervencion en crisis y exige aplicar primeros auxilios psicologicos y estabilizacion inmediata. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 134. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a rol del psicologo clinico en grupos y exige facilitar la comunicacion y proteger el encuadre grupal. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Bados y Garcia; Slaikeu; Rodriguez Morejon; Brown.
- 135. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a grupos de contencion emocional y exige crear un grupo de contencion emocional. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o

pertinencia clínica. *Referencia:* Bados y García; Slaikeu; Rodríguez Morejón; Brown.

136. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas de inteligencia y exige aplicar una prueba de inteligencia estandarizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

137. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas de personalidad y exige seleccionar pruebas de personalidad pertinentes. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

138. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a funciones ejecutivas y exige evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

139. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a pruebas de desarrollo y exige utilizar pruebas de desarrollo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

140. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas proyectivas y exige emplear pruebas proyectivas como complemento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

141. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas clínicas y exige usar una escala clínica validada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

142. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a entrevista clínica y exige realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

143. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a selección de instrumentos y exige seleccionar instrumentos pertinentes y válidos. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

144. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a devolución diagnóstica y exige realizar devolución diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

145. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a historia clínica psicológica y exige elaborar historia clínica psicológica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

146. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a hipótesis diagnóstica y exige formular hipótesis diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

147. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a informe psicológico y exige redactar informe psicológico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

148. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas de inteligencia y exige aplicar una prueba de inteligencia estandarizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

149. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas de personalidad y exige seleccionar pruebas de personalidad pertinentes. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

150. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a funciones ejecutivas y exige evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

151. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas de desarrollo y exige utilizar pruebas de desarrollo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

152. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas proyectivas y exige emplear pruebas proyectivas como complemento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

153. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas clínicas y exige usar una escala clínica validada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

154. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a entrevista clínica y exige realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

155. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a selección de instrumentos y exige seleccionar instrumentos pertinentes y válidos. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

156. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a devolución diagnóstica y exige realizar devolución diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

157. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a historia clínica psicológica y exige elaborar historia clínica psicológica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

- 158. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a hipótesis diagnóstica y exige formular hipótesis diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 159. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a informe psicológico y exige redactar informe psicológico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 160. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas de inteligencia y exige aplicar una prueba de inteligencia estandarizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 161. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas de personalidad y exige seleccionar pruebas de personalidad pertinentes. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 162. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a funciones ejecutivas y exige evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 163. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas de desarrollo y exige utilizar pruebas de desarrollo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 164. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas proyectivas y exige emplear pruebas proyectivas como complemento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 165. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas clínicas y exige usar una escala clínica validada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 166. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a entrevista clínica y exige realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 167. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a selección de instrumentos y exige seleccionar instrumentos pertinentes y válidos. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 168. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a devolución diagnóstica y exige realizar devolución diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 169. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a historia clínica psicológica y exige elaborar historia clínica psicológica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 170. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a hipótesis diagnóstica y exige formular hipótesis diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 171. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a informe psicológico y exige redactar informe psicológico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 172. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas de inteligencia y exige aplicar una prueba de inteligencia estandarizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 173. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas de personalidad y exige seleccionar pruebas de personalidad pertinentes. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 174. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a funciones ejecutivas y exige evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 175. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas de desarrollo y exige utilizar pruebas de desarrollo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 176. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas proyectivas y exige emplear pruebas proyectivas como complemento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 177. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas clínicas y exige usar una escala clínica validada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 178. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a entrevista clínica y exige realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 179. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a selección de instrumentos y exige seleccionar instrumentos pertinentes y válidos. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 180. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a devolución diagnóstica y exige realizar devolución diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:*

Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

181. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a historia clinica psicologica y exige elaborar historia clinica psicologica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

182. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a hipotesis diagnostica y exige formular hipotesis diagnostica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

183. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a informe psicologico y exige redactar informe psicologico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

184. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas de inteligencia y exige aplicar una prueba de inteligencia estandarizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

185. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas de personalidad y exige seleccionar pruebas de personalidad pertinentes. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

186. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a funciones ejecutivas y exige evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

187. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas de desarrollo y exige utilizar pruebas de desarrollo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

188. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas proyectivas y exige emplear pruebas proyectivas como complemento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

189. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas clinicas y exige usar una escala clinica validada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

190. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a entrevista clinica y exige realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

191. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a seleccion de instrumentos y exige seleccionar instrumentos pertinentes y validos. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

192. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a devolucion diagnostica y exige realizar devolucion diagnostica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

193. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a historia clinica psicologica y exige elaborar historia clinica psicologica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

194. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a hipotesis diagnostica y exige formular hipotesis diagnostica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

195. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a informe psicologico y exige redactar informe psicologico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

196. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas de inteligencia y exige aplicar una prueba de inteligencia estandarizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

197. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas de personalidad y exige seleccionar pruebas de personalidad pertinentes. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

198. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a funciones ejecutivas y exige evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

199. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a pruebas de desarrollo y exige utilizar pruebas de desarrollo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

200. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas proyectivas y exige emplear pruebas proyectivas como complemento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

201. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas clinicas y exige usar una escala clinica validada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

202. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a entrevista clinica y exige realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

226. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a entrevista clinica y exige realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

227. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a seleccion de instrumentos y exige seleccionar instrumentos pertinentes y validos. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

228. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a devolucion diagnostica y exige realizar devolucion diagnostica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

229. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a historia clinica psicologica y exige elaborar historia clinica psicologica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

230. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a hipotesis diagnostica y exige formular hipotesis diagnostica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

231. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a informe psicologico y exige redactar informe psicologico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

232. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas de inteligencia y exige aplicar una prueba de inteligencia estandarizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

233. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas de personalidad y exige seleccionar pruebas de personalidad pertinentes. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

234. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a funciones ejecutivas y exige evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

235. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a pruebas de desarrollo y exige utilizar pruebas de desarrollo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

236. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a pruebas proyectivas y exige emplear pruebas proyectivas como complemento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

237. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a pruebas clinicas y exige usar una escala clinica validada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

238. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a entrevista clinica y exige realizar entrevista clinica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

239. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a seleccion de instrumentos y exige seleccionar instrumentos pertinentes y validos. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

240. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a devolucion diagnostica y exige realizar devolucion diagnostica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

241. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a historia clinica psicologica y exige elaborar historia clinica psicologica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

242. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a hipotesis diagnostica y exige formular hipotesis diagnostica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

243. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a informe psicologico y exige redactar informe psicologico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

244. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas de inteligencia y exige aplicar una prueba de inteligencia estandarizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

245. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a pruebas de personalidad y exige seleccionar pruebas de personalidad pertinentes. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

246. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a funciones ejecutivas y exige evaluar procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

247. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a pruebas de desarrollo y exige utilizar pruebas de desarrollo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..

- 248. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a pruebas proyectivas y exige emplear pruebas proyectivas como complemento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 249. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a pruebas clínicas y exige usar una escala clínica validada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 250. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a entrevista clínica y exige realizar entrevista clínica estructurada o semiestructurada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 251. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a selección de instrumentos y exige seleccionar instrumentos pertinentes y válidos. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 252. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a devolución diagnóstica y exige realizar devolución diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 253. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a historia clínica psicológica y exige elaborar historia clínica psicológica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 254. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a hipótesis diagnóstica y exige formular hipótesis diagnóstica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 255. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a informe psicológico y exige redactar informe psicológico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Aragon Borja; Cohen, Schneider y Tobin; Morrison; Perpina et al..
- 256. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a autismo en la niñez y exige considerar trastorno del espectro autista. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 257. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos hiperactivos y exige sospechar trastorno hiperactivo/TDAH. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 258. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastorno opositor desafiante y exige considerar trastorno opositor desafiante. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 259. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a anorexia nerviosa y exige identificar anorexia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 260. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a bulimia nerviosa y exige identificar bulimia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 261. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a uso de sustancias y exige evaluar trastorno por uso de sustancias. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 262. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastorno de conducta y exige considerar trastorno de conducta. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 263. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastornos de personalidad y exige explorar trastorno de personalidad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 264. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a esquizofrenia y exige sospechar esquizofrenia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 265. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastornos de ansiedad y exige considerar trastorno de ansiedad generalizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 266. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a Alzheimer y exige sospechar demencia tipo Alzheimer. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 267. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastornos depresivos y exige considerar episodio depresivo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 268. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastornos de adaptación y exige considerar trastorno de adaptación. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 269. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a antidepresivos y exige psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento médico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 270. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a ansiolíticos y exige advertir riesgos y derivar a evaluación médica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:*

CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

271. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a antipsicóticos y exige reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatría. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

272. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a estabilizadores del estado de ánimo y exige reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

273. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a efectos secundarios y exige explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

274. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a autismo en la niñez y exige considerar trastorno del espectro autista. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

275. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a trastornos hipercinéticos y exige sospechar trastorno hipercinético/TDAH. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

276. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastorno opositor desafiante y exige considerar trastorno opositor desafiante. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

277. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a anorexia nerviosa y exige identificar anorexia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

278. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a bulimia nerviosa y exige identificar bulimia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

279. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a uso de sustancias y exige evaluar trastorno por uso de sustancias. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

280. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastorno de conducta y exige considerar trastorno de conducta. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

281. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastornos de personalidad y exige explorar trastorno de personalidad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

282. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a esquizofrenia y exige sospechar esquizofrenia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

283. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos de ansiedad y exige considerar trastorno de ansiedad generalizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

284. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a Alzheimer y exige sospechar demencia tipo Alzheimer. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

285. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a trastornos depresivos y exige considerar episodio depresivo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

286. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastornos de adaptación y exige considerar trastorno de adaptación. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

287. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a antidepresivos y exige psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento médico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

288. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a ansiolíticos y exige advertir riesgos y derivar a evaluación médica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

289. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a antipsicóticos y exige reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatría. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

290. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a estabilizadores del estado de ánimo y exige reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

291. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a efectos secundarios y exige explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

292. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a autismo en la niñez y exige considerar trastorno del espectro autista. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

- 293. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastornos hipercinéticos y exige sospechar trastorno hipercinético/TDAH. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 294. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastorno opositor desafiante y exige considerar trastorno opositor desafiante. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 295. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a anorexia nerviosa y exige identificar anorexia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 296. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a bulimia nerviosa y exige identificar bulimia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 297. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a uso de sustancias y exige evaluar trastorno por uso de sustancias. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 298. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastorno de conducta y exige considerar trastorno de conducta. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 299. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos de personalidad y exige explorar trastorno de personalidad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 300. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a esquizofrenia y exige sospechar esquizofrenia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 301. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastornos de ansiedad y exige considerar trastorno de ansiedad generalizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 302. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a Alzheimer y exige sospechar demencia tipo Alzheimer. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 303. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos depresivos y exige considerar episodio depresivo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 304. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastornos de adaptación y exige considerar trastorno de adaptación. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 305. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a antidepresivos y exige psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento médico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 306. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a ansiolíticos y exige advertir riesgos y derivar a evaluación médica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 307. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a antipsicóticos y exige reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatría. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 308. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a estabilizadores del estado de ánimo y exige reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 309. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a efectos secundarios y exige explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 310. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a autismo en la niñez y exige considerar trastorno del espectro autista. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 311. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos hipercinéticos y exige sospechar trastorno hipercinético/TDAH. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 312. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastorno opositor desafiante y exige considerar trastorno opositor desafiante. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 313. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a anorexia nerviosa y exige identificar anorexia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 314. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a bulimia nerviosa y exige identificar bulimia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 315. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a uso de sustancias y exige evaluar trastorno por uso de sustancias. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:*

CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

316. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastorno de conducta y exige considerar trastorno de conducta. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

317. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos de personalidad y exige explorar trastorno de personalidad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

318. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a esquizofrenia y exige sospechar esquizofrenia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

319. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastornos de ansiedad y exige considerar trastorno de ansiedad generalizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

320. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a alzheimer y exige sospechar demencia tipo Alzheimer. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

321. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos depresivos y exige considerar episodio depresivo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

322. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastornos de adaptacion y exige considerar trastorno de adaptacion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

323. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a antidepresivos y exige psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento medico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

324. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a ansioliticos y exige advertir riesgos y derivar a evaluacion medica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

325. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a antipsicoticos y exige reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

326. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a estabilizadores del estado de animo y exige reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

327. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a efectos secundarios y exige explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

328. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a autismo en la ninez y exige considerar trastorno del espectro autista. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

329. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a trastornos hipercineticos y exige sospechar trastorno hipercinetico/TDAH. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

330. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastorno opositor desafiante y exige considerar trastorno opositor desafiante. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

331. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a anorexia nerviosa y exige identificar anorexia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

332. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a bulimia nerviosa y exige identificar bulimia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

333. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a uso de sustancias y exige evaluar trastorno por uso de sustancias. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

334. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastorno de conducta y exige considerar trastorno de conducta. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

335. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos de personalidad y exige explorar trastorno de personalidad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

336. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a esquizofrenia y exige sospechar esquizofrenia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

337. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastornos de ansiedad y exige considerar trastorno de ansiedad generalizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.

- 338. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a alzheimer y exige sospechar demencia tipo Alzheimer. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 339. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastornos depresivos y exige considerar episodio depresivo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 340. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos de adaptacion y exige considerar trastorno de adaptacion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 341. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a antidepresivos y exige psicoeducar sobre efectos secundarios y derivar seguimiento medico. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 342. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a ansioliticos y exige advertir riesgos y derivar a evaluacion medica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 343. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a antipsicoticos y exige reconocer efectos extrapiramidales y coordinar con psiquiatria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 344. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a estabilizadores del estado de animo y exige reforzar adherencia y vigilancia de cambios emocionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 345. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a efectos secundarios y exige explorar efectos secundarios y derivar al prescriptor. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 346. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a autismo en la ninez y exige considerar trastorno del espectro autista. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 347. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a trastornos hipercineticos y exige sospechar trastorno hipercinetico/TDAH. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 348. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a trastorno opositor desafiante y exige considerar trastorno opositor desafiante. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 349. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a anorexia nerviosa y exige identificar anorexia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 350. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a bulimia nerviosa y exige identificar bulimia nerviosa. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 351. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a uso de sustancias y exige evaluar trastorno por uso de sustancias. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 352. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a trastorno de conducta y exige considerar trastorno de conducta. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 353. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a trastornos de personalidad y exige explorar trastorno de personalidad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 354. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a esquizofrenia y exige sospechar esquizofrenia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 355. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a trastornos de ansiedad y exige considerar trastorno de ansiedad generalizada. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* CIE-10/OMS; Vallejo Ruiloba; Cortese; Bravo Ortiz.
- 356. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a principios eticos apa y exige aplicar principios eticos profesionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 357. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a beneficencia y exige actuar con beneficencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 358. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a no maleficencia y exige evitar dano y actuar con prudencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 359. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a autonomia y exige respetar autonomia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 360. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a justicia y exige aplicar principio de justicia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica

de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

361. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a etica en psicoterapia y exige evitar relaciones duales que afecten objetividad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

362. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a consentimiento y asentimiento y exige obtener consentimiento informado y asentimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

363. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a confidencialidad y datos sensibles y exige proteger confidencialidad y datos sensibles. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

364. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a autocuidado profesional y exige implementar autocuidado y supervision. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

365. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a investigacion con seres humanos y exige solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

366. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a etica en evaluaciones y exige usar instrumentos validos y dentro de competencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

367. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a etica en informes psicologicos y exige incluir solo informacion pertinente y necesaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

368. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a principios eticos apa y exige aplicar principios eticos profesionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

369. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a beneficencia y exige actuar con beneficencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

370. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a no maleficencia y exige evitar dano y actuar con prudencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

371. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a autonomia y exige respetar autonomia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

372. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a justicia y exige aplicar principio de justicia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

373. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a etica en psicoterapia y exige evitar relaciones duales que afecten objetividad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

374. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a consentimiento y asentimiento y exige obtener consentimiento informado y asentimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

375. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a confidencialidad y datos sensibles y exige proteger confidencialidad y datos sensibles. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

376. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a autocuidado profesional y exige implementar autocuidado y supervision. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

377. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a investigacion con seres humanos y exige solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

378. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a etica en evaluaciones y exige usar instrumentos validos y dentro de competencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

379. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a etica en informes psicologicos y exige incluir solo informacion pertinente y necesaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

380. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a principios eticos apa y exige aplicar principios eticos profesionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

381. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a beneficencia y exige actuar con beneficencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

382. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a no maleficencia y exige evitar dano y actuar con prudencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

- 383. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a autonomia y exige respetar autonomia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 384. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a justicia y exige aplicar principio de justicia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 385. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a etica en psicoterapia y exige evitar relaciones duales que afecten objetividad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 386. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a consentimiento y asentimiento y exige obtener consentimiento informado y asentimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 387. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a confidencialidad y datos sensibles y exige proteger confidencialidad y datos sensibles. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 388. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a autocuidado profesional y exige implementar autocuidado y supervision. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 389. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a investigacion con seres humanos y exige solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 390. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a etica en evaluaciones y exige usar instrumentos validos y dentro de competencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 391. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a etica en informes psicologicos y exige incluir solo informacion pertinente y necesaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 392. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a principios eticos apa y exige aplicar principios eticos profesionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 393. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a beneficencia y exige actuar con beneficencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 394. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a no maleficencia y exige evitar dano y actuar con prudencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 395. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a autonomia y exige respetar autonomia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 396. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a justicia y exige aplicar principio de justicia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 397. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a etica en psicoterapia y exige evitar relaciones duales que afecten objetividad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 398. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a consentimiento y asentimiento y exige obtener consentimiento informado y asentimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 399. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a confidencialidad y datos sensibles y exige proteger confidencialidad y datos sensibles. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 400. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a autocuidado profesional y exige implementar autocuidado y supervision. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 401. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a investigacion con seres humanos y exige solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 402. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a etica en evaluaciones y exige usar instrumentos validos y dentro de competencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 403. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a etica en informes psicologicos y exige incluir solo informacion pertinente y necesaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 404. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a principios eticos apa y exige aplicar principios eticos profesionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 405. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a beneficencia y exige actuar con beneficencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica

de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

406. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a no maleficencia y exige evitar dano y actuar con prudencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

407. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a autonomia y exige respetar autonomia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

408. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a justicia y exige aplicar principio de justicia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

409. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a etica en psicoterapia y exige evitar relaciones duales que afecten objetividad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

410. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a consentimiento y asentimiento y exige obtener consentimiento informado y asentimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

411. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a confidencialidad y datos sensibles y exige proteger confidencialidad y datos sensibles. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

412. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a autocuidado profesional y exige implementar autocuidado y supervision. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

413. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a investigacion con seres humanos y exige solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

414. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a etica en evaluaciones y exige usar instrumentos validos y dentro de competencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

415. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a etica en informes psicologicos y exige incluir solo informacion pertinente y necesaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

416. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a principios eticos apa y exige aplicar principios eticos profesionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

417. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a beneficencia y exige actuar con beneficencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

418. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a no maleficencia y exige evitar dano y actuar con prudencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

419. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a autonomia y exige respetar autonomia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

420. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a justicia y exige aplicar principio de justicia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

421. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a etica en psicoterapia y exige evitar relaciones duales que afecten objetividad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

422. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a consentimiento y asentimiento y exige obtener consentimiento informado y asentimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

423. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a confidencialidad y datos sensibles y exige proteger confidencialidad y datos sensibles. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

424. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a autocuidado profesional y exige implementar autocuidado y supervision. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

425. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a investigacion con seres humanos y exige solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobacion etica. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

426. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a etica en evaluaciones y exige usar instrumentos validos y dentro de competencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

427. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a etica en informes psicologicos y exige incluir solo informacion pertinente y necesaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

- 428. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a principios éticos APA y exige aplicar principios éticos profesionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 429. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a beneficencia y exige actuar con beneficencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 430. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a no maleficencia y exige evitar dano y actuar con prudencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 431. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a autonomía y exige respetar autonomía. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 432. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a justicia y exige aplicar principio de justicia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 433. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a ética en psicoterapia y exige evitar relaciones duales que afecten objetividad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 434. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a consentimiento y asentimiento y exige obtener consentimiento informado y asentimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 435. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a confidencialidad y datos sensibles y exige proteger confidencialidad y datos sensibles. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 436. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a autocuidado profesional y exige implementar autocuidado y supervisión. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 437. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a investigación con seres humanos y exige solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobación ética. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 438. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a ética en evaluaciones y exige usar instrumentos válidos y dentro de competencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 439. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a ética en informes psicológicos y exige incluir solo información pertinente y necesaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 440. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a principios éticos APA y exige aplicar principios éticos profesionales. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 441. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a beneficencia y exige actuar con beneficencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 442. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a no maleficencia y exige evitar dano y actuar con prudencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 443. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a autonomía y exige respetar autonomía. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 444. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a justicia y exige aplicar principio de justicia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 445. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a ética en psicoterapia y exige evitar relaciones duales que afecten objetividad. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 446. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a consentimiento y asentimiento y exige obtener consentimiento informado y asentimiento. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 447. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a confidencialidad y datos sensibles y exige proteger confidencialidad y datos sensibles. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 448. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a autocuidado profesional y exige implementar autocuidado y supervisión. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 449. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a investigación con seres humanos y exige solicitar consentimiento, confidencialidad y aprobación ética. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* APA; Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.
- 450. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a ética en evaluaciones y exige usar instrumentos válidos y dentro de competencia. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia

clínica. *Referencia:* APA; Ley Organica de Salud Mental del Ecuador; Ramos Montes.

451. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a promoción de salud mental y exige realizar promoción de salud mental. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

452. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a prevención primaria y exige aplicar prevención primaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

453. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a prevención secundaria y exige aplicar prevención secundaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

454. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a prevención terciaria y exige aplicar prevención terciaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

455. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a diagnóstico participativo y exige realizar diagnóstico participativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

456. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a diseño de proyectos y exige diseñar proyecto psicosocial. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

457. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a implementación comunitaria y exige implementar intervención comunitaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

458. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a evaluación de programas y exige evaluar programa psicosocial. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

459. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a violencia y exige priorizar seguridad, contención y ruta de protección. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

460. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a duelo comunitario y exige intervenir desde apoyo psicosocial comunitario. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

461. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a consumo de sustancias y exige crear estrategia comunitaria de prevención. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

462. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a exclusión social y exige promover inclusión y acceso equitativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

463. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a crisis psicosocial y exige coordinar intervención psicosocial en crisis. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

464. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a promoción de salud mental y exige realizar promoción de salud mental. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

465. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a prevención primaria y exige aplicar prevención primaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

466. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a prevención secundaria y exige aplicar prevención secundaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

467. D. La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a prevención terciaria y exige aplicar prevención terciaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

468. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a diagnóstico participativo y exige realizar diagnóstico participativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

469. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a diseño de proyectos y exige diseñar proyecto psicosocial. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

470. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a implementación comunitaria y exige implementar intervención comunitaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

471. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a evaluación de programas y exige evaluar programa psicosocial. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

472. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a violencia y exige priorizar seguridad, contención y ruta de protección. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluación, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clínica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodríguez Marín.

- 473. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a duelo comunitario y exige intervenir desde apoyo psicosocial comunitario. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 474. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a consumo de sustancias y exige crear estrategia comunitaria de prevencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 475. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a exclusion social y exige promover inclusion y acceso equitativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 476. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a crisis psicosocial y exige coordinar intervencion psicosocial en crisis. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 477. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a promocion de salud mental y exige realizar promocion de salud mental. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 478. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a prevencion primaria y exige aplicar prevencion primaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 479. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a prevencion secundaria y exige aplicar prevencion secundaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 480. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a prevencion terciaria y exige aplicar prevencion terciaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 481. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a diagnostico participativo y exige realizar diagnostico participativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 482. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a diseno de proyectos y exige disenar proyecto psicosocial. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 483. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a implementacion comunitaria y exige implementar intervencion comunitaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 484. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a evaluacion de programas y exige evaluar programa psicosocial. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 485. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a violencia y exige priorizar seguridad, contencion y ruta de proteccion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 486. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a duelo comunitario y exige intervenir desde apoyo psicosocial comunitario. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 487. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a consumo de sustancias y exige crear estrategia comunitaria de prevencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 488. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a exclusion social y exige promover inclusion y acceso equitativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 489. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a crisis psicosocial y exige coordinar intervencion psicosocial en crisis. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 490. D.** La respuesta correcta es D porque el caso corresponde a promocion de salud mental y exige realizar promocion de salud mental. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 491. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a prevencion primaria y exige aplicar prevencion primaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 492. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a prevencion secundaria y exige aplicar prevencion secundaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 493. B.** La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a prevencion terciaria y exige aplicar prevencion terciaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 494. C.** La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a diagnostico participativo y exige realizar diagnostico participativo. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.
- 495. A.** La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a diseno de proyectos y exige disenar proyecto psicosocial. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:*

Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.

496. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a implementacion comunitaria y exige implementar intervencion comunitaria. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.

497. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a evaluacion de programas y exige evaluar programa psicosocial. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.

498. B. La respuesta correcta es B porque el caso corresponde a violencia y exige priorizar seguridad, contencion y ruta de proteccion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.

499. C. La respuesta correcta es C porque el caso corresponde a duelo comunitario y exige intervenir desde apoyo psicosocial comunitario. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.

500. A. La respuesta correcta es A porque el caso corresponde a consumo de sustancias y exige crear estrategia comunitaria de prevencion. Los distractores son menos adecuados porque omiten evaluacion, encuadre, evidencia, seguridad o pertinencia clinica. *Referencia:* Montero; OPS; MSP-MAIS; Blanco y Rodriguez Marin.