

Comenzado el jueves, 28 de mayo de 2026, 01:57

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 28 de mayo de 2026, 02:51

Tiempo empleado 53 minutos 38 segundos

Calificación 75,00 de 100,00

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

De los siguientes enunciados, señale en qué situación se utiliza el monitoreo electrónico fetal:

- ☐ Presencia en fase activa prolongada.
- ☐ Período expulsivo.
- ☐ Presencia de líquido amniótico teñido de meconio.
- ☒ Contracciones rítmicas, regulares e intensas. ✗ Las contracciones regulares e intensas caracterizan la fase activa del parto y en esta etapa está indicada la auscultación fetal intermitente.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Presencia de líquido amniótico teñido de meconio.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer de 54 años, atendida en emergencia por dolor torácico de 1 hora de evolución. A la valoración: paciente álgica, presenta disnea, temor, ansiedad, TA= 150/ 90mmHg, FC= 110X', FR= 32 X', SaO2= 93 % con O2 3 litros X'. Se le realiza un electrocardiograma en el que se aprecian cambios en el segmento ST. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en este caso?

- ☐ Mantener al paciente en decúbito dorsal.
- ☐ Controlar ingesta y excreta.
- ☒ Aliviar el dolor. ✔ El dolor asociado con un IAM refleja un desequilibrio en el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio o una perfusión tisular ineficaz. El alivio inmediato del dolor ayuda a restablecer este equilibrio, disminuyendo así la carga de trabajo del corazón y el daño al miocardio.
- ☐ Monitorizar signos vitales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aliviar el dolor.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente adulto mayor de 85 años acude a urgencias por cefalea intensa, mareo y visión borrosa. A la valoración física se encuentra taquicárdico, la presión arterial es de 180/100 mm Hg, la glucosa capilar es de 145 mg/dl. El paciente refiere que fue diagnosticado con hipertensión arterial desde hace 20 años y su tratamiento es losartán 100 mg al día. Además, presenta un cáncer de colon estadio II. De acuerdo con el caso descrito. ¿Cuál es el diagnóstico principal que conllevaría a la muerte del adulto mayor?

- ☐ Accidente cerebrovascular.
- ☒ Enfermedad cardíaca. ✔ Esta es la respuesta correcta, ya que el diagnóstico descrito en el caso corresponde a las cardiopatías, que son la principal causa de muerte en los ancianos, "los trastornos cardiovasculares son la hipertensión y la cardiopatía coronaria. La hipertensión es un asesino silencioso, porque los ancianos no son conscientes a menudo de que su presión está elevada".
- ☐ Cáncer.
- ☐ Enfermedad pulmonar crónica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Enfermedad cardíaca.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?

- ☐ Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.
- ☒ Citostáticos, cloranfenicol, litio. ✔ Algunos fármacos están totalmente contraindicados durante la lactancia, por las consecuencias que de ello pueden derivarse para el niño. Los fármacos como los citostáticos, el cloranfenicol y el litio deben evitarse definitivamente durante la lactancia. Si la madre los necesita, el niño debe recibir alimentación artificial.
- ☐ Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- ☐ Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Citostáticos, cloranfenicol, litio.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la valoración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico, usted se percató que el paciente presenta deterioro neurológico progresivo, sólo ante un estímulo doloroso abre los ojos y se retira del dolor, sus palabras son mal articuladas con sonidos incomprensibles. ¿Qué puntuación en la escala de Glasgow tiene el paciente?

- ☒ 8 puntos. ✔ La puntuación en el caso presentado es de 8 puntos y corresponde a:
Respuesta ocular: al dolor 2 puntos.
Respuesta verbal: Sonidos incomprensibles 2 puntos.
Respuesta motora: localiza el dolor 4 puntos.
- ☐ 13 puntos.
- ☐ 15 puntos.
- ☐ 7 puntos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 8 puntos.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione las fases del proceso administrativo:

1. Estandarización.
2. Planeación.
3. Delegación.
4. Organización.
5. Dirección.
6. Negociación.
7. Control.

- ☐ 1, 4, 5, 6
- ☐ 2, 3, 6, 7
- ☐ 1, 2, 3, 7

☒ 2, 4, 5, 7 El proceso administrativo tiene cuatro fases:

1. La planeación representa el inicio del proceso administrativo, que es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, estructurados en un esquema detallado de realizarse en el futuro.
2. La organización es una fase que persigue obtener un fin, que fue previamente definido a través de la planeación. Busca efectuar una serie de actividades para lograr un propósito común.
3. La dirección es la ejecución de planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, comunicación y supervisión.
4. El control es la última etapa del proceso administrativo, consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan aceptado, tiene como fin señalar los errores y debilidades a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2, 4, 5, 7

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La definición: La diferenciación o cambio progresivo de órganos y tejidos con adquisición y perfeccionamiento en sus funciones.

Corresponde a:

- ☐ Crecimiento.
- ☐ Desarrollo.
- ☒ Maduración. ✗ La maduración es un parámetro cualitativo más complicado de medir, significa llegar a la plenitud de las capacidades mentales. En relación a lo biológico se refiere a la finalización del desarrollo orgánico general, es decir se ha llegado mediante transformaciones a la forma adulta.
- ☐ Percentiles.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Desarrollo.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A la valoración de enfermería usted identifica un paciente adulto mayor que presenta pérdida de firmeza en la piel, disminución de la capacidad visual y deterioro celular, lo que afecta su salud y bienestar. ¿Cuál es la teoría de envejecimiento que hace referencia el enunciado?

- ☐ Teoría no estocástica.
- ☐ Teoría de la desvinculación.
- ☐ Teoría de la actividad.
- ☒ Teoría estocástica. ✓ Esta teoría considera el envejecimiento como el resultado del deterioro celular aleatorio que ocurre con el tiempo. El deterioro acumulado conduce a los cambios físicos que son reconocidos como característicos del proceso de envejecimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Teoría estocástica.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 45 años acude al centro de salud. Refiere al profesional de enfermería que ha perdido su trabajo recientemente, que su esposa le ha pedido el divorcio, que tiene dificultad para conciliar el sueño y cambios en el apetito. Sus antecedentes familiares revelan que su padre se suicidó a los 53 años. ¿Qué variables debe evaluar el profesional de enfermería?

- ☐ Espirituales.
- ☒ Emocionales. ✓ Esta respuesta es correcta porque el grado de estrés del paciente, la depresión o el miedo pueden influir en las creencias y prácticas de salud. La manera en que una persona maneja el estrés a lo largo de cada fase de su vida influye en la manera en que reacciona a la enfermedad. Este paciente presenta síntomas de depresión como la dificultad para conciliar el sueño y cambios en el apetito.
- ☐ De percepción de funcionamiento.
- ☐ Socioeconómicas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Emocionales.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En relación al aislamiento de contacto, complete el siguiente enunciado:

Las precauciones de contacto se aplican cuando se sospeche o se tenga constancia de haber estado expuesto a patógenos que liberan esporas y en particular a brotes de _____. Como medida de protección se recomienda el uso de _____ y la utilización de _____.

- ☐ Micoplasma – bata y mascarilla quirúrgica - material clínico de uso individual.
- ☐ C. difficile – guantes y mascarilla quirúrgica - material clínico de uso individual.
- ☒ Micoplasma - guantes y mascarilla N95 - material clínico de uso individual. ✗ Ante las infecciones por Micoplasma, se recomienda aplicar las precauciones respecto a la transmisión por gotas como es el uso de mascarilla común o quirúrgica, por lo que estas características no corresponden al aislamiento de contacto.
- ☐ C. difficile – bata y guantes – material clínico de uso individual.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: C. difficile – bata y guantes – material clínico de uso individual.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con relación a la aspiración de secreciones por traqueostomía sistema abierto. Señale el enunciado correcto:

- ☐ Hiperventilar al paciente previo a la aspiración.
- ☐ Indicarle al paciente que no tosa entre las aspiraciones.
- ☒ Aspirar por 20 segundos en cada ocasión. ✗ Esta respuesta es incorrecta porque no se debe aspirar por más de 10 a 15 segundos en cada ocasión.
- ☐ Si el paciente está inconsciente colocarlo en semifowler.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Hiperventilar al paciente previo a la aspiración.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una enfermera durante el turno accede al expediente médico de un paciente para leer los detalles de su diagnóstico y tratamiento, los familiares exigen información porque se encuentran preocupados por la situación del paciente. Según el Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermería (CIE). ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para la enfermera en esta situación?

- ☐ La enfermera debe informar a los familiares sobre la situación del paciente para que puedan tomar decisiones.
- ☒ La enfermera debe conversar con el médico a cargo del paciente para que brinde información a los familiares. ✔ Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador, el acceso indebido a datos personales y la divulgación o utilización ilegal de la información de los expedientes médicos constituyen una infracción penal. Según el CIE las enfermeras mantienen confidencial toda información personal de los pacientes y respetan la privacidad, confidencialidad e intereses de los pacientes en la recopilación de datos e información, su uso, acceso, transmisión, almacenamiento y revelación legítimos, según la legislación vigente. Las enfermeras respetan la privacidad y confidencialidad de los colegas y personas que requieren cuidados y defienden la integridad de la profesión enfermera en todos los medios de comunicación, en particular en las redes sociales.
- ☐ La enfermera debe solicitar al departamento de trabajo social para el acompañamiento a los familiares.
- ☐ La enfermera debe comentar con todo equipo de salud sobre la situación del paciente y la decisión de los familiares.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La enfermera debe conversar con el médico a cargo del paciente para que brinde información a los familiares.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a una investigación con función de temporalidad retrospectiva?

- ☐ Se asigna un factor de estudio, el cual es controlado para la realización de la investigación.
- ☐ Cuando el investigador se limita a observar sin intervenir en el suceso.
- ☐ Los datos se obtienen al inicio de la investigación, cuando aún no han aparecido los efectos.
- ☒ El inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. ✔ El estudio retrospectivo se trata del tipo de investigación que inicia posteriormente a los hechos que se van a estudiar.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el centro de salud se ha identificado un incremento de problemas de salud prevenibles. Como profesional de enfermería va a realizar un programa educativo para la promoción de la salud, utilizando la técnica que, desde la acción-reflexión-acción, analiza una problemática de salud que afecta a la comunidad, para la construcción colectiva de conocimientos que combinan teoría y práctica y dan lugar a aprendizajes significativos. ¿Cuál es la técnica de aprendizaje cooperativo descrita?

- ☐ Casa abierta.
- ☒ Talleres. ✓ La opción de respuesta es correcta. El taller es la estrategia pedagógica que, desde la acción-reflexión-acción, analiza una problemática de salud que afecta a un grupo o comunidad y toma acciones frente a la misma. En el marco del enfoque socio crítico, el taller constituye la principal técnica para la construcción colectiva de conocimientos que combinan teoría y práctica y dan lugar a aprendizajes significativos.
- ☐ Ferias de la salud.
- ☐ Murgas por la salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Talleres.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué aislamiento corresponde un paciente que llega al servicio con diagnóstico de celulitis?

- ☐ Aislamiento por gotas.
- ☒ Aislamiento por contacto. ✓ Respuesta correcta:
Aislamiento por contacto: Las precauciones de contacto se aplican a pacientes específicos, infectados/colonizados o sospechosos de estarlo con microorganismos epidemiológicamente importantes que pueden transmitirse por contacto directo o indirecto que pueden ser abscesos importantes, celulitis o decúbitos.
- ☐ Aislamiento por aire.
- ☐ Aislamiento estándar.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aislamiento por contacto.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente femenina de 60 años, diagnosticada con cáncer de mama, que posterior a recibir radioterapia presenta alteraciones en la piel. ¿Qué intervención de enfermería usted realizaría en esta paciente?

- ☐ Lavar frecuentemente la zona.
- ☐ Aplicar apósitos térmicos o hielo.
- ☒ Valorar las vesículas que se forman. La rotura de las vesículas interrumpe la integridad cutánea y aumenta el riesgo de infección.
- ☐ Aplicar talco, lociones y ungüentos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Valorar las vesículas que se forman.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted se encuentra en el área de Coronarios y debe administrar medicamentos bajo medidas de seguridad, pero evidencia la inexistencia de protocolos. ¿Cuál es la situación a la que se enfrenta el personal de enfermería?

- ☐ Seguridad del paciente.
- ☐ Error activo.
- ☐ Suceso adverso.
- ☒ Factor contribuyente. Factor contribuyente: es la circunstancia, acción o influencia que se considera que se ha desempeñado un papel en el origen o la evolución de un incidente, o que aumentado el riesgo que se produzca, dichos factores pueden ser externos a la organización por ejemplo la inexistencia de protocolos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Factor contribuyente.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione la herramienta metodológica con el literal respectivo:

1. Diagnóstico dinámico	a. Debe de realizarse con la participación de los actores locales y se orienta a identificar las necesidades de salud.
2. Mapa parlante	b. Es un espacio de convergencia donde se dan aproximaciones al análisis de la situación de salud en una población determinada.
3. Sala situacional	c. Son instrumentos técnicos y metodológicos que permiten conocer en forma gráfica el proceso vivido por los actores locales, los factores de riesgo y protección.
4. Diagnóstico situacional	d. Se orienta la actualización periódica de la situación inicial e identificar oportunamente a los individuos y familia con posibles y potenciales riesgos.

☐ 1c, 2b, 3a, 4d

☐ 1a, 2c, 3d, 4b

☐ 1b, 2d, 3c, 4a

☒ 1d, 2c, 3b, 4a

Esta respuesta es correcta:

- Diagnóstico dinámico: Se orienta la actualización periódica de la situación inicial e identificar oportunamente a los individuos y familia con posibles y potenciales riesgos.
- Mapa parlante: Son instrumentos técnicos y metodológicos que permiten conocer en forma gráfica el proceso vivido por los actores locales, los factores de riesgo y protección.
- Sala situacional: Es un espacio de convergencia donde se dan aproximaciones al análisis de la situación de salud en una población determinada.
- Diagnóstico situacional: Debe de realizarse con la participación de los actores locales y se orienta a identificar las necesidades de salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1d, 2c, 3b, 4a

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tratamiento del dolor oncológico en adultos, de acuerdo con la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud modificada. ¿En qué caso se utiliza tramadol?

- ☐ Escala visual análoga 10
- ☒ Escala visual análoga 5-6  De acuerdo con la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud modificada, en el dolor moderado EVA 5-6, se utilizan opioides débiles como el tramadol.
- ☐ Escala visual análoga 7-9
- ☐ Escala visual análoga 1-4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Escala visual análoga 5-6

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La NANDA incluye algunas etiquetas diagnósticas para pacientes con problemas respiratorios. Relacione las etiquetas diagnósticas con las intervenciones de enfermería que correspondan:

NANDA ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS	NIC INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
1. Limpieza ineficaz de vías aéreas.	a) Oxigenoterapia y control de su eficacia.
2. Deterioro del intercambio de gases.	b) Monitorización respiratoria.
3. Patrón respiratorio ineficaz.	c) Aspiración de las vías aéreas.
4. Riesgo de aspiración.	d) Incremento de la tos.

- ☐ 1a, 2b, 3c, 4d
- ☐ 1c, 2b, 3d, 4a
- ☐ 1b, 2a, 3d, 4c
- ☒ 1d, 2c, 3a, 4b  La respuesta correcta es 1b, 2a, 3d, 4c

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1b, 2a, 3d, 4c

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?

- ☐ Frecuencia cardíaca por volumen diastólico.
- ☐ Frecuencia cardíaca por volumen sanguíneo.
- ☐ Frecuencia cardíaca por volumen cardíaco.
- ☒ Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ✔ Esta respuesta es correcta porque se denomina gasto cardíaco o débito cardíaco al volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto. El gasto cardíaco constituye la resultante final de todos los mecanismos que normalmente determinan la función ventricular (frecuencia cardíaca, contractilidad, sinergia de contracción, precarga y poscarga). $\text{Gasto Cardíaco} = \text{FC} \times \text{VS}$ (VS= volumen sistólico de eyección; FC= frecuencia cardíaca); en condiciones normales, VS= 70 ml/latido.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca por volumen sistólico.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 48 años que ingresa al servicio de emergencia tras sufrir una lesión encefálica traumática frontal luego de haber recibido un golpe en la cabeza con un bate de béisbol, provocándole una contusión cerebral en el sitio de impacto. ¿Qué mecanismo de lesión cefálica recibió el paciente?

- ☒ Lesión de aceleración. ✔ Respuesta correcta:
La lesión de aceleración ocurre cuando un objeto en movimiento golpea a la cabeza estática.
- ☐ Lesión de desaceleración.
- ☐ Lesión de contragolpe.
- ☐ Lesión rotacional.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Lesión de aceleración.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones cumple la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente?

- ☐ Implementar mecanismos de sanción.
- ☐ Informar solo eventos adversos.
- ☐ Presentar a los responsables.
- ☒ Complementar mejoras continuas. ✔ La notificación de eventos constituye una estrategia clave para aprender de los errores y evitar su recurrencia. Los informes se analizan de forma urgente y se elaboran una serie de recomendaciones que son divulgadas a las personas pertinentes. Las recomendaciones para mejorar los procesos de atención al paciente van encaminadas al sistema y a las personas que intervinieron en la ocurrencia del evento adverso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Complementar mejoras continuas.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué instrumento se utiliza para detectar el grado de funcionalidad (o disfunción) de la familia?

- ☐ Ficha familiar.
- ☒ Apgar familiar. ✔ Según el MAIS - FCI, el Apgar familiar constituye un instrumento para detectar el grado de funcionalidad (o disfunción) de la familia.
- ☐ Visita domiciliaria.
- ☐ Familiograma.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Apgar familiar.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El profesional de enfermería está valorando a un paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que presenta disnea, una de sus intervenciones es administrar oxígeno bajo prescripción médica para mantener una saturación al menos del 90%. De acuerdo con la Teoría de las Necesidades Humanas de Virginia Henderson. ¿Cuál es la acción prioritaria?

- ☐ Administrar broncodilatadores y mucolíticos.
- ☒ Colocar al paciente en posición semi fowler. Esta respuesta es correcta porque ayudar al paciente a mantener una posición semi fowler facilita la respiración, refleja la aplicación de la teoría de enfermería de Virginia Henderson, que se centra en ayudar a los pacientes a satisfacer sus necesidades básicas y promover la independencia en la realización de actividades esenciales. En este caso, ayudar al paciente a encontrar una posición cómoda puede ayudar a facilitar la respiración y mejorar la comodidad respiratoria del paciente.
- ☐ Extraer muestras de sangre para análisis bioquímico.
- ☐ Proporcionar al paciente educación sobre los efectos adversos de los medicamentos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Colocar al paciente en posición semi fowler.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las actividades que realizan los enfermeros en la atención directa al paciente, requieren recolectar información para conocer la calidad del servicio, evaluar y a partir de la cual se elaboran los planes, se toman las decisiones estratégicas, se corrigen los procesos. ¿Qué instrumento utilizaría para recolectar información?

- ☐ Observación.
- ☐ Encuesta.
- ☐ El histograma.
- ☒ Lista de cotejo. Esta opción de respuesta es la correcta porque las listas de cotejo pueden ser simple o compleja, se utiliza para concentrar información por categorías previamente definidas, como son: opiniones de los pacientes, medición del desempeño, riesgo profesional, frecuencia en la ocurrencia de eventos de calidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Lista de cotejo.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué consiste el Proceso de Atención de Enfermería?

- ☐ Aplicación de habilidades y destrezas para el ejercicio de la práctica.
- ☒ Aplicación del método ordenado y científico en la práctica asistencial de enfermería. ✔ El Proceso de Atención de Enfermería es un método ordenado, sistemático que obtiene información e identifica los problemas reales o potenciales de salud, toma decisiones y evalúa los resultados, bases fundamentales del método científico.
- ☐ Proceso que al ejecutarse humaniza la atención e integra el cuidado.
- ☐ Proceso que se orienta a mejorar y resolver los problemas de salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aplicación del método ordenado y científico en la práctica asistencial de enfermería.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la escala que se utiliza para evaluar la probabilidad de que un paciente adulto sufra una caída?

- ☐ Escala de Caprini.
- ☐ Escala de Emina.
- ☒ Escala de Morse. ✔ Escala de Morse: Es una herramienta rápida y simple para evaluar la probabilidad de que un paciente adulto sufra una caída.
- ☐ Escala de Braden.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Escala de Morse.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el mecanismo de pérdida de calor corporal asociado a exposición de la piel y/o tracto respiratorio del recién nacido a una concentración de humedad menor a la necesaria?

- ☐ Conducción.
- ☐ Radiación.
- ☐ Convección.
- ☒ Evaporación. ✓ La evaporación es el mecanismo de pérdida de calor corporal asociado a exposición de la piel y/o tracto respiratorio a una concentración de humedad menor a la necesaria. Se da mediante un proceso fisiológico de las características de la piel húmeda y fina al nacimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evaporación.

Pregunta 30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la opción que responde a lo enunciado en las teorías fisiológicas del envejecimiento?

- ☐ El envejecimiento se debe a los procesos degenerativos que sufre el colágeno, ocasionando rigidez.
- ☐ El envejecimiento se debe a que tenemos una programación interna de vida en nuestro genoma.
- ☐ El envejecimiento se debe a la tensión a la que nos sometemos día a día, desgastando nuestras capacidades.
- ☒ Los radicales libres producidos en las vías metabólicas de organismos aerobios están implicados en el envejecimiento. ✗ Teoría del envejecimiento celular; esta opción es considerada dentro de las teorías bioquímicas y metabólicas del envejecimiento. Por lo tanto, no corresponde a una teoría fisiológica.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El envejecimiento se debe a la tensión a la que nos sometemos día a día, desgastando nuestras capacidades.

Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al valorar un paciente con trauma craneoencefálico, usted observa apertura ocular al dolor, al preguntar la fecha le responde de manera confusa y al evaluar la respuesta motora localiza el dolor. De acuerdo a la Escala del Coma de Glasgow, señale la puntuación correspondiente en este caso:

☐ 11

☐ 12

☒ 9 ✖ Respuesta incorrecta:

Aplicando la Escala del Coma de Glasgow, el paciente en este caso tiene: Respuesta de apertura ocular al dolor (2), respuesta verbal de manera confusa (4) y respuesta motora localizando el dolor (5). Estas puntuaciones suman un total de 11.

☐ 10

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 11

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el cuidado prioritario de enfermería en pacientes con Diabetes Mellitus?

- ☒ Control glucémico. ✓ Esta opción de respuesta es la correcta porque la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por hiperglucemia, debido a defectos en la secreción de insulina, la misma que tiene el papel de transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa y las células hepáticas, donde puede almacenarse o utilizarse como fuente de energía.
- ☐ Administración de glucosa intravenosa.
- ☐ Administración de líquidos y electrolitos.
- ☐ Control de dieta hiperproteica e hipograsa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Control glucémico.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Acude a la consulta una mujer que ha tomado anticoncepción hormonal oral y refiere que ha presentado diarrea, vómito, náusea y desea cambiar de método anticonceptivo. ¿Cuál es la recomendación que se debe valorar?

- ☒ La inocuidad del método que viene determinada por la ausencia de riesgos de salud. ✔ Es claramente correcta porque habla de la seguridad o inocuidad de un método anticonceptivo que hace referencia a los efectos del método sobre la salud (Organización Mundial de la Salud. Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, 2018).
- ☐ El índice de Pearl que refleja el porcentaje de no embarazos de un método anticonceptivo.
- ☐ La motivación o condicionamientos socioculturales como el nivel de educación que se tiene.
- ☐ La aceptabilidad del método que viene determinada por la ausencia de efectos colaterales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La inocuidad del método que viene determinada por la ausencia de riesgos de salud.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer gestante de 25 años, acude por primera vez al Centro de Salud para el control prenatal. Se dirige al área de estadística para la apertura de la historia clínica, durante la atención, el personal de enfermería prepara y educa sobre la importancia del uso del carnet prenatal como un documento que propicia el control de seguimiento durante el embarazo. ¿Cuáles son los datos que registra el personal de enfermería en el carnet prenatal?

- ☒ Datos generales de la mujer embarazada, registro de valores de presión arterial, peso, talla y vacuna antitetánica si tiene o no. ✔ Datos generales para conocer la identificación, lugar de procedencia de la mujer embarazada que nos facilitará para el control del tarjetero de mujeres embarazadas y visita domiciliaria que se le puede realizar. Registro de presión arterial es crucial para el diagnóstico y el manejo de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Control de peso y talla para facilitar la valoración del estado nutricional y registro de la vacuna antitetánica para prevenir el tétanos materno y neonatal.
- ☐ Datos generales de la mujer embarazada, toma de peso, talla, índice de masa corporal y vacuna antitetánica si tiene o no.
- ☐ Datos generales de la mujer, registro de presión arterial, índice de masa corporal y vacuna antitetánica si tiene o no.
- ☐ Registro de valores de presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y vacuna antitetánica si tiene o no.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Datos generales de la mujer embarazada, registro de valores de presión arterial, peso, talla y vacuna antitetánica si tiene o no.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el SCORE mamá está indicado el uso de un medicamento en caso de toxicidad por sulfato de magnesio. ¿Cuál es el medicamento, concentración, dosis, tiempo y vía correcta de administrar?

- ☐ Gluconato de calcio al 10 %, 4 g por vía intravenosa en 20 minutos.
- ☐ Gluconato de calcio al 20 %, 2 g por vía intravenosa en 20 minutos.
- ☒ Gluconato de calcio al 10 %, 1 g por  En el SCORE mamá kit azul, se indica que en caso de Toxicidad por el sulfato de magnesio, aplicar gluconato de calcio al 10 %, 1 g por vía intravenosa en 10 minutos.
- ☐ Gluconato de calcio al 10 %, 2 g por vía intravenosa en 10 minutos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Gluconato de calcio al 10 %, 1 g por vía intravenosa en 10 minutos.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 26 años secundigesta, con antecedente de diabetes mellitus, embarazo a término llega a la emergencia en período expulsivo, refiere mucho dolor. En la valoración presenta dilatación del cuello uterino de 10 cm y las contracciones uterinas son regulares, a intervalos de 3 min, con una duración de 70 segundos, se traslada para sala de parto, se realiza parto distócico por desproporción cefalopélvica, obteniendo recién nacido con peso de 4000 gramos. En la revisión de cavidad presenta desgarro que afecta a la horquilla perineal, la piel perineal, mucosa vaginal, piel, aponeurosis y los músculos del periné, sin llegar al esfínter anal. ¿Cuál de las clasificaciones de los desgarros pertenece a este caso?

- ☐ Desgarro perineal grado I.
- ☐ Desgarro perineal grado IV.
- ☐ Desgarro perineal grado III.
- ☒ Desgarro perineal  El desgarro afecta a la horquilla perineal, la piel perineal, mucosa vaginal, piel, aponeurosis y los músculos del periné, sin llegar al esfínter anal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Desgarro perineal grado II.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la visita domiciliaria, el enfermero comunitario al revisar el carnet de inmunización de un niño de 9 meses se da cuenta que solo se le administraron las vacunas que corresponden hasta los 2 meses. Para continuar el esquema de vacunación. ¿Qué vacunas le corresponde administrar?

- ☒ Segunda dosis de: fipV, pentavalente, neumococo. ✔ El caso trata de un niño de 9 meses al que se debe administrar la segunda dosis de las vacunas: fipV, pentavalente y neumococo (hasta los 11 meses 29 días para completar el Esquema de Vacunación según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador)
- ☐ Segunda dosis de: Rotavirus, fipV, pentavalente, neumococo.
- ☐ Segunda dosis de: HB, pentavalente, neumococo.
- ☐ Segunda dosis de: pentavalente, neumococo, SRP.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Segunda dosis de: fipV, pentavalente, neumococo.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las actividades del profesional de enfermería se encuentra ayudar a trasladar al paciente desde la cama a la silla de ruedas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye un principio de la mecánica corporal?

- ☒ A mayor base de sustentación, mejor será el equilibrio. ✔ La mecánica corporal es el término que se utiliza para describir el uso eficiente, coordinado y seguro del cuerpo para mover objetos y realizar las actividades de la vida diaria. El equilibrio depende de la interrelación entre el centro de gravedad, la línea de gravedad y la base de sustentación, cuanto más amplia sea la base de sustentación y más bajo esté el centro de gravedad, mayor será la estabilidad y el centro del equilibrio.
- ☐ Alejar un objeto del cuerpo mejora la estabilidad.
- ☐ A menor base de sustentación, mejor será el equilibrio.
- ☐ Al flexionar las rodillas aumenta el centro de gravedad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: A mayor base de sustentación, mejor será el equilibrio.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un recién nacido a término con peso de 2950 gramos, en los resultados de grupo y factor sanguíneo es ARH+, madre ORH+. A la valoración se observa icterico hasta zona de Kramer 3, presenta bilirrubinas totales de 15.5 mg/dl. ¿Cuál es la patología del recién nacido?

- ☐ Ictericia de leche materna.
- ☐ Hiperbilirrubinemia fisiológica.
- ☐ Ictericia por deshidratación.
- ☒ Hiperbilirrubinemia patológica. ✔ Esta es la respuesta correcta porque la incompatibilidad surge debido a la transferencia transplacentaria de los anticuerpos anti-A y anti-B naturales del feto.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hiperbilirrubinemia patológica.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la dosis de impregnación de sulfato de magnesio para el tratamiento de eclampsia?

- ☐ 2 g/hora en infusión continua.
- ☐ 1 g/hora en infusión continua.
- ☒ 6 g intravenoso en 20 minutos. ✔ La dosis de impregnación de sulfato de magnesio en eclampsia es de 6 g intravenoso en 20 minutos.
- ☐ 4 g intravenosa en 20 minutos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 6 g intravenoso en 20 minutos.

Pregunta 41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente que permanece encamado con movilidad muy limitada, al examen físico se observa herida en región sacra de espesor completo que se extiende al tejido subcutáneo y necrosis. ¿A qué etapa en la evolución de las úlceras por presión corresponde el caso?

- ☐ Etapa IV
- ☐ Etapa I
- ☐ Etapa II
- ☒ Etapa III ✔ Esta respuesta es correcta porque en la etapa 3 la úlcera se extiende dentro del tejido subcutáneo, continua la necrosis y el drenaje, aparece infección, herida de espesor completo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Etapa III

Pregunta 42

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione los cuidados de enfermería posoperatorio inmediato en cesárea:

1. Administrar antiinflamatorios no esteroideos post-cesárea.
2. Retirar el apósito 24 horas después de la cesárea.
3. Monitoreo específico para la fiebre.
4. Controlar la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial.
5. Evaluar la herida para detectar señales de infección.
6. Control del sangrado, cada media hora durante 2 horas.
7. Limpiar suavemente y secar la herida diariamente.

- ☐ 3, 1, 6, 7
- ☐ 1, 2, 4, 5
- ☒ 3, 4, 5, 6 ✘ Se realiza después de la recuperación de la anestesia.
- ☐ 2, 3, 5, 7

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 2, 3, 5, 7

Pregunta 43

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una enfermera en servicio de salud rural al inicio de su labor extramural observa que no existe intervención de actores sociales, siendo este uno de los aspectos fundamentales del Análisis Situacional Integral de Salud (ASIS), como la dinamización de la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y contraloría social. En este proceso se incluye la conformación del comité local de salud en coordinación con el establecimiento de salud, para identificación de acciones para el fortalecimiento de la gestión comunitaria ¿En qué fase se debe realizar el proceso antes mencionado?

- ☐ Cuarta fase.
- ☐ Tercera fase.
- ☐ Segunda fase.
- ☒ Primera fase. ✖ No es correcta porque en la primera fase se realiza la producción del diagnóstico situacional (MSP, 2014)

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Segunda fase.

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como profesional de enfermería en el área de urgencias, atiende a un paciente con problemas respiratorios, la prescripción indica administrar oxígeno por cánula nasal 2 litros por minuto. ¿Qué concentración de FIO₂ está administrando con el volumen y dispositivo del caso?

- ☐ 24%
- ☐ 32%
- ☒ 28% ✔ La concentración de FIO₂ del 28% se consigue administrando 2 litros de oxígeno por minuto por cánula nasal.
- ☐ 40%

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 28%

Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El ESAMyN es la Normativa Sanitaria para la Certificación de Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño, se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal a través de: la atención adecuada a la gestante, el parto humanizado, y el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna. Este consta de cuatros componentes y 24 pasos. ¿Cuál de los siguientes pasos corresponde al componente (B)?

- ☒ Captar y controlar a madres embarazadas y asegurar el tratamiento de las mujeres en riesgo.  Es correcto porque forma parte de los pasos del componente (B) que corresponde a la atención prenatal.
- ☐ Garantizar un ambiente acogedor y el respeto de prácticas interculturales.
- ☐ Permitir el acompañamiento por una persona de elección de la madre antes, durante y después del parto.
- ☐ Capacitar y dar a conocer la norma en el establecimiento de salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Captar y controlar a madres embarazadas y asegurar el tratamiento de las mujeres en riesgo.

Pregunta 46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al valorar el pulso a un paciente, usted percibe que el mismo es irregular y a cada pulsación fuerte le sigue una débil. ¿Qué alteración del pulso presenta este paciente?

- ☐ Pulso intermitente.
- ☒ Pulso alternante.  El pulso alternante se caracteriza por ser irregular, y a cada pulsación fuerte le sigue una débil. Sucede en casos de degeneración de la fibra miocárdica.
- ☐ Pulso paradójico.
- ☐ Pulso bigeminado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pulso alternante.

Pregunta 47

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 80 años con diagnóstico de cáncer de próstata, el médico insiste que debe recibir quimioterapia, pero se niega a recibir el tratamiento. Determine el principio vulnerado por el profesional en la toma de decisiones éticas.

- ☐ Veracidad.
- ☐ Beneficencia.
- ☒ Autonomía. ✓ Autonomía: El paciente o la familia esperan que el médico respete el derecho a negarse a un tratamiento. La principal responsabilidad para la toma de decisiones puede derivarse a otras personas, como familiares, ancianos o la comunidad religiosa. Se considera que la familia y la comunidad están afectados por el estado y las decisiones del paciente tanto como el propio individuo.
- ☐ No Maleficencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Autonomía.

Pregunta 48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes aspectos debe tener en cuenta al valorar el riesgo de úlcera por presión según la escala de Braden?

1. Respuesta verbal.
2. Percepción sensitiva.
3. Nutrición.
4. Apertura ocular.
5. Fuerza de cizallamiento.
6. Caída previa.

- ☒ 2, 3, 5 Respuesta correcta:
- 5 La escala de Braden tiene en cuenta los siguientes aspectos:
- Percepción sensitiva
 - Humedad.
 - Actividad.
 - Movilidad.
 - Nutrición.
 - Fuerza de cizallamiento.

La respuesta verbal y apertura ocular corresponden con la escala de Glasgow, mientras que la caída previa pertenece a la escala de Morse que evalúa el riesgo de caída.

- ☐ 1, 3, 6
- ☐ 4, 5, 6
- ☐ 1, 2, 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2, 3, 5

Pregunta 49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La paciente NN es asmática y fumadora desde hace 15 años. Al realizar la Valoración como primera etapa del Proceso de Atención de Enfermería, en la necesidad de respirar normalmente según Virginia Henderson, presenta disnea, cianosis, sonidos respiratorios adventicios, produce esputo con frecuencia y tos inefectiva. ¿Cuál es el dominio alterado de la Taxonomía NANDA que usted debe identificar previo a la construcción del diagnóstico de Enfermería con formato PES?

- ☒ Dominio Seguridad/protección. El Dominio Seguridad/protección habla de ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario; prevención de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad.
- ☐ Dominio Percepción/cognición.
- ☐ Dominio Principios vitales.
- ☐ Dominio Confort.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dominio Seguridad/protección.

Pregunta 50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los siguientes enunciados tienen relación con el recién nacido prematuro, EXCEPTO:

- ☐ La evaluación es a través del test de Apgar.
- ☒ La termorregulación es eficaz, por el exceso de grasa subcutánea. Los prematuros presentan inestabilidad térmica, debido a la inmadurez del centro de termorregulación del SNC.
- ☐ El masaje cardiaco se realiza cuando existe frecuencia cardiaca inferior de 80 latidos por minuto.
- ☐ El peso es un indicador para determinar la viabilidad del neonato.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La termorregulación es eficaz, por el exceso de grasa subcutánea.

Pregunta 51

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál elemento del Código de Ética del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) se encuentra vulnerado cuando el profesional de enfermería acude al turno con problemas en su salud?

- ☒ La enfermera y la práctica.  En éste elemento se establece que "La enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no comprometa su capacidad para dispensar cuidados."
- ☐ La enfermera y las personas.
- ☐ La enfermera y la profesión.
- ☐ La enfermera y sus compañeros de trabajo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La enfermera y la práctica.

Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función de la gestión de enfermería comunitaria, que trata de asegurar que su trabajo responda en forma sistemática, racional y ordenada a las necesidades de la comunidad asegurando el uso adecuado de los recursos, corresponde a:

- ☐ Función investigadora.
- ☐ Función educador.
- ☐ Función asistencial.
- ☒ Función administrativa.  Función administrativa; el profesional enfermero/ra comunitario, trata de asegurar que su trabajo responda de forma sistemática, racional y ordenada a las necesidades de la comunidad asegurando el uso adecuado de los recursos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Función administrativa.

Pregunta 53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la localización del dolor abdominal como consecuencia del engrosamiento de la vesícula biliar en un paciente con Dengue?

- ☐ Dolor epigástrico.
- ☒ Dolor hipocondrial derecho.  El dolor hipocondrial derecho se produce por el engrosamiento súbito de la pared de la vesícula biliar. Sin signos de inflamación, puede confundirse con colecistitis alitiásica.
- ☐ Dolor hipocondrial izquierdo.
- ☐ Dolor abdominal difuso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dolor hipocondrial derecho.

Pregunta 54

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione las medidas de control administrativo en el primer nivel de atención con respecto a la Guía clínica de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis 2018:

1. Realizar la búsqueda permanente de sintomáticos respiratorios en todas las áreas y servicios de los establecimientos de salud.
2. Se recomienda el uso de respiradores N95 en personal de salud, administrativo, vigilancia y seguridad, así como visitas y acompañantes.
3. Las salas de espera en la consulta externa deben ser abiertas y bien ventiladas.
4. El momento de ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.
5. Evitar la circulación de personas con TB bacteriológicamente positiva fuera de sus habitaciones.
6. Elaborar un plan de control de infecciones en el establecimiento de salud.
7. El talento humano en salud con algún tipo de inmunodepresión no sea asignado a áreas de alto riesgo de contagio de TB.

- ☐ 1, 2, 4, 5, 6
- ☒ 1, 4, 5, 6, 7  El ítem 5 que señala la circulación de personas con TB bacteriológica mente positiva fuera de sus habitaciones, es una medida de control administrativo, pero en el área hospitalaria.
- ☐ 1, 3, 4, 6, 7
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 3, 4, 6, 7

Pregunta 55

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 35 años que se encontraba reparando la ventana sufre corte a nivel de antebrazo por lo que acude al servicio de emergencia, a la inspección se observa herida cortopunzante y sangrante de aproximadamente 3 centímetros de longitud, por lo que el médico decide realizar curación previo a sutura de aproximación y tratamiento farmacológico. De acuerdo con el caso planteado. ¿Qué antiséptico menos irritante y con agentes tensoactivos se utiliza para la curación de este tipo de herida?

- ☐ Alcohol.
- ☒ Yodopovidona. ✓ Los yodóforos (yodopovidona) son la combinación de yodo con agentes tensoactivos (detergentes), formando así un complejo que libera lentamente yodo orgánico. Este efecto determina una menor irritación de la piel y una mayor disponibilidad del producto en el tiempo. Tienen amplio espectro de actividad contra bacterias y hongos y presentan el mismo mecanismo de acción y espectro de actividad de los yodados. Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud (Página 59-61).
- ☐ Clorhexidina al 0.12%.
- ☐ Glutaraldehído.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Yodopovidona.

Pregunta 56

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al finalizar la jornada laboral, el profesional enfermero encargado de la gestión interna de desechos y el personal de limpieza en la unidad operativa de primer nivel se encargan de recolectar los residuos del establecimiento de salud. Una vez recopilados todos los desechos, los trasladan al área de almacenamiento temporal para que sean recolectados al día siguiente por el servicio externo de gestión de residuos. ¿Qué tipo de gestión se ha aplicado?

- ☐ Transporte interno.
- ☐ Almacenamiento final.
- ☐ Almacenamiento inicial.
- ☒ Almacenamiento intermedio. ✗ En el almacenamiento intermedio se acopian temporalmente los desechos, debidamente separados hasta su transporte y depósito en el almacenamiento final. Su función es facilitar la recolección interna teniendo una ubicación temporal hasta finalizar la recolección. Esto no se recomienda aplicar al tener disponibilidad de personal, como en el caso descrito, que existe personal de limpieza y un responsable de la gestión interna.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Almacenamiento final.

Pregunta 57

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La calidad es un concepto que ha evolucionado hasta nuestros días, existe un pensador que hace referencia a la calidad como la satisfacción del cliente. ¿Cuál es el autor que hace referencia al enunciado?

- ☐ Walter A. Shewhart.
- ☒ W. Edwards Deming. ✔ Según Deming, la calidad puede representarse en un ciclo de acciones correctivas y preventivas que se llamó "Ciclo de Deming". Este ciclo se define en cuatro pasos:
 - 1) Planificar y definir los objetivos a alcanzar y cómo se van a implementar las acciones;
 - 2) Hacer o implementar las acciones correctivas;
 - 3) Verificar y controlar que se logren los objetivos, y
 - 4) Actuar según los resultados en la toma de medidas preventivas.
- ☐ Avedis Donabedian.
- ☐ Joseph M. Juran.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: W. Edwards Deming.

Pregunta 58

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar la auscultación pulmonar escucha un ruido áspero, rechinante, superficial durante la inspiración y la espiración y que no desaparece con la tos. Seleccione el ruido respiratorio adventicio que indica el caso.

- ☐ Estertores crepitantes.
- ☒ Roce pleural. ✔ Respuesta correcta:
Los roces pleurales son sonidos superficiales, crujientes o ásperos que se escuchan durante la inspiración. No desaparecen con la tos.
- ☐ Sibilancias.
- ☐ Roncus.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Roce pleural.

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué recomendación se debe tener en cuenta en la toma de la tensión arterial en pacientes en estado de gestación con trastornos hipertensivos?

- ☐ Usar brazaletes pequeños.
- ☐ Registrar la lectura más baja de tensión arterial tomada en ambos brazos.
- ☐ Tomar la tensión arterial en decúbito supino.
- ☒ Tomar la tensión arterial en decúbito lateral izquierdo. ✓ La posición decúbito lateral izquierdo evita la compresión aorto-cava que provocaría hipotensión. Se debe evitar tomar la tensión arterial en decúbito supino.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tomar la tensión arterial en decúbito lateral izquierdo.

Pregunta 60

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un niño de 5 años presenta un crecimiento lento en su talla, es física y mentalmente parsimonioso, se muestra cansado y friolento. ¿A qué tipo de alteración de crecimiento se refiere el caso descrito?

- ☐ Deficiencia de hormona tiroidea.
- ☒ Deficiencia de hormona de crecimiento. ✗ Esta respuesta es incorrecta ya que en las anormalidades pituitarias pueden causar un número de problemas que da como resultado un retraso de crecimiento: el hipotiroidismo puede venir a consecuencia de una mal función pituitaria.
- ☐ Talla baja familiar.
- ☐ Retraso del crecimiento y la pubertad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Deficiencia de hormona tiroidea.

Pregunta 61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 14 años con 4 horas de evolución post colostomía, al momento la herida se encuentra limpia y seca sin signos de infección. ¿Qué cuidado de enfermería es estricto en este caso?

- ☒ Control de ingesta y eliminación. ✔ Es muy importante llevar un registro del ingreso y eliminación de líquidos, con ello se puede valorar el balance hídrico y evitar signos de deshidratación.
- ☐ Eliminar directamente las secreciones en el sanitario.
- ☐ Programar en quirófano las limpiezas del estoma.
- ☐ Iniciar la dieta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Control de ingesta y eliminación.

Pregunta 62

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El profesional de enfermería líder del servicio de consulta externa se encuentra ante un conflicto generado por la inasistencia del enfermero del área de vacunación, sin previo aviso. Esta situación ha generado un colapso en la atención a los usuarios pediátricos, por lo que le toca hacer un reajuste del personal, iniciando con la contribución de ella en las actividades mientras llega el enfermero que cubrirá el turno. ¿Qué estilo de liderazgo está aplicando el líder de enfermería?

- ☐ Coercitivo.
- ☐ Democrático.
- ☒ Autocrático. ✘ Esta opción de respuesta es incorrecta porque el líder autocrático da énfasis al líder. Es él quien dicta las órdenes, impone su criterio y decide qué y cuándo se hace (Balderas Pedrero, 2009)
- ☐ Directivo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Democrático.

Pregunta 63

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El profesional de enfermería del centro de salud necesita medir las condiciones de vida familiar y comunitario. ¿Cuáles son las variables que debe usar para medir estas condiciones?

- ☐ Índice de desarrollo humano, distribución de ingresos y medir la pobreza.
- ☐ Miembros de la familia, parentesco, riesgo individual, familiar y comunitario.
- ☒ Indicadores sanitarios, medioambientales, sociodemográficos. ✗ Estas son variables que ayudan a medir los determinantes sociales de salud familiar y comunitario.
- ☐ Saber leer y escribir, conocimientos básicos de salud.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Índice de desarrollo humano, distribución de ingresos y medir la pobreza.

Pregunta 64

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente con diagnóstico de sangrado digestivo alto. ¿Cuál es el manejo inicial de enfermería?

- ☐ Administración de pantoprazol, colocación de oxígeno y toma de muestra de heces.
- ☐ Reposición de volumen, toma de muestras y acceso venoso de grueso calibre para medios de contraste.
- ☐ Cuantificación de emesis, monitorización de signos vitales y confort del paciente.
- ☒ Toma de muestras de laboratorio, reposición de volumen y preparación para endoscopia. ✓ Esta opción de respuesta es la correcta porque la biometría hemática nos permite evaluar el hematocrito y hemoglobina que se ven alterados por la pérdida de volumen sanguíneo. La reposición de líquidos y la estabilidad hemodinámica son esenciales para la endoscopia que ofrece un tratamiento inmediato en la hemorragia digestiva y para evitar complicaciones que aumentan la mortalidad del paciente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Toma de muestras de laboratorio, reposición de volumen y preparación para endoscopia.

Pregunta 65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 23 años, que ingresa a la sala de emergencia del hospital, en su valoración presenta hipertermia de 39.7 °C, piel pálida, sudorosa y fría, tos productiva y dificultad para respirar que se acentúa al inspirar. En la revisión de la historia clínica el paciente tiene un diagnóstico clínico de Tuberculosis pulmonar, ha recibido tratamiento con medicamentos anti-tuberculosis por un mes y abandona su tratamiento. ¿Cuál es el caso de acuerdo con la Normativa del Ministerio de Salud del Ecuador?

- ☐ Caso pérdida en el seguimiento recuperado.
- ☐ Caso fracaso.
- ☐ Caso recaída.
- ☒ Caso previamente tratado. ✓ Caso previamente tratado persona que ha recibido tratamiento con medicamentos antituberculosis por un mes o más (antes tratados). con abandono del tratamiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Caso previamente tratado.

Pregunta 66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un método anticonceptivo temporal hormonal combinado?

- ☐ Condón masculino.
- ☒ Parche transdérmico. ✓ El parche transdérmico es un método temporal hormonal combinado que consiste en la administración de un parche el cual contiene dos hormonas: un progestágeno y un estrógeno. Aquí tenemos: anticoncepción oral, inyectable, transdérmica combinada.
- ☐ Dispositivo intrauterino.
- ☐ Ligadura.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Parche transdérmico.

Pregunta 67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Complete el siguiente enunciado:

Las infecciones asociadas con la atención de salud (IAAS) se definen como _____localizados o _____ que se producen como_____ de la permanencia o _____de un paciente en una institución de salud que no estaba presente a su _____.

- ☐ Procesos, generalizados, concurrencia, consecuencia, ingreso.
- ☒ Procesos, generalizados, consecuencia, concurrencia, ingreso. ✓ Las IAAS se definen como procesos localizados o generalizados que se producen como consecuencia de la permanencia o concurrencia de un paciente en una institución de salud, y que no estaba presente a su ingreso. Se estima que en promedio afectan a un 5% de los pacientes internados en los hospitales de pacientes agudos. Las IAAS se consideran como uno de los mejores indicadores de la calidad de atención en salud debido a que en su mayoría están asociadas con la atención directa de pacientes, particularmente al uso de procedimientos invasivos, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos. Su ocurrencia se relaciona con conocimientos y prácticas de atención del equipo de salud.
- ☐ Procesos, generalizados, consecuencia, ingreso, concurrencia.
- ☐ Procesos, consecuencia, generalizados, concurrencia, ingreso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Procesos, generalizados, consecuencia, concurrencia, ingreso.

Pregunta 68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 82 años, ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una caída en su domicilio. Presenta dolor intenso en la cadera derecha, deformidad y limitación funcional. La radiografía confirma una fractura intertrocanterea de cadera. Se programa intervención quirúrgica en las próximas 24 horas. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en las horas previas a la cirugía del paciente?

- ☒ Mantener la extremidad afectada inmovilizada y en posición funcional. ✓ La respuesta es correcta porque mantener la extremidad afectada inmovilizada y en posición funcional en una fractura intertrocanterea de cadera es crucial por varias razones fundamentales: favorecer la consolidación de la fractura, alineación y estabilidad, reducción del dolor, protección de estructuras adyacentes y prevenir complicaciones como el desplazamiento de la fractura.
- ☐ Usar un rollo de trocánter, rotar hacia el lado sano.
- ☐ Administrar antibióticos profilácticos intravenosos antes de la cirugía.
- ☐ Administrar anticoagulantes para evitar el riesgo de trombos por el tiempo de reposo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mantener la extremidad afectada inmovilizada y en posición funcional.

Pregunta 69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hombre de 58 años con antecedentes de Diabetes Mellitus y asma, acude a la consulta al servicio de emergencias del hospital general, luego de haber sufrido un ataque de ansiedad, en la valoración se observa que presenta los siguientes síntomas; disnea, debilidad, mareo y confusión, además, el grado de recorrido de sus respiraciones se encuentra aumentado, a la exploración de los signos vitales se objetiva T 37 °C, R 30 rpm, P 98 lpm y presión arterial 140/80 mm/hg, sin otros hallazgos de interés. ¿Cuál de las alteraciones de la respiración presenta el paciente?

- ☐ Hipoventilación.
- ☐ Taquipnea.
- ☐ Bradipnea.
- ☒ Hiperventilación.  Respuesta correcta: En la hiperventilación la frecuencia y la profundidad de las respiraciones aumentan, además; la ansiedad aguda puede producir hiperventilación y un exceso de eliminación del anhídrido carbónico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hiperventilación.

Pregunta 70

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la sanción a quien incurra en homicidio culposo por mala práctica profesional según el Artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador?

- ☐ De 3 a 5 años con pena privativa de libertad.
- ☒ De 1 a 3 años con  Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional. - La persona que, al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
- ☐ De 1 a 2 años con pena privativa de libertad.
- ☐ De 2 a 3 años con pena privativa de libertad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De 1 a 3 años con pena privativa de libertad.

Pregunta 71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente de 58 años, diagnosticado con enfermedad de Parkinson desde hace un año, acude a consulta externa y presenta temblor en reposo, rigidez muscular y movimientos involuntarios más persistentes. Manifiesta no haber tomado la medicación regularmente. ¿Qué intervención de enfermería es la indicada para el cuidado de este paciente?

- ☒ Educar al paciente y familia sobre las complicaciones y el apego al tratamiento. ✔ La enfermedad de Parkinson es una afección neurodegenerativa crónica que afecta principalmente el sistema motor, causando síntomas como temblor en reposo, rigidez muscular y dificultad para iniciar y controlar los movimientos. El tratamiento principal para el Parkinson implica el uso de medicamentos antiparkinsonianos, como la levodopa, que ayudan a controlar los síntomas. La intervención más apropiada para el cuidado de este paciente es controlar la administración de la medicación prescrita en horarios regulares, tomando en cuenta los 10 correctos. La levodopa, el fármaco más comúnmente utilizado para tratar el Parkinson, tiene un efecto temporal y su eficacia está relacionada con la concentración plasmática. Por lo tanto, es crucial que el paciente tome la medicación en los horarios adecuados para mantener un nivel terapéutico constante en el organismo y minimizar los síntomas motores.
- ☐ Fomentar el consumo de alimentos ricos en vitamina B12.
- ☐ Proporcionar terapia de masaje profundo para aliviar la rigidez muscular.
- ☐ Fomentar la participación en actividades físicas de alto impacto.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Educar al paciente y familia sobre las complicaciones y el apego al tratamiento.

Pregunta 72

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el registro estadístico de nacidos vivos y defunciones del INEC. ¿Cuál es la principal causa de muerte en niños menores de un año en el 2018?

- ☐ Sepsis bacteriana del recién nacido.
- ☐ Malformaciones congénitas del corazón.
- ☒ Dificultad respiratoria del recién nacido. ✔ En el año 2018, la dificultad respiratoria del recién nacido es la principal causa de muerte infantil en menores de un año de edad, con un 16.6 %, según el registro estadístico de nacidos vivos y defunciones 2018, publicado en agosto 2019 por el INEC.
- ☐ Neumonía.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dificultad respiratoria del recién nacido.

Pregunta 73

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 70 años permanece en reposo absoluto por diagnóstico de prótesis total de cadera, al realizar medidas de higiene y confort se observa en región sacra una úlcera de presión grado III. ¿Cuál es la principal característica que presenta este estadio?

- ☒ Pérdida completa del espesor de piel grasa visible.  Esta opción es correcta porque en el estadio III hay una pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea puede estar visible, pero no el hueso, los tendones o los músculos. Pueden encontrarse algunos esfacelos y también pueden identificarse úlceras cavitadas y tunelizadas.
- ☐ Pérdida completa del espesor de los tejidos.
- ☐ Pérdida parcial del espesor de piel aparición de ampolla.
- ☐ Piel íntegra con eritema no blanqueante.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pérdida completa del espesor de piel grasa visible.

Pregunta 74

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione los atributos que debe tener una atención a domicilio por parte de los profesionales de enfermería gestores de casos:

1. Personalización del servicio de atención.
2. Mayor accesibilidad de pacientes y cuidadores a los profesionales, minimizando barreras.
3. Garantizar el uso adecuado del material de ayudas técnicas para el cuidado.
4. Cuidadora familiar incluida como usuario dentro de la cartera de servicios de la Atención Primaria.
5. Efectividad en la capacidad de respuesta del servicio de atención domiciliaria.
6. Facilitar la mejora de la atención domiciliaria al equipo de atención primaria.

- ☐ 2, 4, 5, 6
- ☐ 1, 2, 4, 5
- ☐ 1, 3, 4, 5
- ☒ 2, 3, 5, 6  Son objetivos específicos de la atención del profesional enfermero gestor de casos. Garantizar el uso adecuado del material de ayudas técnicas para el Cuidado. Facilitar la mejora de la atención domiciliaria al equipo de atención primaria. Por tanto no corresponden a los atributos que tiene una atención a domicilio por parte del profesional enfermero gestor de casos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 2, 4, 5

Pregunta 75

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al brindar cuidados de enfermería a pacientes con Hipotiroidismo. ¿Cuál de las siguientes intervenciones usted realiza?

- ☒ Promover el uso de fuentes de calor externas. ✗ Se debe de evitar el uso de fuente de calor externa porque incrementa el riesgo de vasodilatación periférica y colapso vascular.
- ☐ Proporcionar una capa adicional de ropa adecuada y evitar la exposición al frío.
- ☐ Incentivar y orientar sobre el uso de hipnóticos y sedantes para aliviar el insomnio y el nerviosismo.
- ☐ Incrementar el uso de laxantes en los pacientes para prevenir la constipación.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Proporcionar una capa adicional de ropa adecuada y evitar la exposición al frío.

Pregunta 76

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Relacione las vías de administración con las características del proceso de absorción que corresponda:

Vías de administración	Características del proceso de absorción
1. Vía oral.	a. La superficie de absorción es altamente vascularizada.
2. Vía sublingual.	b. Se absorbe a través de los capilares sanguíneos.
3. Vía intramuscular.	c. Superficie de absorción extensa, debido al grosor de la capa mucosa.
4. Vía subcutánea.	d. Escasa vascularización y su absorción es más lenta.

- ☐ 1a, 2b, 3c, 4d
- ☒ 1d, ✗ En la vía sublingual: La mucosa sublingual presenta una superficie de absorción pequeña pero altamente vascularizada y evita la inactivación del fármaco por la acción del metabolismo del primer paso hepático, pero las 1d, 2a, 3c, 4b son incorrectas.
- ☐ 1b, 2c, 3d, 4a
- ☐ 1c, 2a, 3b, 4d

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1c, 2a, 3b, 4d

Pregunta 77

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La morbi-mortalidad neonatal es un problema epidemiológico de gran magnitud en el Ecuador y en toda América, para prevenirlas se han diseñado protocolos basados en evidencia. ¿Cuáles son las intervenciones que previenen el nacimiento de RN prematuros y mejoran su supervivencia?

- ☐ Uso de corticoides antenatales y uso de tocolíticos en el trabajo de parto prematuro.
- ☐ Uso de aspirina en la prevención de preeclampsia y eclampsia.
- ☐ Detección y tratamiento de las ITS y de la infección por estreptococo del grupo B.
- ☒ Suplementación a la madre con ácido fólico y tratamiento de anemia con hierro. ✗ Incorrecta porque aunque son intervenciones basadas en evidencia, básicamente previenen los defectos del tubo neural.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Uso de corticoides antenatales y uso de tocolíticos en el trabajo de parto prematuro.

Pregunta 78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el área de triaje de urgencias obstétricas, usted atiende a una mujer de 38 años con embarazo de 23 semanas, con una tensión arterial de 150/100 mm Hg, presenta proteinuria 350 mg en orina de 24 horas. ¿A qué patología de los trastornos hipertensivos del embarazo corresponde el caso?

- ☐ Eclampsia.
- ☐ Hipertensión arterial crónica.
- ☒ Preeclampsia sin signos de gravedad (leve). ✔ En la Preeclampsia sin signos de gravedad (leve), la tensión arterial sistólica es ≥ 140 mm Hg y < 160 mmHg y/o tensión arterial diastólica ≥ 90 mmHg y < 110 mmHg más proteinuria ≥ 300 mg en orina de 24 horas y sin criterios de gravedad ni afectación de órgano blanco. Por lo tanto, la opción de respuesta es correcta.
- ☐ Hipertensión gestacional.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Preeclampsia sin signos de gravedad (leve).

Pregunta 79

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador establece los diferentes niveles de atención de salud, a uno de ellos lo define como la continuidad a la atención iniciada, la solución a casos no resueltos en el nivel de atención que lo antecede y que requieren atención especializada a través de tecnología sanitaria de mayor complejidad, desarrolla nuevas modalidades de atención como son la cirugía ambulatoria y el hospital del día, es decir no se basa exclusivamente en la cama hospitalaria. ¿A cuál de los niveles de atención se hace referencia?

- ☐ II Nivel de Atención.
- ☐ IV nivel de atención.
- ☐ I nivel de atención.
- ☒ III Nivel de atención. ✗ El tercer nivel de atención corresponde a los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, los centros hospitalarios son de referencia nacional; resuelve los problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza trasplantes, cuidados intensivos, cuenta con subespecialidades reconocidas por la ley.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: II Nivel de Atención.

Pregunta 80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el fenómeno epidemiológico que expresa la prevalencia usual de una enfermedad, en particular en una zona geográfica?

- ☒ Endemia. ✓ La endemia, es la presencia continua de una enfermedad o un agente infeccioso en un área geográfica determinada. Puede también expresar la prevalencia usual de una enfermedad en particular en una zona geográfica.
- ☐ Epidemia.
- ☐ Pandemia.
- ☐ Brote epidémico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Endemia.

Pregunta 81

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione y ordene de forma secuencial los pasos para realizar la revisión bibliográfica en un proyecto de investigación:

1. Utilización de fuentes primarias.
2. Preparación de la revisión.
3. Comprensión de la información.
4. Realización de la búsqueda.
5. Procesamiento de la bibliografía.
6. Utilización de tecnologías informáticas.
7. Redacción de la revisión bibliográfica.

- ☐ 2, 5, 6, 3
- ☐ 2, 4, 5, 7
- ☒ 1, 4, 5, 7  En cuanto a la divulgación del estudio es una actividad que se realiza cuando se ha terminado el estudio de investigación para el conocimiento de los resultados encontrados. No es un paso que considere para la revisión bibliográfica. No es la correcta ya que incluye este paso que no se toma en cuenta.
- ☐ 1, 2, 5, 3

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 2, 4, 5, 7

Pregunta 82

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hacemos un análisis en una determinada población de: hábitos, costumbres, creencias, actitudes, comportamientos. ¿A qué determinantes de la Atención Primaria en Salud del MAIS FCI, corresponde?

- ☐ Determinantes biológicos.
- ☐ Determinantes ambientales.
- ☒ Determinantes conductuales.  La respuesta es correcta porque los determinantes conductuales comprenden todos los hábitos, creencias, actitudes, comportamientos de una población.
- ☐ Determinantes sociales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Determinantes conductuales.

Pregunta 83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un alto grado de participación es la clave de lograr retrasar las consecuencias del declive por el envejecimiento. ¿A qué teoría del envejecimiento corresponde?

- ☐ Genética.
- ☐ Del reloj biológico.
- ☐ De los radicales libres.

☒ De la actividad. ✔ Respuesta correcta:

La teoría del reloj biológico señala que el proceso de envejecimiento está genéticamente programado, existiría el llamado gen del envejecimiento que, en un momento determinado, provocaría la aparición de los cambios moleculares, celulares y de sistemas que se observan con el envejecimiento. La de los radicales libres se basa en un fenómeno común que se produce en las células vivas de los organismos aerobios, el de los procesos o reacciones químicas de oxidación-reducción que generan radicales libres de oxígeno. La teoría genética es la que más se acercan a la intimidad del proceso del envejecimiento, sostienen que en el ciclo de réplica celular se pierde una pequeña porción de ADN hasta provocar la muerte de la célula, la herencia condiciona la longevidad. La de la Actividad señala que un alto grado de participación es la clave de lograr un retraso en el envejecimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De la actividad.

Pregunta 84

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como profesional de enfermería en el área de Urgencias, atiende a un paciente con problemas respiratorios, la prescripción médica indica administrar oxígeno por cánula nasal 4 litros por minuto. ¿Qué concentración de FIO₂ está administrando con el volumen y dispositivo del caso?

- ☐ 40%
- ☐ 24%
- ☒ 36% ✔ La opción de respuesta es correcta. Al administrar 4 litros de oxígeno por minuto por cánula nasal, se está administrando una concentración de FIO₂ del 36%.
- ☐ 32%

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 36%

Pregunta 85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siguientes son prácticas de enfermería idóneas para mejorar el amamantamiento y garantizar la lactancia exclusiva, EXCEPTO:

- ☐ Rondas diarias para extracción manual.
- ☒ Promoción del uso del biberón. ✔ El uso del biberón está relacionado con mayores alteraciones maxilofaciales e incontrolado volumen de ingesta de alimentos por parte del recién nacido durante el período postparto. Lo idóneo son prácticas sencillas y novedosas que propicien la disminución del abandono de la alimentación con leche humana tales como evitar el baño temprano, promoción del alojamiento conjunto, extracción manual de leche materna y la alimentación con cuchara en aquellos casos en que la succión sea contraindicada, como en los casos de prematuridad y bajo peso al nacer.
- ☐ Alimentación con cuchara.
- ☐ Educar a la madre sobre la técnica de amamantamiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Promoción del uso del biberón.

Pregunta 86

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Usted planifica una visita domiciliar a una comunidad donde se identifican problemas de desnutrición en niños menores de 5 años en una zona urbano-marginal. Como personal de enfermería debe realizar un plan de cuidados. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería principal que usted utiliza en este caso?

- ☒ Disposición para mejorar la gestión de la salud. ✘ Se define como el patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que puede ser reforzado.
- ☐ Mantenimiento ineficaz de la salud.
- ☐ Gestión ineficaz de la salud familiar.
- ☐ Salud deficiente de la comunidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Salud deficiente de la comunidad.

Pregunta 87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione los componentes con sus características:

Componente	Característica
1. Componente de provisión de servicios de salud del sistema nacional de salud.	a) Niveles de Atención: Tipología y homologación de establecimientos de salud, Organización de los equipos de atención integral de salud, Organización y funcionamiento de la Red Pública Integral de Salud y Complementaria.
2. Componente de organización del sistema nacional de salud.	b) Herramientas de diagnóstico y monitoreo de las condiciones de salud: Análisis Integral de Salud – ASIS, diagnóstico dinámico, mapa parlante y sala situacional.
3. Componente de gestión del sistema nacional de salud.	d) Planes Estratégicos nacionales, zonales, distritales, provinciales y en circuitos. Proyectos en salud de las organizaciones que forman el SNS.
4. Componente de financiamiento del sistema nacional de salud.	c) Elementos; Grupos de población a quienes se entregará la atención, Conjunto de prestaciones por ciclos de vida, Escenarios de atención, Modalidades de Atención, Estrategias y herramientas para brindar las prestaciones integrales de salud: visita familiar, ficha familiar.

- ☒ 1c, 2a, 3b, 4d  Esta es la relación correcta de acuerdo con el Manual del Modelo de Atención Integral de Salud - MAIS del Ministerio de Salud Pública del Ecuador:
- Componente de provisión de servicios de salud del sistema nacional de salud: Elementos; Grupos de población a quienes se entregará la atención, Conjunto de prestaciones por ciclos de vida, Escenarios de atención, Modalidades de Atención, Estrategias y herramientas para brindar las prestaciones integrales de salud: visita familiar, ficha familiar.
 - Componente de organización del sistema nacional de salud: Niveles de Atención: Tipología y homologación de establecimientos de salud, Organización de los equipos de atención integral de salud, Organización y funcionamiento de la Red Pública Integral de Salud y Complementaria.
 - Componente de gestión del sistema nacional de salud: Herramientas de diagnóstico y monitoreo de las condiciones de salud: Análisis Integral de Salud – ASIS, diagnóstico dinámico, mapa parlante y sala situacional.
 - Componente de financiamiento del sistema nacional de salud: Planes Estratégicos nacionales, zonales, distritales, provinciales y en circuitos. Proyectos en salud de las organizaciones que forman el SNS.
- ☐ 1b, 2a, 3d, 4c
- ☐ 1a, 2c, 3d, 4b
- ☐ 1c, 2d, 3a, 4b

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1c, 2a, 3b, 4d

Pregunta 88

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione los objetivos específicos de atención de los profesionales en enfermería gestores de casos en la atención primaria en salud:

1. Mantener y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las cuidadoras principales de los pacientes.
2. Mantener y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de toda persona incapacitada y/o de riesgo.
3. Elaborar Guías de Práctica Clínica que ayuden en la coordinación entre niveles.
4. Facilitar la mejora de la atención domiciliaria al equipo de atención primaria.
5. Garantizar el uso adecuado del material de ayudas técnicas para el cuidado.
6. Evaluar y retroalimentar continuamente en los diferentes niveles asistenciales.

☐ 2, 3, 5, 6

☒ 2, 4, 5, 6 ✗ Son condiciones que debe tener en cuenta el profesional gestor de casos el:
Elaborar Guías de Práctica Clínica que ayuden en la coordinación entre niveles.
Evaluar y retroalimentar continuamente en los diferentes niveles asistenciales. Por tanto no son objetivos específicos de la atención de enfermería en la gestión de casos.

☐ 1, 2, 4, 5

☐ 1, 3, 4, 5

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 2, 4, 5

Pregunta 89

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Identifique los criterios del Dengue Grave:

- ☐ Artralgia, vómitos y prueba de torniquete positiva.
- ☐ Fiebre, exantemas y leucopenia.
- ☐ Choque, disnea y alteración del nivel de conciencia.
- ☒ Dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas y hepatomegalia. ✖ Es incorrecto, estos síntomas corresponde a dengue con signos de alarma los cuales incluyen:
- Dolor abdominal intenso y continuo o abdomen doloroso a la palpación o distensión abdominal.
 - Vómito persistente,
 - Acumulación clínica de líquidos (en peritoneo, pleura, pericardio) detectado por clínica o por imágenes (ecografía de abdomen o Rx de tórax).
 - Sangrado de mucosas.
 - Letargia, irritabilidad.
 - Hepatomegalia

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Choque, disnea y alteración del nivel de conciencia.

Pregunta 90

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las complicaciones que pueden presentar en el puerperio son la hemorragia y el shock hipovolémico, frente a esto los cuidados de enfermería que se deben realizar y que irán encaminados a vigilar para prevenirlos son: la monitorización de constantes vitales, administración de fármacos, palpación del fondo uterino, control de diuresis, valoración de las mamas y la aparición de loquios. ¿A qué clase de puerperio corresponden estos cuidados de enfermería?

- ☒ Puerperio inmediato.  En el puerperio inmediato las principales complicaciones son la hemorragia y el shock hipovolémico, por lo tanto los cuidados de enfermería irán encaminados a vigilar para prevenirlos:
- Toma de constantes vitales.
 - Vigilar la administración de fármacos oxitócicos.
 - Palpar el fondo uterino para comprobar la contracción de éste.
 - Control urinario para controlar si es espontáneo o si necesita un sondaje vesical.
 - Valorar la episiotomía.
 - Valorar el descanso, favorecer la lactancia, y vigilar el estado de las mamas.
 - Vigilar la aparición de los loquios, la cantidad, color y los coágulos si aparecen.
- ☐ Puerperio mediato.
- ☐ Reacción psicológica.
- ☐ Puerperio tardío.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puerperio inmediato.

Pregunta 91

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione la respuesta que corresponde a la definición de bienestar fetal:

- ☒ Sospecha o confirmación de perturbación del estado metabólico basal del feto. Disminución del intercambio materno fetal de oxígeno que se expresa con disminución de movimientos fetales, alteraciones de la FCF y acidosis fetal.  Esta respuesta es incorrecta porque según lo indica el componente materno en su página 193 esta definición corresponde a Compromiso del Bienestar Fetal.
- ☐ Término inespecífico e inadecuado utilizado para designar un “riesgo de pérdida o compromiso del bienestar fetal”.
- ☐ Estado de homeostasis fetal que se traduce clínicamente en presencia de movimientos fetales, aceleraciones de la FCF y bioquímicamente en pH de cuero cabelludo > 7.10
- ☐ Compromiso permanente o transitorio del bienestar fetal que se evidencia durante el trabajo de parto. Bioquímicamente se traduce en hipoxia, hipercapnia y acidosis, manifestándose clínicamente con alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Estado de homeostasis fetal que se traduce clínicamente en presencia de movimientos fetales, aceleraciones de la FCF y bioquímicamente en pH de cuero cabelludo > 7.10

Pregunta 92

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el área de triaje de un centro de salud, usted recibe a un niño de 2 años, al graficar la curva de crecimiento observa que el puntaje Z del indicador peso/talla se encuentra entre -2 y -3 desviación estándar (DE). ¿A qué tipo de malnutrición hace referencia?

- ☐ Desnutrición crónica.
- ☐ Bajo peso.
- ☐ Desnutrición aguda severa.
- ☒ Desnutrición aguda moderada. ✔ La desnutrición aguda moderada se determina cuando el puntaje Z del indicador peso/talla se encuentra entre -2 y -3 DE.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Desnutrición aguda moderada.

Pregunta 93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se quiere realizar una investigación que estudie características humanas tales como: la moralidad, la conducta cotidiana, la libertad, se puede decir que la metodología de investigación será de enfoque:

- ☐ Experimental.
- ☐ Cuantitativo.
- ☒ Cualitativo. ✔ Los estudios que tratan de características humanas tales como: la moralidad, la conducta cotidiana, la libertad, podemos decir que la metodología de investigación será de enfoque cualitativo. La investigación cualitativa se centra en el entendimiento de un fenómeno desde una perspectiva subjetiva.
- ☐ Observacional.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cualitativo.

Pregunta 94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 10 años con diagnóstico de neumonía bacteriana que requiere administración de oxígeno a una concentración de 28 %. ¿Qué dispositivo emplea en este caso?

- ☐ Máscara facial simple.
- ☒ Catéter nasal.  El catéter nasal permite la administración de oxígeno de 1 a 5 litros/minuto, con lo que se logra una concentración de 23 a 40%.
- ☐ Máscara con reciclador parcial.
- ☐ Máscara sin reciclador.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Catéter nasal.

Pregunta 95

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una investigación experimental cuando se abordan las causas se tratan de las variables _____, mientras se abordan los efectos se tratan de las variables _____; y si se involucran otros elementos entre las variables se denominan variables _____.

- ☐ Independientes, intervinientes, dependientes.
- ☒ Independientes, dependientes, intervinientes.  Esta opción de respuesta es la correcta porque:
Variables independientes: La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia-ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo en el experimento, es decir las causas que están presentes en una investigación.
Variables dependientes: La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella.
Variables intervinientes: Las variables intervinientes son las que pueden modificar la relación de causa y efecto entre la independiente y la dependiente, produciendo efectos en esta última, es decir que alteran e influyen en los valores de la variable dependiente.
- ☐ Dependientes, independientes, intervinientes.
- ☐ Dependientes, intervinientes, independientes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Independientes, dependientes, intervinientes.

Pregunta 96

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ordene las etapas de toma de decisión en el proceso administrativo en forma secuencial:

1. Análisis de la situación.
2. Ejecución de la solución.
3. Identificación del problema.
4. Investigación de las posibles soluciones y sus consecuencias.
5. Evaluación de resultados.

- ☐ 3, 4, 1, 2, 5
- ☒ 3,  La toma de decisiones aplica un proceso científico en la solución de problemas. Las etapas del proceso son:
1, identificación del problema, análisis de la situación, investigación de las posibles soluciones y sus consecuencias,
4, selección de la solución, ejecución de la solución y evaluación de resultados.
2, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 4, 3, 2, 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 3, 1, 4, 2, 5

Pregunta 97

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los componentes generales de las vacunas son:

1. Antígeno.
2. Principio activo.
3. Inmunoglobulinas.
4. Excipiente.
5. Conservador.
6. Adyuvantes.

- ☐ 1, 4, 5, 6
- ☐ 3, 4, 5, 6
- ☒ 2,  Inmunoglobulinas: son proteínas plasmáticas sintetizadas por los linfocitos B maduros y células plasmáticas, en
4, respuesta a la estimulación por un antígeno. Principio activo: es una sustancia a la cual se debe el efecto farmacológico
5, de un medicamento.
6
- ☐ 1, 2, 3, 4

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 4, 5, 6

Pregunta 98

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione los determinantes de la Salud biológicos según Marck Lalonde:

1. Genes
2. Aire
3. Edad
4. Tierra
5. Género
6. Inmunidad

☐ 1, 2, 4, 6

☒ 1, 3, 5, 6 Los determinantes de Salud biológicos son: genes, edad, género e inmunidad. Aire y tierra corresponden a los determinantes de la Salud ambientales.

☐ 1, 3, 4, 5

☐ 2, 4, 5, 6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 5, 6

Pregunta 99

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente ingresa al hospital por presentar hormigueo en dedos de las manos, pies y región peribucal; el médico solicita exámenes de laboratorio donde se evidencian los siguientes datos: Sodio 140mEq/l; Calcio 6,0mg/dl, Potasio 4,5mEq/L; Magnesio 2,0mg/ dl, Fósforo 4,0mg/d ¿Cuál es el electrolito que se encuentra alterado en este caso?

☒ Calcio. Esta opción de respuesta es correcta porque los valores del Calcio se encuentra en los siguientes rangos: 8,5 – 10,5 mg/dL; de acuerdo al caso, el paciente presente valores inferiores al rango establecido (6,0mg/dL).

☐ Potasio.

☐ Magnesio.

☐ Sodio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Calcio.

Pregunta **100**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué grupo corresponde el método anticonceptivo conocido como Billings?

- ☒ Naturales.  El método anticonceptivo de Billings también llamado método del moco cervical, es un método en el que la mujer conoce su ciclo menstrual y sus períodos fértil e infértil. Este método corresponde al grupo de métodos naturales.
- ☐ Mecánicos.
- ☐ Quirúrgicos.
- ☐ Hormonales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Naturales.