

Comenzado el viernes, 22 de mayo de 2026, 21:55

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 22 de mayo de 2026, 23:21

Tiempo empleado 1 hora 25 minutos

Calificación 88,00 de 100,00

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las actividades previas al alta hospitalaria, el recién nacido recibe la primera vacuna contra la tuberculosis meníngea. Usted como profesional en enfermería. ¿Qué recomendaciones da a los padres del recién nacido para el cuidado post vacunal?

- ☒ Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 3 semanas después, no se debe manipular ni colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna. ✔ La vacuna BCG o bacilo de Calmette-Guérin es una vacuna contra la enfermedad de tuberculosis (TB). Esta vacuna se administra a los bebés y niños pequeños en los países donde la tuberculosis es común.
- ☐ Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 3 semanas después, se debe manipular colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna.
- ☐ Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 2 semanas después, no se debe manipular ni colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna.
- ☐ Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 4 semanas después, no se debe manipular ni colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aparece una pequeña úlcera en la zona de la vacuna, aproximadamente 3 semanas después, no se debe manipular ni colocar cremas, alcohol u otras sustancias en el sitio de la vacuna.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted como profesional de Enfermería identifica el siguiente diagnóstico enfermero: déficit de volumen de líquidos, relacionado con pérdida activa de sangre, manifestado por disminución de la presión arterial, sequedad de mucosas orales, aumento de la frecuencia del pulso, debilidad y sed. En la planificación de sus cuidados. ¿Qué resultado esperado elige usted para la paciente según el diagnóstico enfermero citado?

- ☒ Aumento de volemia.  El resultado aumento de la volemia corresponde al diagnóstico enfermero enunciado, porque se pretende restituir el volumen circulante y disminuir los síntomas producidos por pérdida activa de sangre.
- ☐ Eliminación urinaria.
- ☐ Termorregulación.
- ☐ Equilibrio electrolítico y ácido - base.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aumento de volemia.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración del desarrollo psicomotor mediante el test de Denver se observa que el crecimiento del niño es algo lento y se mantiene el lenguaje desarrollado, el desarrollo motor, sensorial y psicosocial; además, se educa a la madre sobre prevención de accidentes. ¿En qué etapa de la vida se encuentra el niño?

- ☒ Primera infancia.  Preescolar corresponde al período desde los 2 hasta los 6 años, tiene un crecimiento algo lento y se mantiene el desarrollo motor, sensorial y psicosocial, lenguaje desarrollado.
- ☐ Período de lactancia.
- ☐ Tercera infancia.
- ☐ Segunda infancia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Primera infancia.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 70 años, internado en el servicio de medicina interna, con diagnóstico de cáncer de páncreas y metástasis en el hígado, que presenta dolor intenso generalizado, por lo que se le administra morfina por vía intravenosa. ¿Qué aspecto imprescindible se debe valorar en el paciente con relación a la administración de la morfina?

- ☒ Observar signos de depresión respiratoria. ✔ La depresión respiratoria es un efecto indeseable de la morfina. El profesional de enfermería debe observar los cambios en el patrón respiratorio tales como, respiración superficial y disminución de la frecuencia respiratoria.
- ☐ Observar la aparición de diarrea.
- ☐ Observar signos y síntomas de hipertensión arterial.
- ☐ Observar la aparición de incontinencia urinaria.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Observar signos de depresión respiratoria.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones corresponde con las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética:

- ☐ Normoglucemia - sobrehidratación - alcalosis metabólica.
- ☐ Hipoglucemia - deshidratación - alcalosis metabólica.
- ☐ Hipoglucemia - deshidratación - acidosis metabólica
- ☒ Hiperglucemia ✔ En ausencia de insulina, la cantidad de glucosa que ingresa a las células disminuye lo que conlleva a hiperglucemia. En un intento por eliminar del cuerpo el exceso de glucosa, los riñones excretan agua y electrolitos que se manifiesta por una diuresis excesiva que lleva a la deshidratación. Otro efecto del déficit de insulina es la lipólisis con la producción de ácidos grasos libres que se convierten en cuerpos cetónicos en el hígado, los cuerpos cetónicos son ácidos lo que conlleva a la acidosis metabólica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hiperglucemia - deshidratación - acidosis metabólica.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione los 5 momentos del lavado de manos con su fundamento científico:

Momentos del lavado de manos	Fundamento científico
1. Antes del contacto directo con el paciente.	a. Para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies / objetos de entorno inmediato y para proteger el entorno sanitario.
2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica.	b. Para proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación y la potencial propagación.
3. Después de la exposición de fluidos corporales.	c. Para proteger al profesional sanitario de la colonización o infección por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la contaminación.
4. Después del contacto con el paciente.	d. Para impedir la transmisión de gérmenes por inoculación al paciente, así como de un punto del cuerpo a otro del mismo paciente.
5. Después del contacto con el entorno del paciente.	e. Para prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia al paciente y en última instancia proteger al paciente de la colonización.

- ☒ 1e, 2d, 3c, 4b, 5a De acuerdo al manual de bioseguridad se establecen 5 momentos para el lavado de manos con su fundamentación científica:
1. Antes del contacto directo con el paciente. - Para prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia al paciente y en última instancia proteger al paciente de la colonización y, en algunos casos, de las infecciones exógenas por parte de gérmenes nocivos transmitidos por las manos de los profesionales sanitarios.
 2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica. - Para impedir la transmisión de gérmenes por inoculación al paciente, así como de un punto del cuerpo a otro del mismo paciente.
 3. Después de la exposición de fluidos corporales. - Para proteger al profesional sanitario de la colonización o infección por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y de la subsiguiente propagación potencial. Esta acción puede posponerse hasta que el profesional sanitario haya abandonado el entorno del paciente si debe retirar y procesar equipo (por ejemplo, un tubo de drenaje abdominal) en una zona adecuada, siempre y cuando sólo toque dicho equipo antes de realizar la higiene de las manos.
 4. Después del contacto con el paciente. - Para proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación y la potencial propagación.
 5. Después del contacto con el entorno del paciente. - Para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies / objetos de entorno inmediato y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación.

- ☐ 1a, 2d, 3c, 4b, 5e

- ☐ 1a, 2b, 3c, 4d, 5e
- ☐ 1e, 2b, 3c, 4d, 5a

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1e, 2d, 3c, 4b, 5a

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Adulto mayor en la consulta de Geriátría presenta deterioro de la función cognitiva que conduce a una disminución de la memoria, cambios en el estado de ánimo y dificultad para comunicarse. Usted debe realizar una valoración del paciente. ¿Cuál es la escala que utiliza para este caso?

- ☐ Escala de Guijón.
- ☐ Escala de Yesavage.
- ☒ Escala de ✓ La escala Pfeiffer también conocida como SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire) se trata de un breve cuestionario compuesto de diez preguntas que miden el grado de deterioro cognitivo.
- ☐ Escala de Katz.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Escala de Pfeiffer.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el examen físico de enfermería usted observa a un paciente que presenta los siguientes signos y síntomas: congestión pulmonar, alteraciones del patrón respiratorio, anasarca, ortopnea y aumento de la presión venosa central. ¿Cuál es la categoría diagnóstica según NANDA que corresponde a este caso?

- ☒ Exceso de volumen de líquidos. ✓ El exceso de volumen de líquidos corresponde al aumento de líquidos isotónicos que presenta las siguientes características definitorias: Alteración de la densidad de la orina, alteración del estado mental, alteración del patrón respiratorio, anasarca, aumento de la presión venosa central, disnea, ortopnea relacionado con ingesta excesiva de líquido.
- ☐ Déficit de volumen de líquidos.
- ☐ Riesgo de déficit de volumen de líquidos.
- ☐ Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Exceso de volumen de líquidos.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el valor de plaquetas por milímetro cúbico que indica que el paciente se encuentra en riesgo de hemorragia?

- ☐ 100 000
- ☐ 75 000
- ☐ 19 000
- ☒ 50 000 ✗ Esta opción de respuesta es incorrecta porque el valor normal de plaquetas oscila entre 150 000 a 300 000 por milímetro cúbico. El riesgo de hemorragia en el paciente es posible cuando el recuento plaquetario es de 50 000 por milímetro cúbico. Sin embargo, el riesgo de hemorragia espontánea ocurre cuando el recuento es menor a 20 000 por milímetro cúbico.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 19 000

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina la etapa que permite hacer la revisión del plan de cuidados en el proceso de atención de enfermería?

- ☐ Ejecución.
- ☒ Evaluación. ✔ Evaluación: La evaluación constituye la quinta etapa del proceso de atención de enfermería se basa en determinar el cumplimiento de los objetivos planificados y que permite decidir si se mantiene el plan, se modifica o finaliza.
- ☐ Diagnóstico.
- ☐ Planificación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evaluación.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El equipo de Atención Primaria en Salud realiza un diagnóstico inicial de la condición de salud de sus habitantes. Como resultado se establecen campos de acción, de acuerdo con la normativa MAIS-FCI, con el fin de explorar, identificar, reconocer las inequidades en salud y desigualdades diferenciadas por factores étnicos, culturales, de género y socioeconómicos. Con base en este contexto. ¿Cuál es el nivel de acción del equipo de salud?

- ☒ Nivel familiar y comunitario.  Nivel familiar y comunitario se caracteriza por explorar, identificar, y reconocer las inequidades, desigualdades diferenciadas por factores étnicos, culturales, de género y socioeconómicos al tiempo que contribuye a la generación de estrategias para el mantenimiento de la salud, en el enfoque familiar y comunitario.
- ☐ Nivel epidemiológico.
- ☐ Nivel social.
- ☐ Nivel enfermedad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Nivel familiar y comunitario.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Recién nacido de 4 horas, hijo de madre diabética, macrosómico, en alojamiento conjunto con su madre, recibe lactancia materna a libre demanda. El personal de enfermería realiza el control de glicemia y obtiene un valor de 45 mg/dl. ¿Con qué frecuencia se debe realizar el control de glicemia en este caso?

- ☐ Cada 24 horas.
- ☐ Cada 12 horas.
- ☒ Cada 6 horas.  Respuesta correcta, el recién nacido con factores de riesgo en este caso madre diabética y macrosomía se tomará la glicemia en tirillas cada 6 horas.
- ☐ Cada 30 min.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cada 6 horas.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Profesional enfermero que acaba de asumir el liderazgo de la consulta externa de un hospital de segundo nivel y encuentra que en el servicio hay múltiples problemas que resolver. ¿Qué tipo de planificación debe aplicar para intervenir en el servicio?

- ☐ Institucional.
- ☐ De producción.
- ☐ Operativa.
- ☒ Estratégica. ✗ La planificación estratégica describe el camino de la empresa en la preparación de su futuro.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Operativa.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como profesional de enfermería, es necesario que usted conozca los tipos de prácticas seguras en la atención de salud. Las prácticas establecidas para la seguridad del paciente-usuario son: prácticas seguras administrativas, prácticas seguras asistenciales, prácticas seguras administrativas - asistenciales. ¿Cuál es el procedimiento que se relaciona a la práctica segura administrativa?

- ☐ Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo.
- ☐ Conciliación de medicamentos.
- ☐ Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente.
- ☒ Identificación correcta del paciente. ✓ Es una práctica segura administrativa. Es el procedimiento de identificación que no permite duda o equivocación de los pacientes y hace posible atender a la persona correcta, en el momento correcto y con la práctica adecuada correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Identificación correcta del paciente.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente acude al centro de salud para solicitar asesoramiento sobre lactancia materna, indica que por motivos de trabajo debe dejar a su hijo de tres meses al cuidado de un familiar y desea mantener la leche materna en el refrigerador. ¿Cuál es la temperatura y tiempo de conservación conveniente?

- ☐ < = 26 °C tres horas.
- ☐ -18 °C tres meses.
- ☒ < = 5 °C tres días. ✔ Se le indica el tiempo de conservación tomando en cuenta el lugar, temperatura y tiempo. Lugar: Refrigerador. Temperatura: <= 5 °C. Tiempo: tres días (72 horas).
- ☐ -15 °C dos semanas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: < = 5 °C tres días.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El personal de un Centro de Salud tipo B, aplica el enfoque de Atención Primaria de Salud Renovada en la prestación de servicios, con la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la población. Al momento dispone de un plan local de salud alineado a las exigencias del MAIS-FCI. En la valoración detecta la participación comunitaria y multisectorial en forma eficiente. ¿Cuál es el enfoque central de la Atención Primaria Renovada en el ámbito de la salud en este caso?

- ☐ Reducir los costos de los tratamientos médicos para hacerlos más accesibles a la población.
- ☐ Mejorar el acceso a servicios de salud de alta complejidad en hospitales.
- ☒ Fortalecer la atención de salud en la comunidad, centrándose en la prevención, promoción y atención integral. ✔ La respuesta es correcta porque la Atención Primaria Renovada, tiene como enfoque central fortalecer la atención de salud en la comunidad, priorizando la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, brindando una atención integral y cercana a las necesidades de la población. Este enfoque busca acercar los servicios de salud a la comunidad, fomentando la participación activa de las personas en el cuidado de su propia salud y promoviendo un enfoque preventivo para reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la calidad de vida.
- ☐ Priorizar la atención médica especializada para tratar enfermedades crónicas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fortalecer la atención de salud en la comunidad, centrándose en la prevención, promoción y atención integral.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El análisis de una pirámide poblacional permite determinar, EXCEPTO:

- ☐ Las migraciones del territorio estudiado.
- ☒ La causa del aumento demográfico. ✓ Las pirámides poblacionales determinan estructura poblacional por edad y sexo.
- ☐ La transición demográfica.
- ☐ La consecuencia de la fecundidad y mortalidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La causa del aumento demográfico.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los escenarios de atención en salud, según lo establecido en el MAIS -FCI? Señale la respuesta correcta:

- ☒ Individual, Familiar, Comunidad, Atención al ambiente y entorno natural. ✓ Dentro del elemento del MAIS- FCI en el componente de Provisión esta los escenarios de la prestación del servicio de salud: Individual, Familiar, Comunidad, Atención al ambiente y entorno natural, en el marco del modelo de atención Individual, familiar y comunitario.
- ☐ Individual, Grupal, Familiar, Comunidad, Institucional
- ☐ Individual, Familiar, Sectorial, Comunidad.
- ☐ Individual, Familiar, Comunitario.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Individual, Familiar, Comunidad, Atención al ambiente y entorno natural.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el área de Obstetricia, una paciente que está en el puerperio inmediato presenta facies pálidas, agitación, dolor abdominal tipo cólico y loquios en escasa cantidad. El profesional enfermero evidencia este particular, informa al médico de guardia y registra en su informe. ¿Qué concepto de pensamiento crítico muestra la enfermera?

- ☐ Autoconfianza.
- ☐ Perseverancia.
- ☒ Capacidad de análisis.  Analizar las situaciones potencialmente problemáticas; anticipar los resultados o las consecuencias posibles; valorar el razonamiento; utilizar el conocimiento basado en la evidencia. Esto corresponde a la capacidad de análisis de una enfermera. Por lo tanto, esta opción de respuesta es correcta.
- ☐ Integridad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Capacidad de análisis.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la definición de valoración como primera fase del proceso de atención de enfermería?

- ☐ Definición de los diagnósticos de enfermería, como juicios clínicos, que explican y describen el estado de salud de la persona.
- ☐ Proceso para determinar la causa o etiología del problema, como juicios clínicos a partir de la valoración en forma de diagnóstico enfermero.
- ☒ Proceso organizado y sistemático de recolección y recopilación de datos sobre el estado de salud de la persona.  El Proceso de Atención de Enfermería se inicia con la recolección de información para identificar los parámetros de funcionamiento físico, psicológico, social y espiritual de una forma organizada.
- ☐ Planeación de la atención de enfermería como un desarrollo de estrategias y prioridades.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Proceso organizado y sistemático de recolección y recopilación de datos sobre el estado de salud de la persona.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente femenino de 25 años, llega al triage hospitalario para recibir atención médica. El enfermero de la sala de triage, le realiza el control de los signos vitales los mismos que están dentro de los límites normales y valora el motivo por el que acude al hospital. El médico diagnostica que la paciente se encuentra en el estadio II del VIH. ¿Qué condiciones clínicas corresponde a este estadio?

- ☒ Pérdida de peso moderada. ✔ Es correcto porque en el estadio II se evidencia pérdida de peso moderada sin explicación (menos del 10% del peso corporal).
- ☐ Fiebre persistente.
- ☐ Asintomático.
- ☐ Anemia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pérdida de peso moderada.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el centro de salud, el equipo de mejoramiento continuo de la calidad liderado por el personal de enfermería debe realizar cada mes la revisión de estándares de calidad en insumos de verificación existentes en la sala de preparación, según el componente normativo materno-neonatal. ¿Cuáles son los insumos indispensables para la preparación de la usuaria?

- ☐ Estetoscopio, tensiómetro, tallímetro, balanza de adulto, termómetros, camilla ginecológica.
- ☐ Tensiómetro, tallímetro, balanza de adulto, termómetros, lámpara cuello de ganso.
- ☒ Fonendoscopio, tensiómetro, ✔ Son insumos esenciales que cada servicio de salud debe tener para la atención de salud materno-infantil. Los estándares de verificación son parámetros de cumplimiento en valor del insumo medido por la calidad de atención, mediante el monitoreo mensual que garantiza la calidad en la atención.
- ☐ Corneta de Pinard, fonendoscopio, tensiómetro, tallímetro, balanza de adulto, termómetros.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fonendoscopio, tensiómetro, tallímetro o cinta métrica, balanza de adulto, termómetros.

Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En qué orden descendente se colocan las vacunas consideradas sensibles a bajas temperaturas?

- ☒ DPaT, pentavalente, hepatitis A, hexavalente, ✗ La respuesta es incorrecta porque las vacunas se deben administrar en orden descendente de acuerdo a su sensibilidad a la temperatura en este caso: DPaT, hexavalente, DPwT, pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, HPV, meningococo, neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea y rotavirus.
- ☐ Pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, DPaT, DPwT, HPV, meningococo, neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea, rotavirus y hexavalente.
- ☐ DPaT, hexavalente, DPwT, Pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, HPV, meningococo, Neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea y rotavirus.
- ☐ HPV, meningococo, neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea, rotavirus, hepatitis B, HPV, DPaT, hexavalente, DPwT, pentavalente y hepatitis A.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: DPaT, hexavalente, DPwT, Pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, HPV, meningococo, Neumococo, DT, influenza, IPV, tifoidea y rotavirus.

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El alojamiento conjunto favorece el contacto precoz y la lactancia materna exclusiva, por lo que los profesionales en Enfermería deberán estar atentos a complicaciones del recién nacido debido a la edad gestacional, estado nutricional, patología congénita, trauma, sospecha de infección, además de:

- ☐ Adaptación respiratoria y térmica.
- ☐ Salida de meconio.
- ☒ Ictericia ✗ fisiológica. En los primeros días de vida se producen en el recién nacido circunstancias especiales que motivan la aparición de la ictericia, denominada fisiológica o icterus simplex neonatorum. En la mayoría de los casos, se trata de una ictericia monosintomática, poco intensa. El estado general de los recién nacidos es bueno, sin palidez ni visceromegalia, las heces y la orina suelen ser de color normal, conservan los reflejos, suelen tener una evolución favorable y no existen alteraciones analíticas concomitantes. La ictericia suele aparecer a las 48 horas de vida y desaparece entre el séptimo y el octavo día.
- ☐ Vértex caseoso.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Adaptación respiratoria y térmica.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente con hemorragia subaracnoidea llega a emergencia con las siguientes características: estupor, hemiparesia derecha y rigidez de descerebración temprana. Según la escala de Hunt y Hess. ¿Qué grado de severidad presenta?

- ☐ Grado V.
- ☐ Grado III.
- ☒ Grado IV. ✔ La descripción corresponde a un estado estuporoso el cual se caracteriza por la disminución en la actividad de las funciones intelectuales, mínimo movimiento espontáneo. Sólo puede despertarse con estímulos vigorosos y continuos. Las respuestas motoras a los estímulos táctiles son adecuadas. Las respuestas verbales son mínimas e incomprensibles. La hemiparesia se refiere a la disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo. Postura de descerebración implica mantener extendidos los brazos y las piernas, los dedos de los pies apuntando hacia abajo y la cabeza y el cuello arqueados hacia atrás. Los músculos se tensionan y se mantienen rígidos.
- ☐ Grado II.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Grado IV.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente acude a la emergencia por presentar: disnea, dolor precordial de 10/10 de intensidad, en el electrocardiograma se observa una alteración del segmento ST. Para confirmar el diagnóstico, el médico le solicita exámenes de laboratorio. ¿Cuál es la prueba de laboratorio específica que necesita el paciente?

- ☐ Hemoglobina.
- ☒ Troponina. ✔ La troponina, es una proteína que se encuentra en las células del miocardio, regula el proceso contráctil del miocardio. Hay tres isómeros de la troponina: C, I y T. Las troponinas I y T son específicas para el músculo cardíaco, y estos biomarcadores se reconocen actualmente como marcadores fiables y críticos de lesión miocárdica.
- ☐ Tromboplastina.
- ☐ Hematocrito.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Troponina.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunidad rural, desde hace un año se presenta falta de agua y el funcionamiento del nuevo centro de comercialización de animales domésticos y la feria de productos de la zona. El personal de Técnicos en Atención Primaria de la Salud (TAPS) refieren al director del Centro de Salud, la presencia de ratas, moscas, perros callejeros, olores desagradables en el ambiente y poco interés de los líderes comunitarios por el problema. Al momento los profesionales enfermeros atienden en el domicilio a pacientes con enfermedades gastrointestinales para hidratación oral, las familias desconocen formas de consumo de agua segura y de higiene ambiental. ¿Cuál es la estrategia para el cambio social y de comportamiento?

- ☐ Ambientes saludables.
- ☐ Comunidades saludables.
- ☒ La participación comunitaria. ✔ Esta opción de respuesta si corresponde: Según el Modelo de Atención Integral de la Salud MAIS-2018, la participación comunitaria define involucrar a la comunidad como una estrategia de cambio social y de comportamiento individual. En el nivel I de atención se promueven acciones básicas de saneamiento ambiental y de participación comunitaria.
- ☐ Los distritos saludables.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La participación comunitaria.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el orden correcto para retirar los métodos de barrera una vez utilizados?

- ☐ Guantes, gorro, mascarilla, bata y protección ocular.
- ☐ Guantes, mascarilla, protección ocular, gorro y bata.
- ☐ Bata, guantes, mascarilla, protección ocular y gorro.
- ☒ Guantes, bata, mascarilla, protección ocular y gorro. ✔ Los guantes son los que entran en contacto directo con el paciente y los diversos implementos contaminados y secreciones corporales, por ende son la barrera que primero debe ser desechada para evitar la diseminación de la contaminación a otros pacientes o comprometer la integridad personal. La bata a su vez también representa el segundo foco primordial de infección, por eso el retiro adecuado de la bata disminuye el riesgo, la contaminación de otros objetos y del personal que la usa. La protección facial (mascarilla y gafas) y del cabello reduce el riesgo de transmisión cruzada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Guantes, bata, mascarilla, protección ocular y gorro.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Adulto mayor acude a la consulta externa acompañado de su hija, a la entrevista manifiesta que presenta dificultades para recordar datos como su nombre, fechas, dirección de su domicilio, entre otros. ¿Cuál es la escala que debe utilizar para hacer la valoración de este caso?

- ☐ Yesavage.
- ☒ Pfeiffer.  Esta opción es correcta porque la escala de Pfeiffer es un instrumento tipo cuestionario muy breve, pero con buenos índices de sensibilidad y especificidad. Valora fundamentalmente la memoria y la orientación. Tiene una corrección en su puntuación según el nivel cultural y de escolarización.
- ☐ Índice de Katz.
- ☐ Lawton y Brody.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pfeiffer.

Pregunta 30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un usuario diagnosticado de Tb pulmonar con Bk+, refiere haber recibido tratamiento 15 días, hace 10 meses. ¿Cómo se considera el caso?

- ☒ Pérdida en el  Persona previamente tratada por TB, y cuyo caso fue declarado pérdida en el seguimiento al final de su tratamiento más reciente (antes conocido como abandono recuperado). El afectado retorna tras una interrupción de tratamiento de más de un mes.
- ☐ Recaída.
- ☐ Nuevo.
- ☐ Fracaso.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Nuevo.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La Atención Primaria orienta al profesional enfermero a abordar el origen de las necesidades de salud causados por factores biológicos, socioeconómicos y ambientales que afectan a los usuarios que acuden al centro de salud. ¿Qué medidas se debe tomar para garantizar un mejor estado de salud?

- ☒ Actuar desde perspectivas de promoción de la salud.  La combinación de educación en salud e intervenciones organizativas, políticas y económicas diseñadas para facilitar cambios en la conducta y adaptaciones medioambientales que mejorarán o protegerán la salud.
- ☐ Actuar desde perspectivas de rehabilitación de la salud.
- ☐ Actuar desde perspectivas de curación en la salud.
- ☐ Actuar desde perspectivas de prevención de la enfermedad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Actuar desde perspectivas de promoción de la salud.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione las alteraciones de la frecuencia respiratoria con sus características.

Alteraciones	Características
1. Hiperpnea	a. Aumento gradual seguido de una disminución gradual con periodo de apnea.
2. Cheyne-Stokes	b. Respiraciones de igual profundidad seguidas por un periodo de apnea.
3. Biot	c. Movimientos respiratorios rápidos y profundos. Se produce por alteraciones metabólicas.

- ☐ 1b, 2c, 3a
- ☒ 1c, 2a, 3b  Hiperpnea: Movimientos respiratorios rápidos y profundos con una frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Se produce por alteraciones metabólicas, ansiedad, ejercicio y alteraciones del SNC.
Cheyne-Stokes: Aumento gradual seguido de una disminución gradual de la profundidad de las respiraciones y luego un periodo de apnea.
Biot: Respiraciones de igual profundidad seguidas por un periodo de apnea.
- ☐ 1c, 2b, 3a
- ☐ 1a, 2b, 3c

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1c, 2a, 3b

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un Centro de Salud se va a realizar una encuesta con relación a la atención de Enfermería dirigida a los pacientes para evaluar el grado de satisfacción empleando la escala: Muy satisfecho - Satisfecho - Regular. ¿Qué tipo de variable estamos analizando?

- ☐ Cuantitativa continua.
- ☐ Cualitativa nominal.
- ☐ Cuantitativa discreta.
- ☒ Cualitativa ordinal.  Esta opción de repuesta es la correcta porque la variable cualitativa ordinal es aquella variable que mantiene un orden de mayor a menor, las categorías indican jerarquía.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cualitativa ordinal.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunidad se ejecuta una campaña de prevención del cáncer de cuello uterino mediante la toma de citología vaginal, luego de la valoración de enfermería se decide atender primero a las adultas mayores, adolescentes, embarazadas y mujeres con discapacidad. ¿Qué artículo de la Constitución sustenta esta acción?

- ☐ Artículo 66.
- ☐ Artículo 34.
- ☒ Artículo 35. "Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado".
- ☐ Artículo 32.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Artículo 35.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las intervenciones de enfermería en pacientes con sonda vesical permanente, está la orientación sobre la ingestión de líquidos. ¿Qué cantidad de líquidos le recomienda beber al paciente?

- ☐ Hasta 1 500 ml.
- ☐ Hasta 2 000 ml.
- ☒ Hasta 3 000 ml. Respuesta correcta:
El paciente que tiene una sonda permanente debería beber hasta 3 000 ml al día. Las grandes cantidades de líquido garantizan una gran diuresis, lo que mantiene lavada la vejiga y disminuye la posibilidad de estasis de orina e infección consecuyente.
- ☐ Hasta 1 000 ml.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hasta 3 000 ml.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El personal de salud debe identificar el modo de transmisión de enfermedades infecto contagiosas y los tipos de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión. ¿Qué patología es transmitida por gotas?

- ☐ Tuberculosis.
- ☐ Rubeola.
- ☒ Neumonía. ✓ El modo de transmisión de la neumonía es por gotas. Las gotas son generadas desde una persona fuente, durante la tos, el estornudo, el habla, entre otros. Las enfermedades transmitidas por esta vía son: meningitis, neumonía, sepsis, entre otras. La transmisión ocurre cuando las gotas, partículas mayores de 5 micras generadas por la persona infectada son propagadas a una corta distancia y son depositadas en las conjuntivas, mucosa nasal o boca del huésped. Debido a que las gotas no quedan suspendidas en el aire, no se requiere un manejo especial del aire.
- ☐ Sarampión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Neumonía.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como profesional de enfermería de un centro geriátrico, al valorar el estado nutricional de un paciente, identifica un IMC de 24.5. Según este dato. ¿A qué estado nutricional corresponde el adulto mayor?

- ☐ Sobrepeso.
- ☐ Obesidad I.
- ☒ Normal. ✓ El estado nutricional de los adultos mayores es considerado normal cuando tienen un IMC de 19.00 a 24.99.
- ☐ Bajo peso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Normal.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 16 años primigesta que cursa un embarazo de 38 semanas, luego de recibir la atención médica le manifiesta que desearía conocer sobre la alimentación que debe recibir su recién nacido ya que desconoce esta información. ¿Sobre qué tema es importante brindar la asesoría?

- ☐ Importancia de los sucedáneos de leche materna.
- ☐ Beneficios de alimentar con biberón.
- ☐ Importancia de establecer un horario para la alimentación del recién nacido.
- ☒ Beneficios de la lactancia materna. ✔ "La leche humana es el alimento ideal para el recién nacido y proporciona nutrientes específicos para la edad, así como factores inmunitarios y sustancias antibacterianas".

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Beneficios de la lactancia materna.

Pregunta 39

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Paciente de 68 años, hospitalizada con diagnóstico de artritis reumatoide. Al momento se encuentra despierta y no refiere dolor. A la valoración, el médico indica baño. El profesional en enfermería procede a brindarle ayuda para bañarse y durante el baño la paciente le indica que está fatigada, entonces se da cuenta de que la paciente está respirando muy rápido y presenta taquicardia. ¿Cuál es la mejor respuesta del profesional enfermero?

- ☒ Indicar a la paciente que respire profundamente e intente relajarse. ✘ Esta opción es incorrecta porque solo nos ayudaría a reducir el estrés: La respiración profunda y la relajación pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Al respirar profundamente, la paciente puede oxigenar su cuerpo de manera más eficiente, lo que puede disminuir la tensión y promover una sensación de calma.
- ☐ Dejar a la paciente sola para que descanse en una silla.
- ☐ Ayudar a la paciente a terminar el baño rápido.
- ☐ Ayudar a la paciente a volver a la cama.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ayudar a la paciente a volver a la cama.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siguientes son herramientas de diagnóstico y monitoreo de las condiciones de salud, diagnóstico de salud, ASIS; EXCEPTO:

- ☐ Sala situacional.
- ☐ Diagnóstico dinámico.
- ☐ Mapa parlante.
- ☒ Ficha familiar.  La ficha familiar es un instrumento de archivo de la unidad, que permite vigilar el estado de salud de la población, sus necesidades y desarrollar las mejores políticas de salud. Es una herramienta para brindar prestaciones integrales de salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ficha familiar.

Pregunta 41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente cursa embarazo de 5 semanas de gestación, es primigesta y está preocupada sobre el desarrollo y crecimiento de su hijo, solicita al profesional de enfermería información sobre los cuidados que debe tener en este período de gestación. Ordene la educación sanitaria que se debe impartir a la gestante desde la más importante para evitar riesgos en la madre y el niño:

1. Indumentaria.
2. Alimentación y nutrición.
3. Medicamentos y drogas.
4. Higiene.

☐ 1, 2, 3, 4

☒ 3,  El orden de importancia en la educación sanitaria es:
2, Medicamentos y drogas.

4, La gestante tendrá cautela con los medicamentos ingeridos sobre todo en el primer trimestre de gestación se
1 desaconseja la automedicación y la necesidad de acudir a la consulta médica para la prescripción.

Alimentación y nutrición

La base de una buena educación sanitaria debe consistir en consejos nutricionales y dietéticos completos y claros para fomentar hábitos nutricionales y evitar. A pesar de la utilización de suplementos nutricionales de forma habitual en la gestante, se debe insistir en que estos no son sustitutivos en la correcta alimentación.

Higiene

Se recomienda ducha diaria, no por inmersión; limpieza bucal tras las comidas y la visita al odontólogo; una correcta hidratación de la piel para evitar las grietas y el uso de protectores de la piel por la excesiva producción de melanina en la gestación.

Indumentaria

Usar ropa cómoda y holgada que evita la presión en miembros y abdomen, zapatos adecuados sin presión en el empeine y el uso de sujetador de acuerdo al tamaño de las mamas.

☐ 2, 3, 1, 4

☐ 4, 2, 1, 3

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 3, 2, 4, 1

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente primigesta de 16 años, tuvo un parto céfalo vaginal sin complicaciones, dando un recién nacido de 2700 gr de peso, talla 50 cm, perímetro cefálico 33 cm, perímetro braquial 9 cm y perímetro torácico 31 cm. La madre tiene mamas secretantes agrietadas, con pezones evertidos y siente mucho dolor al dar el seno. ¿Cuál es la técnica de agarre recomendada por el MSP para un correcto amamantamiento?

- ☐ La boca del recién nacido está semi abierta, el labio inferior está invertido, el mentón está tocando el pecho, areola dentro de la boca.
- ☐ La boca del recién nacido está bien abierta, el labio superior está evertido, el mentón está tocando el pecho, areola dentro de la boca.
- ☒ La boca del recién nacido está bien abierta, el labio inferior está evertido, el mentón está tocando el pecho, areola y pezón dentro de la boca. ✔ Para que una madre produzca la leche que su bebé necesita, este debe succionar frecuentemente y de manera correcta. El buen agarre se caracteriza porque: la boca del recién nacido está bien abierta, el pezón y la areola se estiran hasta alcanzar la orofaringe del bebé. Los conductos largos que yacen debajo de la areola están dentro la boca del bebé. La lengua del bebé se estira hacia adelante por encima de la encía inferior para que pueda comprimir el pecho y de esta manera extraer la leche. Esto se llama succión, cuando un bebé agarra el pecho dentro su boca de esta manera, el bebé está bien pegado y puede obtener la leche fácilmente.
- ☐ La boca del recién nacido está abierta, el labio inferior está invertido, el mentón está tocando el pecho, pezón dentro de la boca.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La boca del recién nacido está bien abierta, el labio inferior está evertido, el mentón está tocando el pecho, areola y pezón dentro de la boca.

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique el reflejo del recién nacido que se examina al desplazar nuestra mano a lo largo de la cara lateral de la planta del pie, cuya respuesta normal será la hiperextensión del dedo gordo y la separación del resto de los dedos.

- ☐ Reflejo de succión.
- ☐ Reflejo de Moro.
- ☒ Reflejo de Babinski. ✔ El reflejo de Babinski se determina sobre la planta del pie se examina al desplazar nuestra mano a lo largo de la cara lateral de la planta del pie cuya respuesta normal será la hiperextensión del dedo gordo y la separación del resto de los dedos. Desaparece en los primeros meses de vida.
- ☐ Reflejo de prensión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Reflejo de Babinski.

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el principio que prevalece cuando se da atención de salud a una persona de nacionalidad extranjera?

- ☒ Universalidad. ✓ Sí, porque la universalidad garantiza el acceso a la atención integral de salud independientemente a la nacionalidad.
- ☐ Continuidad.
- ☐ Integralidad.
- ☐ Participativo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Universalidad.

Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina a la respiración que se caracteriza por la sucesión de ciclos respiratorios en los que aumenta gradualmente tanto la frecuencia como la profundidad de la respiración para después descender de la misma manera y que se intercalan con cortos períodos de apnea?

- ☐ Biot.
- ☐ Eupnea.
- ☐ Kussmaul.
- ☒ Cheyne-Stokes. ✓ Respuesta correcta: Es un tipo de apnea central del sueño que se caracteriza por una respiración irregular que sigue un ritmo creciente-decreciente en la frecuencia y profundidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cheyne-Stokes.

Pregunta 46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted como líder de enfermería del servicio de consulta externa, debe efectuar el cálculo de personal de enfermería para la atención directa a pacientes de este servicio. Teniendo presente que la categoría de tratamiento es de cuidados mínimos. ¿Cuáles son las horas necesarias de atención de enfermería directa en 24 horas de acuerdo a los indicadores por categoría de tratamiento?

- ☒ 1 a 2 horas.  1 a 2 horas de atención directa de enfermería en 24 horas son necesarias en cuidados mínimos (convalecencia, consulta externa, atención domiciliaria y franca recuperación), de acuerdo con los indicadores por categoría de tratamiento.
- ☐ 7 a 8 horas.
- ☐ 5 a 6 horas.
- ☐ 3 a 4 horas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1 a 2 horas.

Pregunta 47

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, seleccione los efectos fisiológicos que tiene la aplicación de frío:

1. Reducción de la permeabilidad capilar.
2. Efecto sedante.
3. Efecto anestésico local.
4. Vasoconstricción.
5. Vasodilatación.
6. Aumento de la permeabilidad capilar.

- ☐ 1, 5, 6
- ☐ 2, 4, 6
- ☐ 2, 3, 5
- ☒ 1, 3, 4  Entre los efectos fisiológicos del frío, se encuentran la reducción de la permeabilidad capilar, la vasoconstricción y el efecto anestésico local.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 4

Pregunta 48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 40 años con diagnóstico de insuficiencia cardiaca, le prescribe un diurético tiacídico para disminuir el edema de miembros inferiores ¿Qué cuidado de enfermería se debe realizar con este paciente?

- ☐ Administrar el diurético en la noche.
- ☒ Administrar dieta rica en potasio. ✔ Esta opción de respuesta es la correcta porque los diuréticos tiacídicos y de asa, incrementan la excreción de potasio, por tanto se debe administrar dieta rica en potasio o potasio complementario.
- ☐ Incrementar el consumo de sodio en la dieta para restituir las pérdidas electrolíticas.
- ☐ Vigilar la aparición de hipoglicemia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Administrar dieta rica en potasio.

Pregunta 49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 68 años, hospitalizada. Al momento tiene déficit en la movilidad debido a una fractura de cadera, necesita asistencia para realizar actividades básicas de la vida diaria. Constantes vitales dentro de parámetros normales. IMC 19, en espera de cirugía. De acuerdo con el modelo de enfermería de Virginia Henderson. ¿Cuál es la intervención más adecuada?

- ☐ Coordinar la programación de cirugía.
- ☐ Proporcionar una dieta equilibrada y nutritiva.
- ☐ Proporcionar analgésicos para controlar el dolor.
- ☒ Ayudar a la paciente a movilizarse. ✔ Esta es la respuesta correcta porque la intervención refleja la aplicación del modelo de enfermería de Virginia Henderson, que se centra en ayudar a los pacientes a alcanzar un nivel óptimo de independencia y autonomía en las actividades básicas de la vida diaria. En este caso, la movilización es esencial para promover la recuperación funcional. Henderson propuso 14 necesidades básicas en las que se basa la atención de enfermería y una de ellas es la necesidad de movilidad física.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ayudar a la paciente a movilizarse.

Pregunta 50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué escala de valoración corresponde con las siguientes categorías de evaluación: estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia?

- ☐ Escala de Morse.
- ☐ Escala de Macdemis.
- ☒ Escala de Norton.  La escala de Norton se utiliza para la valoración de la piel al evaluar el riesgo de la zona sometida a presión. Incluye entre sus categorías el estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia.
- ☐ Escala de Braden.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Escala de Norton.

Pregunta 51

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 58 años que acude a la consulta por presentar cuadro clínico de 72 horas de evolución caracterizado oliguria, hipervolemia y leve edema bi-maleolar bilateral que cede con cambios posicionales; el personal de enfermería valora los signos vitales encontrando una presión arterial de 160/90 mmHg y al analizar el resultado del examen de orina se reflejan Proteínas= +, Hematíes= campo lleno. ¿Qué síndrome clínico presenta el usuario?

- ☐ Síndrome de insuficiencia renal crónica.
- ☐ Síndrome nefrótico.
- ☒ Síndrome nefrítico.  Esta respuesta es correcta porque el síndrome nefrítico se caracteriza clínicamente por oliguria acompañado de hematuria microscópica o macroscópica, hipertensión arterial y edema leve por proteinuria menores a 3.5g/24 horas, tal como se indica en el caso planteado.
- ☐ Síndrome de insuficiencia renal aguda.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Síndrome nefrítico.

Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El campo de acción de los equipos de salud tiene varios niveles, uno de ellos es identificar quien requiere de atención y decidir la acción inmediata a realizar, atenderlo o referirlo a otro nivel. ¿De qué nivel dentro del campo de acción estamos hablando?

- ☐ Nivel familiar y comunitario.
- ☐ Nivel epidemiológico.
- ☐ Nivel social.
- ☒ Nivel de enfermedad.  Identifica quién requiere de atención y oportunamente decidir la acción inmediata a realizar: la cual puede ser atenderlo o referirlo a otro nivel.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Nivel de enfermedad.

Pregunta 53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione las etapas del proceso enfermero con las habilidades de comunicación que se aplican en cada una de ellas:

Etapas del proceso enfermero	Habilidades de comunicación
1. Diagnósticos de enfermería. 2. Implementación.	a. Delegación y análisis verbal con el equipo de atención sanitaria. b. Análisis interpersonal de los hallazgos de la valoración. c. Actividades de educación sanitaria verbales, visuales, auditivas y táctiles. d. Validación de las necesidades de atención sanitaria mediante análisis verbal con el paciente.

- ☐ 1cd, 2ab
- ☒ 1bd,  2ac
 Diagnósticos de enfermería, se relaciona con análisis interpersonal de los hallazgos de la valoración y validación de las necesidades de atención sanitaria mediante análisis verbal con el paciente.
 En la etapa de implementación, se relaciona con la delegación y análisis verbal con el equipo de atención sanitaria y actividades de educación sanitaria verbales, visuales, auditivas y táctiles.
- ☐ 1ab, 2cd
- ☐ 1ad, 2bc

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1bd, 2ac

Pregunta 54

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente ingresa al servicio por presentar parada cardiorrespiratorio, el equipo de salud se prepara para el manejo de una vía aérea definitiva mediante la colocación de un tubo endotraqueal, el personal de enfermería debe confirmar la correcta colocación, para lo cual necesita un método cuantitativo que le permita verificar la presencia de dióxido de carbono en la vía aérea. ¿Cuál es la técnica que necesita para su intervención de enfermería?

- ☐ Comprobar con el endotest.
- ☐ Utilizar métodos colorímetros.
- ☐ Valorar con la oximetría de pulso.
- ☒ Medir con la Capnografía. ✔ Cuando se intuba un paciente, es esencial revisar la posición del tubo endotraqueal. Si se detecta dióxido de carbono en el aire exhalado, el tubo está en la vía aérea. En todo departamento de urgencias y donde se quiera que los pacientes necesiten intubación, debe haber métodos para determinar el CO₂ al final de la espiración. El método preferido es cuantitativo, como capnografía, capnometría o espectroscopia de masa. Por lo tanto, la opción de respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Medir con la Capnografía.

Pregunta 55

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el hospital que labora va a realizar una investigación de campo para evaluar los cuidados de enfermería que reciben los pacientes que presentan úlceras de presión y realizar un plan de mejora. ¿Cuál de los siguientes instrumentos es el más útil para su investigación?

- ☒ Entrevista. ✔ Esta opción de respuesta es la correcta porque la entrevista es una pesquisa o averiguación personalizada en la que se emplean cuestionarios para conocer la opinión pública en la investigación de campo para la recopilación de información, pueden aplicarse las entrevistas, los cuestionarios y el muestreo entre otros.
- ☐ Diario.
- ☐ Mapeo.
- ☐ Registros.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entrevista.

Pregunta 56

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como profesional de enfermería del centro de salud, debe realizar visitas domiciliarias. La etapa de la visita que le ayuda para continuar o modificar la planificación de los cuidados, detectar las dificultades, revisar los objetivos, planificar otros nuevos, corresponde a:

- ☐ Preparación de la visita.
- ☐ Planificación de la visita.
- ☒ Evaluación de la visita.  Evaluación de la visita es la etapa 6, que sirve para continuar o modificar la planificación de los cuidados, detectar las dificultades, revisar los objetivos y planificar otros nuevos.
- ☐ Ejecución de la visita.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evaluación de la visita.

Pregunta 57

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente acude al centro de salud para solicitar asesoramiento sobre lactancia materna, indica que por motivos de trabajo debe dejar a su hijo de tres meses al cuidado de un familiar y desea mantener la leche materna a una temperatura ambiente adecuada. ¿Cuál es la temperatura y tiempo de conservación conveniente?

- ☐ -15° C dos semanas.
- ☒ < = 26° C tres horas.  Se le indica el tiempo de conservación tomando en cuenta el lugar, temperatura y tiempo. Lugar: Temperatura ambiente. Temperatura: < = 26° C. Tiempo: tres horas.
- ☐ < = 5° C tres días.
- ☐ - 18° C tres meses.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: < = 26° C tres horas.

Pregunta 58

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 10 años es traído a la sala de emergencias después de ser atropellado por una motocicleta mientras jugaba en la calle. Se evidencia deformidad y herida abierta con sangrado activo en la pierna derecha compatible con fractura expuesta de tibia. Usted inicia con la atención de enfermería. ¿Cuál es la actividad prioritaria por realizar con este paciente?

- ☒ Valorar las seis P. Esta respuesta es correcta porque valorar las seis P es fundamental para identificar oportunamente isquemia por lesión vascular, de tejido blando, nervio o hueso. Las seis P, en su traducción al español, incluyen: dolor, ausencia de pulso, palidez, parestesia, parálisis y presión. El caso menciona que el profesional de enfermería ya ha determinado el mecanismo de lesión (fractura expuesta de tibia) por lo que esta acción corresponde a la siguiente o prioritaria a realizar con el paciente.
- ☐ Aplicar frío en la zona lesionada.
- ☐ Inmovilizar la extremidad.
- ☐ Cubrir la herida con un apósito estéril o limpio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Valorar las seis P.

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El profesional de enfermería, como miembro del equipo integral de salud de la unidad operativa, debe realizar actividades extramurales o comunitarias en instituciones educativas, en comunidades, centros carcelarios, fábricas y empresas, en el domicilio. ¿Cuál es una de las actividades que desarrolla en entidades educativas?

- ☐ Fortalecimiento de las organizaciones locales de salud.
- ☐ Participación en actividades de desarrollo comunitario.
- ☐ Realizar identificación de eventos centinelas.
- ☒ Jornadas de promoción de estilos de vida saludables. La atención extramural o comunitaria es ejecutada por los equipos de atención integral. Realizan el trabajo en instituciones educativas, en comunidades, centros carcelarios, fábricas y empresas, en el domicilio. El profesional de enfermería como miembro del equipo de salud, en las instituciones educativas realiza jornadas de promoción de estilos de vida saludables, entre otras actividades.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Jornadas de promoción de estilos de vida saludables.

Pregunta 60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Adulto mayor con diagnóstico de diabetes acude al centro de salud porque indica que su familia no apoya los buenos hábitos de alimentación lo que le dificulta mantener la dieta prescrita. Usted como personal de enfermería le indica otras alternativas para seguir con el régimen terapéutico y le anima a tomar una decisión. ¿Cuál es el rol del personal de enfermería frente al caso?

- ☐ Cuidadora.
- ☒ Consejera. ✓ Esta opción es correcta porque el rol de consejera le permite conocer los recursos de la comunidad es un factor esencial para llegar a ser una consejera eficaz del paciente. Una consejera ayuda a los pacientes a identificar y clarificar problemas de salud y a elegir las acciones adecuadas para resolver estos problemas.
- ☐ Educadora.
- ☐ Gestora de casos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Consejera.

Pregunta 61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El recién nacido en el momento del nacimiento puede sufrir complicaciones en la función neurológica por un parto prolongado. Una de las complicaciones son las convulsiones, caracterizado como un movimiento involuntario, brusco y rápido que se expresa como una sacudida súbita de un miembro superior. ¿Cuál es el tipo de convulsión al que se refiere?

- ☐ Clónica.
- ☐ Tónica.
- ☐ Sutil.
- ☒ Mioclónicas. ✓ Esta respuesta es correcta porque una convulsión es una alteración paroxística en la función neurológica, sea conductual, motora, autonómica o una combinación de estas. En general se debe a una descarga eléctrica excesiva e hipersincrónica de un grupo de neuronas del sistema nervioso central. Las convulsiones son un principal signo neurológico. Las convulsiones mioclónicas son movimientos involuntarios, de aparición brusca y rápido que se expresa como una sacudida de un miembro o del tronco. Se caracteriza por sacudidas bilaterales y sincrónicas de flexión de los miembros superiores y ocasionalmente de los inferiores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mioclónicas.

Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer de 65 años, acude por presentar despistes en la recepción de mensajes (olvidaba recados que le dejaban o los transmitía a destiempo, a veces de forma reiterada a la misma persona). En varias ocasiones, regresaba de las compras olvidando artículos básicos; optó por llevar un listado para recordar comprar todo pero tenía problemas con los vueltos, guardaba y se olvidaba el sitio. En una ocasión no pudo regresar a la casa, habiéndose perdido y precisando de ayuda para volver. Esto causaba sentimientos de inutilidad, frustración y tristeza en la paciente. ¿Qué test se debe usar para medir este tipo de trastorno?

- ☐ Test de Rorschach.
- ☒ Test Mini Mental-State. ✓ Valora los síntomas compatibles con deterioro cognitivo.
- ☐ Test de Wechsler.
- ☐ Test de Wais.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Test Mini Mental-State.

Pregunta 63

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hablamos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna nos referimos a:

- ☐ La forma de codificar los sucedáneos de leche, según la edad del infante para la que están indicados.
- ☐ La regulación estricta sobre las fechas de elaboración y caducidad, que deben cumplir quienes fabrican leche de fórmula.
- ☒ La normativa que regula la publicidad y la venta de leche de fórmula, biberones y chupones. ✓ Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS, UNICEF; 1981), es la normativa que regula la publicidad y la venta de leche de fórmula, biberones y chupetes.
- ☐ El reglamento de transporte y almacenamiento que deben tener los sucedáneos de leche.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La normativa que regula la publicidad y la venta de leche de fórmula, biberones y chupones.

Pregunta 64

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 38 años, llega al servicio de emergencia con sangrado profuso con herida por arma blanca en miembro inferior derecho. A la valoración presenta: confusión, TA= 85/60 mmHg, FC= 110 X', FR= 32 X', mucosas orales secas y oliguria. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario en este caso?

- ☐ Confusión aguda R/C deshidratación M/P alteración en el nivel de conciencia.
- ☐ Patrón Respiratorio Ineficaz R/C hiperventilación M/P taquipnea.
- ☒ Déficit del volumen de líquidos R/C pérdida activa de líquidos M/P oliguria. ✔ El déficit de volumen de líquidos es un estado en el que se presenta una disminución del líquido intravascular, intersticial y/o intracelular (en este caso disminución del líquido intravascular por sangrado); tiene como características definitorias: alteración en el estado mental, disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, sequedad de las mucosas, disminución de la producción de orina; la condición asociada es la pérdida del volumen de líquidos.
- ☐ Riesgo de disminución del gasto cardíaco R/C alteración de la FC.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Déficit del volumen de líquidos R/C pérdida activa de líquidos M/P oliguria.

Pregunta 65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 26 años, presenta un embarazo de 12 semanas, con dolor leve en hipogastrio, con sangrado genital escaso y cuello uterino cerrado. ¿Cuál es la definición más acertada a estos signos y síntomas que presenta la paciente?

- ☒ Amenaza de aborto. ✔ Amenaza de aborto: embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, con o sin sangrado genital y cuello cerrado.
- ☐ Aborto en curso.
- ☐ Aborto incompleto.
- ☐ Aborto diferido.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Amenaza de aborto.

Pregunta 66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo con las etapas del ciclo vital familiar, ¿a qué se refiere la familia en contracción?

- ☐ Desde que muere el primer cónyuge hasta la muerte del superviviente.
- ☒ Desde que el primer hijo abandona el hogar hasta que lo hace el último hijo. ✔ Esta respuesta es correcta porque la familia en contracción o en plataforma de lanzamiento corresponde desde que el primer hijo abandona el hogar hasta que lo hace el último hijo.
- ☐ Desde la formación de pareja hasta el nacimiento del primer hijo/a.
- ☐ Desde que nace el primer hijo hasta que el primer hijo abandona el hogar.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Desde que el primer hijo abandona el hogar hasta que lo hace el último hijo.

Pregunta 67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Profesional en enfermería de cuidado directo acaba de tener un altercado con auxiliar de enfermería del servicio. ¿A quién debe acudir para resolver el problema?

- ☐ Al director del hospital.
- ☐ Al coordinador de enfermería del hospital.
- ☐ Al coordinador de talento humano.
- ☒ Al enfermero líder del servicio. ✔ En la cadena jerárquica, el profesional de enfermería líder del servicio, es la autoridad inmediata.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Al enfermero líder del servicio.

Pregunta 68

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Relacione las vías de administración con sus respectivas ventajas.

Vías	Ventajas
1. Sublingual	a. Pocos efectos adversos. Efecto sistémico prolongado.
2. Subcutánea	b. Efecto farmacológico rápido al pasar directo a la circulación sistémica.
3. Transdérmica	c. Inicio de acción más rápido que la oral.
4. Tópica	d. Pocos efectos adversos. Evita problemas de absorción digestiva.

- ☐ 1a, 2c, 3d, 4b
- ☐ 1a, 2b, 3c, 4d
- ☐ 1b, 2c, 3d, 4a
- ☒ 1b, 2d, 3c, 4a ✗ Las opciones de respuesta son incorrectas 2d y 3c, no corresponde a las ventajas en las vías de administración.
Sublingual: Puede administrarse el fármaco para un efecto local. Efecto farmacológico rápido al pasar directo a la circulación sistémica.
Tópica: Pocos efectos adversos. Efecto sistémico prolongado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1b, 2c, 3d, 4a

Pregunta 69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una familia donde sus integrantes están sin trabajo, atraviesan una situación de pobreza, las relaciones intrafamiliares son violentas y no predominan la práctica de los valores. ¿A qué determinante de la salud, según Marck Lalonde, hace referencia el caso?

- ☐ Conductuales.
- ☒ Sociales. ✔ Factores estructurales del sistema social que afectan de forma significativa a la estructura social. Se incluyen los siguientes aspectos: a) gobierno en su aspecto amplio, b) políticas macroeconómicas como, por ejemplo, las políticas fiscales o las políticas que regulan el mercado de trabajo; c) políticas sociales que afectan al mercado de trabajo, al estado del bienestar y a la distribución de la tierra y la vivienda; d) otras políticas públicas (educación, atención sanitaria, etc.), y e) valores sociales y culturales, como el valor que la salud y los servicios de salud tienen para la sociedad.
- ☐ Ambientales.
- ☐ Biológicos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sociales.

Pregunta 70

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hombre que trabaja en un laboratorio químico, acude al servicio de Emergencia por derrame de líquido corrosivo en sus manos, evidenciándose quemaduras en dermis y epidermis. Seleccione la etiqueta diagnóstica NANDA I prioritaria:

- ☐ Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
- ☐ Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz.
- ☒ Deterioro de la integridad cutánea.  La etiqueta diagnóstica que se relaciona con el caso mencionado es el deterioro de la integridad cutánea que corresponde a la alteración de la epidermis y/o la dermis, existen factores relacionados externos como: lesiones por agentes químicos ejemplos quemaduras, capsaicina, cloruro metílico, sulfuro de mostaza, alteraciones que corresponden con el caso expuesto.
- ☐ Perfusión tisular periférica ineficaz.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Deterioro de la integridad cutánea.

Pregunta 71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de la colocación de un tubo de drenaje torácico luego de una cirugía de tórax?

- ☐ Restaurar la presión positiva y permitir la reexpansión del pulmón afectado.
- ☐ Restablecer la cantidad de líquidos perdidos por el paciente durante la cirugía.
- ☐ Restablecer las presiones de aire en las vías aéreas superiores.
- ☒ Restaurar la presión negativa y permitir la reexpansión del pulmón afectado.  Después de la cirugía se usan sondas (tubos) torácicas para reexpandir el pulmón y remover el exceso de aire, líquido y sangre en la cavidad pleural. La presión en la cavidad de tórax es más baja que la presión atmosférica (presión negativa), en una cirugía de tórax hay pérdida de la presión negativa y la acumulación de aire, y la sangre puede causar colapso en el pulmón.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Restaurar la presión negativa y permitir la reexpansión del pulmón afectado.

Pregunta 72

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el centro de salud se ha identificado un incremento de problemas de salud prevenibles. Como profesional de enfermería va a realizar un programa educativo para la promoción de la salud, utilizando la técnica que, desde la acción-reflexión-acción, analiza una problemática de salud que afecta a la comunidad, para la construcción colectiva de conocimientos que combinan teoría y práctica y dan lugar a aprendizajes significativos. ¿Cuál es la técnica de aprendizaje cooperativo descrita?

- ☐ Murgas por la salud.
- ☒ Talleres. ✓ La opción de respuesta es correcta. El taller es la estrategia pedagógica que, desde la acción-reflexión-acción, analiza una problemática de salud que afecta a un grupo o comunidad y toma acciones frente a la misma. En el marco del enfoque socio crítico, el taller constituye la principal técnica para la construcción colectiva de conocimientos que combinan teoría y práctica y dan lugar a aprendizajes significativos.
- ☐ Ferias de la salud.
- ☐ Casa abierta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Talleres.

Pregunta 73

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando una mujer gestante se acerca a su consulta prenatal y usted procede a pesar a la paciente para la respectiva consulta médica, el IMC tiene un valor entre 25 - 29.9, señale en qué estado nutricional se encuentra:

- ☐ Bajo peso.
- ☐ Obesidad.
- ☒ Peso normal. ✗ Al mantenerse el peso con un IMC 18.5 – 24.9 se considera peso normal en el embarazo.
- ☐ Sobre peso.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Sobre peso.

Pregunta 74

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione las actividades de enfermería con la fase correcta del Proceso de Atención:

Fase del Proceso	Actividades de Enfermería
1. Valoración	a. Análisis e interpretación de datos.
2. Diagnóstico	b. Determina el logro de los objetivos propuestos.
3. Planificación	c. Realización de una exploración física.
4. Ejecución	d. Determina las prioridades inmediatas.
5. Evaluación	e. Práctica del plan de cuidados.

- ☒ 1c, 2a, 3d, 4e, 5b  Respuesta correcta:
- Valoración es la primera fase del Proceso de Atención, sus actividades se centran en la recolección de información, utilizando herramientas como la entrevista, la exploración física.
- Diagnóstico es la segunda fase del Proceso de Atención durante esta etapa se analizan e interpretan de forma crítica los datos reunidos durante la entrevista.
- Planificación es la tercera fase del Proceso de Atención durante esta etapa se establecen prioridades para los problemas identificados.
- Ejecución es la cuarta fase del Proceso de Atención durante esta etapa se pone en práctica el plan de cuidados.
- Evaluación es la quinta fase del Proceso de Atención durante esta etapa se determina la medida en que se han conseguido los objetivos de la atención.
- ☐ 1c, 2d, 3a, 4e, 5b
- ☐ 1b, 2a, 3e, 4d, 5c
- ☐ 1b, 2a, 3d, 4e, 5c

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1c, 2a, 3d, 4e, 5b

Pregunta 75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente con diagnóstico de Cetoacidosis Diabética. Al realizar la valoración de enfermería, usted observa una respiración rápida, profunda y laboriosa. ¿Cuál de los siguientes patrones respiratorios es el descrito en este caso?

- ☐ Respiración de Cheyne-Stokes.
- ☐ Respiración Eupnéica.
- ☐ Respiración de Biot.
- ☒ Respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul se describe como el incremento de la frecuencia y la profundidad de la respiración, en el que la inspiración y la espiración son casi de igual duración. Se acompaña de cuadros de Cetoacidosis Diabética o de origen renal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Respiración de Kussmaul.

Pregunta 76

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según el código deontológico para la profesión de enfermería (CIE). "La enfermera observará en todo momento normas de conducta personal que acrediten a la profesión y fomenten la confianza del público". Seleccione el elemento al que se refiere.

- ☐ La enfermera y sus compañeros de trabajo.
- ☒ La enfermera y la profesión. A la enfermera incumbirá la función principal al establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería.
La enfermera contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en la investigación.
La enfermera, a través de la organización profesional, participará en la creación y mantenimiento de condiciones de trabajo social y económicamente equitativas y seguras en la enfermería.
- ☐ La enfermera y la práctica.
- ☐ La enfermera y las personas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La enfermera y la práctica.

Pregunta 77

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique el tipo de variable en la cual solo pueden existir dos valores posibles:

- ☐ Ordinal.
- ☒ Nominal. ✓ La variable nominal, es una variable cualitativa en la que sus opciones de respuesta no tienen un orden de importancia definido ni representan un gradiente; es decir, ninguna posible respuesta es más relevante, buena o mala que otra, aún si se expresan en números. En esta variable solo pueden existir dos valores posibles.
- ☐ Razón.
- ☐ Intervalo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Nominal.

Pregunta 78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de postparto inmediato con diagnóstico de choque séptico. Durante el manejo de la patología, el médico le solicita que administre un antibiótico de amplio espectro betalactámico que actúe inhibiendo la síntesis de la pared celular. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene este mecanismo de acción?

- ☒ Ampicilina/Sulbactam. ✓ Mecanismo de acción: los antibióticos betalactámicos como la ampicilina son bactericidas. Actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana uniéndose a unas proteínas específicas llamadas PBPs (Penicillin-Binding Proteins) localizadas en la pared celular.
- ☐ Gentamicina.
- ☐ Clindamicina.
- ☐ Metronidazol.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ampicilina/Sulbactam.

Pregunta 79

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La Presión Venosa Central (PVC), brinda información sobre:

- ☐ Precarga.
- ☐ Poscarga.
- ☒ Resistencia vascular ✗ Es incorrecto, la resistencia vascular sistémica se refiere a la resistencia de la Presión Arterial (PA) a la expulsión de la sangre a partir del ventrículo izquierdo.
Por su parte la PVC refleja la presión de llenado del ventrículo derecho (Precarga), no de la resistencia vascular sistémica.
- ☐ Resistencia vascular pulmonar.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Precarga.

Pregunta 80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los aspectos a tener en cuenta en la seguridad del paciente, se encuentra la notificación de eventos adversos con el objetivo de aprender de los errores y evitar que estos se repitan. ¿Qué característica debe tener el sistema de notificación de eventos adversos?

- ☐ Obligatoriedad.
- ☐ Punitivo.
- ☒ Confidencialidad. ✓ La identificación del paciente, del notificador y de la institución no deben de ser reveladas a personas ajenas al proceso de gestión de la seguridad del paciente, a excepción de los autorizados por la ley.
- ☐ Dependiente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Confidencialidad.

Pregunta 81

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el control prenatal, para reducir las complicaciones materno neonatales, se deben identificar los factores de riesgo obstétrico modificables y no modificables. ¿Cuál es modificable?

- ☐ Endocrinopatía controlada.
- ☐ Incompetencia cervical.
- ☒ Síntomas neurovegetativos.  Los factores de riesgo modificables son: síntomas neurovegetativos, control insuficiente de la gestación, esfuerzo físico excesivo, infección urinaria baja, fumadora habitual, entre otros.
- ☐ Polihidramnios u oligoamnios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Síntomas neurovegetativos.

Pregunta 82

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione las ventajas de la leche materna para el sistema inmunológico del recién nacido.

1. Favorece la mielinización.
2. Estimula la producción de leucocitos granulocitos y macrófagos.
3. Aumenta la presencia de oligosacáridos.
4. Aumenta la Somatostatina GI.
5. Mejora la composición de las membranas celulares del cerebro.
6. Aumenta los ácidos grasos de la cadena polinsaturados.

☐ 2, 4, 5

☐ 1, 2, 3

☐ 3, 5, 6

- ☒ 2, 3, 6  La leche de la propia madre, independientemente del tiempo de gestación y del peso, es el mejor alimento para el RN.
- Factores inmunológicos
1. Presencia de oligosacáridos que participan en el sistema defensivo.
 2. Factores inmunológicos que previenen la ECN.
 3. Bifidobacterias: inhiben el crecimiento de gérmenes patógenos entéricos.
 4. Inhibidores del metabolismo patógeno de los microbios: la lactoferrina y las proteínas que enlazan los folatos y la vitamina B12 impiden el crecimiento de gérmenes in vitro.
 5. Otros agentes antiinfecciosos: factores estimulantes de la proliferación de colonias de leucocitos como granulocitos y macrófago, o ambos, y la fibronectina que favorece la función de los fagocitos.
 6. Inmunoglobulinas: fundamentalmente la Ig A secretora con mayor concentración en el calostro que en la leche definitiva, la cual protege de gérmenes del tracto gastrointestinal de la madre, IgM, IgG, IgE, IgD, complemento (C3 y C4).
 7. Agentes inmunomoduladores: prolactina, IgA secretora, prostaglandina E2 y algunas citoquinas.
 8. Péptidos derivados de la caseína que regulan la motilidad gastrointestinal y otros como el péptico inhibidor de la gastrina y la bombesina, que actúan sobre el crecimiento, maduración y regulación gastrointestinal.
 9. Lípidos: ciertos ácidos grasos de cadena medida mono y poliinsaturados ejercen una actividad antivírica, antibacteriana y antifúngica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2, 3, 6

Pregunta 83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted como profesional enfermero debe educar a las embarazadas primigestas sobre lactancia materna y decide utilizar la simulación. ¿Cuáles son los objetivos que se proponen alcanzar con esta estrategia educativa?

- ☐ Desarrollar la destreza y estimular su capacidad repetitiva.
- ☐ Lograr el conocimiento sobre el procedimiento y desarrollar su memoria.
- ☐ Desarrollar el pensamiento y capacidad memorística.
- ☒ Fomentar la lactancia materna y procurar desarrollar la destreza en el procedimiento. ✓ La simulación permite mejorar la huella de memoria en el público oyente, además de mejorar las destrezas, prevenir errores y permitir realizar preguntas sobre las técnicas de lactancia materna que no estén claras.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fomentar la lactancia materna y procurar desarrollar la destreza en el procedimiento.

Pregunta 84

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione los cuidados de enfermería en la administración del sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia en pacientes con riesgo de parto prematuro.

1. Se recomienda administrar 4 g IV hasta 20 minutos seguido de 1 hora.
2. No retrasar el parto para administrar el sulfato de magnesio.
3. Se recomienda el uso en mujeres con semana de gestación > 34.
4. Cuando la dilatación de cuello es mayor a 4 cm.
5. Administrar progesterona vaginal para prevenir parto prematuro.

- ☐ 1, 2, 4
- ☐ 3, 2, 1
- ☒ 1, 3, 5 ✗ Se recomienda el uso en mujeres con semana de gestación > 34 no corresponde porque es menor de 34 semanas de gestación el uso del sulfato de magnesio. Administrar progesterona vaginal para prevenir parto prematuro. Corresponde a los cuidados de la administración de progesterona y parto.
- ☐ 2, 4, 5

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 2, 4

Pregunta 85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente ingresa al servicio de Urgencias con traumatismo maxilofacial, a su llegada se evidencia obstrucción de la vía aérea por presencia de un cuerpo extraño, el paciente se mantiene letárgico, taquipneico, cianótico, disneico, a la auscultación disminución de los sonidos respiratorios lo que dificulta la permeabilidad de la vía aérea, para su intervención debe basarse en un diagnóstico enfermero centrado en el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario del acuerdo al caso?

- ☐ Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.
- ☐ Patrón respiratorio ineficaz.
- ☐ Deterioro de la ventilación espontánea.

- ☒ Limpieza ineficaz de la vía aérea.  El diagnóstico: Limpieza ineficaz de las vías aéreas se define como la incapacidad para eliminar las secreciones y obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables. La etiqueta diagnóstica de acuerdo al caso se presenta de la siguiente manera:

Características definitorias: Alteración en el patrón respiratorio, alteración en la frecuencia respiratoria, cianosis, disnea disminución de los sonidos respiratorios.

Factores relacionados: cuerpo extraño en las vías aéreas

Por lo tanto, la opción de respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Limpieza ineficaz de la vía aérea.

Pregunta 86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Luego de administrar un medicamento, el profesional de enfermería debe evaluar el efecto esperado del medicamento en el paciente. ¿A qué correcto, en la administración de medicamentos corresponde esta acción?

- ☐ Registro correcto.
- ☐ Forma correcta.
- ☒ Respuesta correcta.  Una vez que se administre el medicamento, el profesional de enfermería debe acompañar al paciente para evaluar si éste, tuvo la respuesta o efecto esperado.
- ☐ Acción correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Respuesta correcta.

Pregunta 87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione las manifestaciones clínicas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica:

1. Fiebre con escalofríos.
2. Disnea de esfuerzo.
3. Tos con hemoptisis.
4. Tos crónica.
5. Dolor torácico pleurítico.
6. Producción de esputo.

☐ 1, 3, 5

☒ 2, 4, 6  Respuesta correcta:
Aunque la evolución natural de la EPOC es variable, es una enfermedad progresiva caracterizada por tres síntomas principales: tos crónica, producción de esputo y disnea de esfuerzo.

☐ 1, 2, 4

☐ 3, 5, 6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2, 4, 6

Pregunta 88

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según MAIS - FCI indique. ¿Cuál es el tipo de determinante de la salud que existe en una comunidad rural con coberturas bajas de vacunación?

- ☒ Conductuales.  Hace referencia a los hábitos, costumbres, creencias, actitudes y comportamientos.
- ☐ Sociales.
- ☐ Ambientales.
- ☐ Biológicos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conductuales.

Pregunta 89

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique qué es distocia dinámica:

- ☐ Falta de relación apropiada entre los componentes cefálicos y pélvicos.
- ☐ Alteraciones de la posición fetal que dificultan o imposibilitan el parto normal.
- ☐ Alteración de la forma, dimensión, o inclinación de la pelvis materna que dificulta el parto normal.
- ☒ Conjunto de alteraciones de las contracciones uterinas que dificultan el progreso normal del parto. ✓ El personal profesional de enfermería debe estar capacitado para identificar las causas de un parto distocico y poder aplicar cuidados adecuados y evitar los problemas maternos y neonatales la distocia dinámica se produce por problemas en la actividad uterina normal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conjunto de alteraciones de las contracciones uterinas que dificultan el progreso normal del parto.

Pregunta 90

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la sala de patología obstétrica, usted atiende a una mujer de 25 años con embarazo de 37 semanas que presenta tensión arterial de 170/110 mm Hg, agitación psicomotriz y proteinuria con tirilla reactiva ++. Luego de aplicar la herramienta SCORE MAMÁ activa clave azul. De acuerdo al protocolo para eclampsia y de acuerdo con la prescripción médica. ¿Qué dosis de sulfato de magnesio administra para mantenimiento?

- ☐ 2gr en bolo en 20 minutos.
- ☐ 1gr / hora en infusión continua.
- ☒ 2gr / hora en infusión ✓ La opción de respuesta es correcta. De acuerdo al protocolo de manejo clave azul de la herramienta SCORE MAMÁ, en mantenimiento para eclampsia la dosis de sulfato de Magnesio es 2gr / hora en infusión continua.
- ☐ 4gr IV en 20 minutos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2gr / hora en infusión continua.

Pregunta 91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la visita domiciliaria se identifica un paciente con Diabetes tipo 2. Al interrogatorio manifiesta que está preocupado actualmente por el problema de salud que enfrenta y considera cambiar su conducta alimentaria, además, solicita información sobre la dieta. ¿Cuál es la fase del cambio de la conducta de salud que presenta el paciente?

- ☐ Fase de acción.
- ☐ Fase de precontemplación.
- ☒ Fase de contemplación.  Durante la fase de contemplación, la persona reconoce que tiene problemas y considera seriamente cambiar una conducta concreta, reúne información de manera activa y habla de planes para cambiar la conducta en un futuro próximo (p. ej., en los próximos 6 meses). Sin embargo, puede no estar preparada para emprender la acción. Algunas personas pueden permanecer en la fase contemplativa durante meses o años antes de ponerse en acción.
- ☐ Fase de preparación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fase de contemplación.

Pregunta 92

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una madre acude con su niño de 4 meses al centro de salud para vacunación, la misma refiere que a los 2 meses luego de la aplicación del esquema, presentó reacciones neurológicas (convulsiones) por el componente pertussis. ¿Cuál es la vacuna indicada para este caso?

- ☐ DT.
- ☐ SRP.
- ☒ Pentavalente.  Pentavalente es una combinación (DPT+HB+Hib) que contiene el agente etiológico Pertussis, causante de desencadenar reacciones neurológicas.
- ☐ DPT.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: DT.

Pregunta 93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente permanece hospitalizado en el área crítica con ventilación mecánica invasiva, una de las funciones de enfermería en este paciente es manejar el tubo endotraqueal para evitar complicaciones como la micro-aspiración y prevenir la neumonía asociada por la ventilación. ¿Cuál es el método principal que utiliza para evitar estas complicaciones?

- ☐ Utilizar métodos colorímetros.
- ☒ Comprobar  En el endotest, una vez que se introduce la sonda, y se coloca a unos 2 cm por encima de la carina, se infla un manguito en el extremo distal de la sonda endotraqueal mediante un globo piloto. Al inflar el manguito para prevenir el escape de aire alrededor de la sonda, se reduce al mínimo la posibilidad de broncoaspiración y se impide el desplazamiento de la sonda. Se verifica la posición del tubo endotraqueal mediante el control de las concentraciones de dióxido de carbono al final de la espiración, y se confirma con una radiografía de tórax. Pueden ocurrir complicaciones debido a la presión ejercida por el manguito sobre la pared traqueal. La presión del manguito debe mantenerse entre 15 y 20 mm Hg (20-27 cm H2O) porque la presión alta puede causar hemorragia traqueal, isquemia y necrosis por compresión, mientras que la presión baja incrementa el riesgo de neumonía por aspiración. Por lo tanto, la opción de respuesta es correcta.
- ☐ Valorar con la oximetría de pulso.
- ☐ Medir con la Capnografía.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Comprobar con el Endotest.

Pregunta 94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el preoperatorio, usted recibe a un paciente con antecedentes de hipertensión arterial controlada con tratamiento. ¿Cuál es la Escala de Riesgo Anestésico (ASA) en este caso?

- ☐ ASA 3
- ☒ ASA  2 Se aplica a pacientes con una enfermedad sistémica leve. Ejemplo: paciente sin limitaciones funcionales y una enfermedad bien controlada (por ejemplo hipertensión tratada, obesidad con un IMC menor de 35, bebedor social frecuente o fumador de cigarrillos).
- ☐ ASA 1
- ☐ ASA 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ASA 2

Pregunta 95

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale el diagnóstico de enfermería que corresponde a la definición operacional: La inspiración y/o espiración que no proporcionan ventilación adecuada.

- ☐ Estado respiratorio: ventilación.
- ☐ Deterioro del intercambio de gases.
- ☒ Patrón respiratorio ineficaz. ✓ Respuesta correcta:
Patrón respiratorio ineficaz: La inspiración y/o espiración que no proporcionan ventilación adecuada.
- ☐ Limpieza ineficaz de la vía aérea.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Patrón respiratorio ineficaz.

Pregunta 96

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una paciente púérpera se dirige a la unidad de cuidados intensivos neonatales ya que no ha visto a su hijo desde hace 22 horas que fue sometida a cesárea y solicita saber el estado de salud del recién nacido sin recibir respuesta del personal de salud. ¿Cuál es el derecho de la paciente que se está irrespetando?

- ☐ A recibir un trato digno.
- ☒ A la información. ✓ Esta respuesta es correcta porque todo paciente tiene derecho a recibir información concerniente al diagnóstico de su estado de salud, en este caso de su hijo.
- ☐ A no ser discriminado.
- ☐ A la confidencialidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: A la información.

Pregunta 97

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique la clasificación de los desechos hospitalarios:

1. Comunes.
2. Corporales.
3. Infecciosos.
4. Sólidos.
5. Especiales.
6. Químicos.

- ☒ 1, 3, 5 La respuesta es correcta porque según el capítulo III de la clasificación de los desechos en el artículo 4, los desechos se clasifican en desechos generales o comunes, desechos infecciosos y desechos especiales.
- Desechos generales o comunes: Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o el medioambiente.
- Desechos infecciosos: Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente.
- Desechos especiales: Son aquellos que por sus características físico-químicas representan riesgo para los seres humanos, animales o medio ambiente y son generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
- ☐ 1, 4, 6
- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 2, 4, 6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 5

Pregunta 98

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un adolescente de sexo masculino de 17 años acude al centro de salud manifestando preocupación por su salud sexual, refiere el deseo de iniciar actividad sexual con su pareja y solicita asesoría para prevenir un embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual como el VIH. Se identifica que la prioridad es otorgar un recurso para la prevención primaria a su paciente. ¿Qué mecanismo de prevención es el más adecuado recomendar en este caso?

- ☐ Profilaxis post exposición.
- ☒ Uso de preservativos. ✔ Esta opción es correcta porque los preservativos masculinos y femeninos siguen siendo la única herramienta disponible que garantiza la triple protección (VIH, otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado). El uso constante sigue siendo recomendado para la prevención primaria de la infección por VIH.
- ☐ Abstinencia.
- ☐ Uso de antirretrovirales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Uso de preservativos.

Pregunta 99

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué acción se debe realizar para prevenir infecciones en el paciente con sonda urinaria a permanencia?

- ☐ Irrigar la sonda con jeringa de manera sistemática.
- ☒ Usar técnica aséptica durante la inserción de la sonda. ✔ Respuesta correcta: La utilización de técnica aséptica escrupulosa durante la inserción de la sonda, es la principal acción que disminuye el riesgo de infección.
- ☐ Realizar cambio sistemático de la sonda vesical.
- ☐ Vaciar la bolsa de recolección al menos cada 24 horas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Usar técnica aséptica durante la inserción de la sonda.

Pregunta 100

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un grupo de profesionales de enfermería en un servicio de salud, mantienen un ambiente de trabajo respetuoso y de colaboración. ¿A qué elemento del Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), se refiere el comportamiento de este grupo?

- ☐ La enfermera y la profesión.
- ☒ La enfermera y sus compañeras de trabajo.  El Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras está constituido por cuatro elementos, el cuarto es: La Enfermera y sus compañeros de trabajo, en el que se señala que la enfermera mantendrá una relación respetuosa de cooperación con las personas con las que trabaj en la enfermería y en otros sectores.
- ☐ La enfermera y las personas.
- ☐ La enfermera y la práctica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La enfermera y sus compañeras de trabajo.