

**Comenzado el** miércoles, 20 de mayo de 2026, 21:45

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** miércoles, 20 de mayo de 2026, 23:21

**Tiempo empleado** 1 hora 35 minutos

**Calificación** 82,00 de 100,00

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una unidad de quemados, los pacientes con quemaduras de tercer grado presentan un alto riesgo de desarrollar infecciones invasivas por *Pseudomonas aeruginosa* resistentes a múltiples fármacos. Estas infecciones se asocian con una mortalidad significativamente elevada y requieren el uso de fármacos antimicrobianos de espectro extendido, con elevado perfil de toxicidad. ¿Qué objetivo de investigación aborda directamente la identificación de fuentes endógenas del caso clínico planteado?

- ☐ Describir los patrones de resistencia antibiótica de las cepas de *Pseudomonas aeruginosa* aisladas de infecciones invasivas en la unidad de quemados.
- ☒ Investigar la prevalencia de colonización por *Pseudomonas aeruginosa* resistente a múltiples fármacos en sitios corporales específicos al ingreso. ✔ Esta respuesta es correcta porque este objetivo busca determinar si los pacientes ya están colonizados con la bacteria resistente en alguna parte de su cuerpo al ingreso.
- ☐ Comparar la mortalidad entre pacientes con infecciones invasivas por *Pseudomonas aeruginosa* resistente y sensible a múltiples fármacos.
- ☐ Evaluar la efectividad de diferentes protocolos de higiene de manos del personal de enfermería en la prevención de la transmisión cruzada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Investigar la prevalencia de colonización por *Pseudomonas aeruginosa* resistente a múltiples fármacos en sitios corporales específicos al ingreso.

## Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente ingresa al servicio de emergencia a causa de un accidente de tránsito, mientras viajaba como conductor, a la valoración de enfermería consciente álgico con presencia de aleteo nasal, disnea, uso de los músculos respiratorios y deformidad de la pared torácica. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería principal para este caso?

- ☐ Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.
- ☒ Patrón respiratorio ineficaz. ✔ La opción de respuesta es correcta porque la etiqueta diagnóstica de acuerdo al caso se presenta de la siguiente manera:  
Patrón respiratorio ineficaz (00032). La inspiración o espiración no proporciona una ventilación adecuada.  
Características definitorias: aleteo nasal, disnea, uso de los músculos respiratorios para respirar.  
Factores relacionados: dolor  
Condición asociada: deformidad de la pared torácica
- ☐ Deterioro del intercambio de gases.
- ☐ Riesgo de confusión aguda.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Patrón respiratorio ineficaz.

## Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique a qué patología hace referencia la definición: Síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de sobrecarga hídrica o de perfusión tisular inadecuada, como resultado de la incapacidad del corazón para bombear una adecuada cantidad de sangre para cubrir las demandas del organismo.

- ☐ Arritmia cardíaca.
- ☐ Infarto agudo de miocardio.
- ☒ Insuficiencia cardíaca. ✔ La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de sobrecarga hídrica o de perfusión tisular inadecuada, como resultado de la incapacidad del corazón para bombear una adecuada cantidad de sangre para cubrir las demandas del organismo.
- ☐ Angina de pecho.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Insuficiencia cardíaca.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente 46 años va a hacer intervenido de una Colelitiasis durante la valoración prequirúrgica el valor de la Hb es menor a 7 grs/dl, o Hto. (< 35%), indican trasfundir paquetes globulares STAT, el tipo de suero que puede administrarse conjuntamente con la sangre y derivado es:

- ☒ Suero Fisiológico al 0.9%  La única solución compatible con cualquier hemo componente es la solución salina, ya que no altera el equilibrio osmótico de la membrana celular.
- ☐ Dextrosa al 50%
- ☐ Dextrosa al 5%
- ☐ Lactato de Ringer

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Suero Fisiológico al 0.9%

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione las intervenciones de enfermería a pacientes en recuperación postanestésica:

1. Valoración inicial al ingreso.
2. Controlar infección de la herida quirúrgica.
3. Mantener la ventilación.
4. Control de constantes vitales cada hora.
5. Control cardiovascular.
6. Trasladar al servicio cuando el paciente tenga ALDRETE de 6.

- ☐ 1, 3, 5
- ☐ 3, 5, 6
- ☒ 1, 2, 4  Respuesta incorrecta:  
El control de infección de la herida quirúrgica se realiza en el servicio al que el paciente es trasladado y cuando amerita; en recuperación postanestésica el control de constantes vitales es cada 15 minutos.
- ☐ 2, 4, 6

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 3, 5

### Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como licenciado en enfermería realiza la visita domiciliar a una familia en etapa de contracción, donde ambos cónyuges son adultos mayores con dependencia funcional. ¿Qué actividad prioritaria se realiza teniendo en cuenta los factores de riesgo?

- ☐ Orientar una dieta hipercalórica y fraccionada.
- ☐ Garantizar reposo minimizando las actividades.
- ☒ Planificar un plan rutinario de ejercicios. ✔ Es correcto. Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la categoría "sin actividad" a la de "cierto nivel" de actividad. Los adultos mayores que no siguen las recomendaciones de realización de actividad física deberían intentar aumentar la duración, la frecuencia y finalmente la intensidad como meta para cumplirlas. Los adultos mayores que realizan ejercicios físicos, presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, y depresión, un mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una mejor masa y composición corporal. Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de limitaciones funcionales moderadas y graves. El ejercicio físico rutinario ayuda a mantener la forma física, elasticidad, coordinación y equilibrio, disminuyendo el riesgo de caída.
- ☐ Facilitar silla de ruedas y cuidadores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Planificar un plan rutinario de ejercicios.

### Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Durante la valoración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico, usted se percató que el paciente presenta deterioro neurológico progresivo, sólo ante un estímulo doloroso abre los ojos y se retira del dolor, sus palabras son mal articuladas con sonidos incomprensibles. ¿Qué puntuación en la escala de Glasgow tiene el paciente?

- ☐ 13 puntos.
- ☐ 15 puntos.
- ☒ 7 puntos. ✗ Es incorrecto, no tiene 7 puntos. Al abrir los ojos tan solo ante el dolor, en la respuesta ocular tiene una puntuación de 2, debido a que los sonidos son incomprensibles la respuesta verbal es de 2 puntos y se retira al dolor tiene 4 puntos en la respuesta motora. La suma total en el caso presentado es de 8 puntos.
- ☐ 8 puntos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 8 puntos.

### Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el servicio de Pediatría, usted prepara para la consulta de control de niño sano a un niño de 23 meses, inicia con la toma de medidas antropométricas, colocando en posición de cúbito supino y midiendo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies (talones). ¿Qué medida antropométrica está tomando en relación con la edad del niño?

- ☐ Peso.
- ☐ Talla.
- ☐ IMC.
- ☒ Longitud. ✓ La opción de respuesta es correcta. La longitud, mide el tamaño de niños desde la coronilla de la cabeza hasta los pies (talones), y se mide acostado, boca arriba (en cúbito supino). Esta medida se toma en niños de cero a veinticuatro meses.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Longitud.

### Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los centros de salud de nivel primario se desarrollan actividades extramurales, con visitas a las escuelas y familias donde articulan acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, con una visión psicosocial. ¿Cuál de los principios del Modelo de Atención Integral de la Salud (MAIS) se está cumpliendo?

- ☐ Universalidad.
- ☐ Equidad.
- ☐ Garantía de los derechos de las y los ciudadanos.
- ☒ Integralidad. ✓ Integralidad: Desde una visión multidimensional y biopsicosocial de la salud individual y colectiva, actuando sobre los riesgos y condiciones que afectan la salud; identificando y potenciando los factores protectores de la salud. Articula acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos de las personas, familias, comunidad y su entorno. Interrelaciona y complementa actividades sectoriales, ciudadanas, y los diversos sistemas médicos (medicina formal / medicinas ancestrales / medicinas alternativas).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Integralidad.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Primer Nivel de Atención tiene como objetivo ser reconocido por la población como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud y contar con servicios de salud articulados a la Red Pública y Complementaria de Salud. ¿Cuáles son las modalidades de atención integral en este nivel?

- ☐ Atención de promoción y atención de prevención.
- ☐ Atención a población priorizada y atención a población cautiva.
- ☒ Atención extramural y atención intramural. ✓ Los equipos de atención integral de primer nivel brindan su atención bajo dos modalidades: atención extramural o comunitaria y atención intramural o en el establecimiento.
- ☐ Atención de curación y atención de rehabilitación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Atención extramural y atención intramural.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Adulto mayor de 70 años, ingresa al servicio de neurología en estado inconsciente, se observa una delgadez extrema, familiares manifiestan que tiene algunos días sin comer, al realizar la valoración clínica se detecta buena función intestinal. Según su criterio. ¿Cuál sería la vía de acceso más adecuada para iniciar la alimentación?

- ☒ Por vía mixta (enteral y parenteral). ✗ Mientras este funcional la vía gástrica no será necesario dar alimentación mixta ya que por vía enteral se puede cubrir todos los requerimientos (Mahan & Raymond., 2017).
- ☐ Por vía naso entérica.
- ☐ Por vía oral.
- ☐ Por vía parenteral.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Por vía naso entérica.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione el término con la definición que corresponde:

| Término                  | Definición                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Desinfección          | a. Es el proceso de eliminación de toda forma de vida, que implica pérdida de la viabilidad.          |
| 2. Esterilización        | b. Es un proceso que se realiza para evitar la adquisición de infecciones.                            |
| 3. Limpieza hospitalaria | c. Es el proceso que mata o destruye a casi todos los microorganismos que pueden producir enfermedad. |

- ☐ 1c, 2b, 3a
- ☒ 1c, 2a, 3b  Desinfección: Es el proceso que mata o destruye a casi todos los microorganismos que pueden producir enfermedad.  
Esterilización: Es el proceso de eliminación de toda forma de vida, que implica pérdida de la viabilidad.  
Limpieza hospitalaria: Es un proceso que se realiza para evitar la adquisición de infecciones.
- ☐ 1b, 2a, 3c
- ☐ 1a, 2c, 3b

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1c, 2a, 3b

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

De acuerdo con el MAIS-FCI cuando hay optimización y uso racional de los recursos orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas, a la eficiencia del gasto, garantizando el uso adecuado y un mayor rendimiento de los recursos se refiere a:

- ☒ Objetivos estratégicos para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud. ✗ Reorientación del enfoque curativo; Acercar los servicios de salud a la comunidad reduciendo las barreras de acceso y fortalecer la organización territorial de los establecimientos de salud en Red Pública integral y ampliación de la oferta estructurando redes zonales y distritales conforme la nueva estructura desconcentrada de gestión del sector social y la articulación requerida en los diferentes niveles de atención, fortaleciendo el sistema de referencia y contrarreferencia para garantizar la continuidad en las prestaciones son objetivos estratégicos para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud.
- ☐ Propósito del Modelo de Atención Integral de Salud.
- ☐ Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud.
- ☐ Principios del Modelo de Atención Integral de Salud.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Principios del Modelo de Atención Integral de Salud.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer lleva a la unidad de salud por control de niño sano a su hijo de 11 meses, luego de la revisión médica, el profesional encuentra que el niño está bajo de peso para la edad y solo ha recibido las vacunas de los 2 meses, por lo tanto, remite a la madre al vacunatorio. El profesional de enfermería revisa el carné y corrobora lo reportado por el médico. ¿Qué intervención de enfermería corresponde?

- ☐ Aplicar 2da. dosis de: Rotavirus, fIPV, neumococo y pentavalente.
- ☒ Aplicar 2da. dosis de: fIPV, neumococo y pentavalente. ✓ La respuesta correcta es la administración de la 2da. dosis de fIPV, neumococo y pentavalente, la misma que debió administrarse a los 4 meses de edad y que de acuerdo al cuadro de inmunizaciones ENI 2019 del MSP señala, que la edad máxima de administración de las tres vacunas es hasta los 11 meses 29 días.
- ☐ Aplicar 2da. dosis de: bOPV, neumococo y pentavalente.
- ☐ Aplicar 2da. dosis de: neumococo y pentavalente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aplicar 2da. dosis de: fIPV, neumococo y pentavalente.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Adulto mayor acude a la consulta externa acompañado de su hija, a la entrevista manifiesta que presenta dificultades para realizar cuidados de la vida diaria, además al examen físico se observa la necesidad de apoyarse para deambular. ¿Cuál es el instrumento que utilizaría para hacer la valoración según los datos descritos?

- ☐ Pfeiffer.
- ☐ Lawton y Brody.
- ☐ Yesavage.
- ☒ Índice de Katz. Esta opción es correcta porque el Índice de Katz es un instrumento para evaluar la independencia de un enfermo en cuanto a la realización de las actividades básicas de la vida diaria. En muchos casos, puede ser contestado por el propio enfermo, en otros deben ser los familiares; y, en todo caso, deberá mediar una exploración adecuada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Índice de Katz.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La ictericia es una condición clínica donde la bilirrubina sérica está aumentada como para observar un tinte amarillo, según la escala visual de Kramer. ¿Cuál es el valor de la bilirrubina total cuando se extiende a la mitad superior del tronco?

- ☐ 4 - 8 mg/dl
- ☐ 10 - 18 mg/dl
- ☐ 8 - 16 mg/dl
- ☒ 5 - 12 mg/dl. Estimación visual de la ictericia en la zona 2 kramer se extiende a la mitad superior del tronco con un valor de 5 - 12 mg/dl de bilirrubina.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 5 - 12 mg/dl

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las Modalidades de Atención del Modelo Integral de Salud?

- ☐ Atención individual, atención familiar, atención a la comunidad y atención al ambiente o entorno natural.
- ☐ Promoción, prevención, curación, rehabilitación, cuidados paliativos e integración social.
- ☒ Atención extramural, atención intramural, atención en unidades móviles y atención prehospitalaria. ✔ Los equipos integrales de salud en las unidades operativas de los tres niveles de atención deberán planificar anualmente las actividades según las MODALIDADES DE ATENCIÓN, El MAIS-FCI organiza la atención integral bajo las siguientes modalidades:
  - Atención extramural o comunitaria.
  - Atención intramural o en un establecimiento de salud.
  - Atención en establecimientos móviles de salud.
  - Atención Prehospitalaria.Además de estimar el volumen de atenciones y la cantidad de insumos y medicamentos que requieran para cumplir las actividades programadas por los equipos de atención integral quienes brindarán su atención bajo las siguientes modalidades caracterizadas por ofrecer según su capacidad resolutive.
- ☐ Aparentemente sano, con riesgo, con patología, con deficiencia y discapacidad o secuela.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Atención extramural, atención intramural, atención en unidades móviles y atención prehospitalaria.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El personal de salud debe identificar el modo de transmisión de enfermedades infecto contagiosas y los tipos de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión. ¿Qué patología es transmitida por gotas?

- ☒ Neumonía. ✔ El modo de transmisión de la neumonía es por gotas. Las gotas son generadas desde una persona fuente, durante la tos, el estornudo, el habla, entre otros. Las enfermedades transmitidas por esta vía son: meningitis, neumonía, sepsis, entre otras. La transmisión ocurre cuando las gotas, partículas mayores de 5 micras generadas por la persona infectada son propagadas a una corta distancia y son depositadas en las conjuntivas, mucosa nasal o boca del huésped. Debido a que las gotas no quedan suspendidas en el aire, no se requiere un manejo especial del aire.
- ☐ Tuberculosis.
- ☐ Sarampión.
- ☐ Rubeola.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Neumonía.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione los tipos de prácticas seguras y sus procedimientos, que debe aplicar en la unidad hospitalaria, con respecto a la seguridad del paciente.

| Tipo de práctica segura               | Procedimiento                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Prácticas seguras administrativas. | a. Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo.            |
| 2. Prácticas seguras asistenciales.   | b. Mantenimiento preventivo correctivo de equipos biomédicos. |
|                                       | c. Prevención de úlceras por presión.                         |
|                                       | d. Identificación correcta del paciente.                      |

- ☐ 1ab, 2cd
- ☐ 1cd, 2ab
- ☐ 1ad, 2bc

- ☒ 1bd, 2ac Las prácticas seguras son procesos o estructura cuya aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos asociados a la atención de salud, que se apoyan en la mejor evidencia científica disponible y que procuran prevenir, minimizar o eliminar el riesgo asociado a la práctica clínica.

Las prácticas establecidas para la seguridad del paciente - usuario son las siguientes:

Prácticas seguras administrativas:

Mantenimiento preventivo correctivo de equipos biomédicos: comprende todas las actividades que se realizan para cumplir con la vida útil de cada equipo determinada por el fabricante con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos utilizados en la atención al paciente mediante la aplicación de un programa de mantenimiento preventivo (los que implicaría lubricación, calibración, limpieza, entre otros).

Identificación correcta del paciente: procedimiento de identificación que no permite duda o equivocación de los pacientes y que hace posible atender a la persona correcta en el momento correcto y con la práctica adecuada correcta.

Prácticas seguras asistenciales:

Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo: todos los medicamentos tienen potencial riesgo de causar algún evento adverso, sin embargo, se pone énfasis en los medicamentos de alto riesgo porque son aquellos que por sus características propias como por ejemplo un margen terapéutico estrecho, pueden causar daño, incluso la muerte, cuando se produce un error en el curso de su administración.

Prevención de úlceras por presión, con el objetivo de disminuir la incidencia de úlceras por presión en pacientes que reciben atención en los diferentes niveles.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1bd, 2ac

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué alteración es característica de la fisiopatología de la gastroenteritis?

- ☐ Alteración en la absorción del sodio.
- ☐ Alteración en la absorción de líquidos.
- ☐ Alteración en el metabolismo de los alimentos.
- ☒ Alteración de la absorción intestinal.  En la gastroenteritis ciertas especies bacterianas sintetizan enterotoxinas, las cuales deterioran la absorción intestinal, provocando náusea, vómito y aumento en el volumen de las deposiciones, lo que lleva consigo la secreción de electrolitos y agua, provocando un desequilibrio hidroelectrolítico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alteración de la absorción intestinal.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer de 60 años, acude a consulta externa, manifiesta que tras haber iniciado tratamiento para la hipertensión arterial, con fármaco que no especifica, presenta edema de miembros inferiores. ¿Cuál de los siguientes medicamentos, produce este efecto secundario?

- ☐ Losartán.
- ☐ Labetalol.
- ☐ Enalapril.
- ☒ Amlodipino.  Por lo general el amlodipino es bien tolerado. Los posibles efectos secundarios son: edema periférico, cefalea, rubor, palpitaciones, mareos y fatiga.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Amlodipino.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes vacunas. ¿Cuáles son inactivas fraccionadas recombinantes?

- ☐ SRP - SR.
- ☐ Hepatitis A - IPV.
- ☐ DT - dT.
- ☒ Hepatitis B - VPH. Son vacunas inactivas fraccionadas recombinantes porque se basan en la utilización de un microorganismo (virus o bacteria) que actúa como vector para expresar genes de otro microorganismo diferente. De esta forma, este nuevo microorganismo recombinante, puede utilizarse como vacuna frente a ambos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hepatitis B - VPH.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione las fases del proceso administrativo:

1. Estandarización.
2. Planeación.
3. Delegación.
4. Organización.
5. Dirección.
6. Negociación.
7. Control.

- ☒ 2, 4, 5, 7 El proceso administrativo tiene cuatro fases:
  1. La planeación representa el inicio del proceso administrativo, que es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, estructurados en un esquema detallado de realizarse en el futuro.
  2. La organización es una fase que persigue obtener un fin, que fue previamente definido a través de la planeación. Busca efectuar una serie de actividades para lograr un propósito común.
  3. La dirección es la ejecución de planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, comunicación y supervisión.
  4. El control es la última etapa del proceso administrativo, consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan aceptado, tiene como fin señalar los errores y debilidades a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.
- ☐ 2, 3, 6, 7
- ☐ 1, 4, 5, 6
- ☐ 1, 2, 3, 7

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2, 4, 5, 7

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se programa cirugía de colecistectomía en paciente masculino de 47 años, con antecedentes patológicos personales de HIV en tratamiento con su TARGA habitual, ingesta y abuso de alcohol hace 3 años. SV: PA: 100/70mmHg; FC: 76lpm; Fr: 22rpm; T°:36,7°C; IMC: 32. En el transoperatorio se presenta complicación en la respiración, provocando disminución en la función ventilatoria. ¿Qué factor considera como principal causa de complicación durante el transoperatorio?

- ☐ Aumento del peso corporal del paciente.
- ☐ Hábitos de ingesta de alcohol del paciente.
- ☐ Disminución del peso corporal del paciente.
- ☒ Paciente con antecedentes de inmunodepresión. ✗ Los pacientes con enfermedades que alteran la función inmune están en mayor riesgo de desarrollar una infección después de la intervención. Algunos ejemplos pueden ser los pacientes con cáncer, alteraciones de la médula ósea, y los que se someten a radioterapia.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Aumento del peso corporal del paciente.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione los métodos de investigación científica con sus características:

| MÉTODOS           | CARACTERÍSTICAS                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 1. Clínico        | a) Determinantes de la salud-enfermedad.  |
| 2. Epidemiológico | b) Observaciones en sujetos humanos.      |
|                   | c) Toma de decisiones en poblaciones.     |
|                   | d) Frecuencias de enfermedades.           |
|                   | e) Factores que aumentan el riesgo.       |
|                   | f) Observaciones en grupos poblacionales. |

- ☒ 1bde, 2acf  Método clínico: el investigador busca a través de sus observaciones en sujetos humanos intactos, obtener información sobre las frecuencias de las enfermedades, los factores que aumentan el riesgo de padecerlas, los métodos para identificarlas, las intervenciones que pueden ayudar en su prevención o su tratamiento y su pronóstico. Este tipo de método hace más énfasis en la aplicabilidad práctica de los hallazgos para tomar decisiones sobre el cuidado de salud del individuo. Método Epidemiológico: Busca recolectar información sobre las características, los determinantes de la salud y de la enfermedad en grupos y poblaciones. Además, busca obtener información que sea aplicable para tomar decisiones en dichas poblaciones, los resultados tiene su aplicabilidad directa.
- ☐ 1bce, 2adf
- ☐ 1adf, 2bce
- ☐ 1cde, 2abf

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1bde, 2acf

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El profesional de enfermería brinda atención a una paciente de 26 años en el puerperio inmediato con evolución de 7 horas quién refiere que no tiene una buena producción de leche materna, mostrándose preocupada por el crecimiento y desarrollo de su bebé. ¿Qué actividad de enfermería realiza inmediatamente?

- ☐ Educar fomentando el uso de fórmula y alimentación complementaria.
- ☐ Educar fomentando una alimentación complementaria a libre demanda.
- ☒ Educar fomentando una buena succión y lactancia materna exclusiva a libre demanda. Esta opción es correcta porque a los recién nacidos y lactantes se debe alimentar únicamente con leche materna hasta los 6 meses de edad, además, entre mayor succión habrá mayor producción de leche materna. Guía del kit de lactancia(Página 17)
- ☐ Educar fomentando la succión y lactancia materna exclusiva con horarios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Educar fomentando una buena succión y lactancia materna exclusiva a libre demanda.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer de 32 años, multigesta, embarazada de 38 semanas, presenta contracciones uterinas regulares. Es valorada por el médico, quien realiza tacto vaginal y refiere que se encuentra en labor de parto fase latente, por lo que permanece en observación y controles secuenciales. ¿Cuál es el cambio fisiológico que está ocurriendo en el cérvix en esta etapa?

- ☒ Borramiento y dilatación. Es lo correcto, durante las últimas semanas del embarazo y especialmente durante el trabajo de parto, el cuello uterino se adelgaza y se acorta gradualmente en un proceso llamado borramiento, Este cambio ayuda a preparar el cuello uterino para la dilatación durante el parto.
- ☐ Cierre hermético y protección.
- ☐ Disminución de tamaño.
- ☐ Mayor rigidez y menor elasticidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Borramiento y dilatación.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La calidad es un concepto que ha evolucionado hasta nuestros días, existe un pensador que hace referencia a la calidad como la satisfacción del cliente. ¿Cuál es el autor que hace referencia al enunciado?

- ☐ Joseph M. Juran.
- ☐ Avedis Donabedian.
- ☐ Walter A. Shewhart.
- ☒ W. Edwards Deming.  Según Deming, la calidad puede representarse en un ciclo de acciones correctivas y preventivas que se llamó "Ciclo de Deming". Este ciclo se define en cuatro pasos:
  - 1) Planificar y definir los objetivos a alcanzar y cómo se van a implementar las acciones;
  - 2) Hacer o implementar las acciones correctivas;
  - 3) Verificar y controlar que se logren los objetivos, y
  - 4) Actuar según los resultados en la toma de medidas preventivas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: W. Edwards Deming.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El elemento del componente de Provisión de Servicios del MAIS-FCI que entrega atención en salud a las personas y las familias considerando las especificidades y necesidades de cada grupo etario con enfoque de género se denomina:

- ☐ Modalidades de atención.
- ☐ Grupos de riesgo específicos.
- ☐ Grupos prioritarios.
- ☒ Ciclos de vida.  La provisión de servicios por grupos etario y con enfoque de género que considera las especificidades y necesidades de las personas y familias corresponde a la atención por ciclos de vida.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ciclos de vida.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hombre de 58 años con antecedentes de Diabetes Mellitus y asma, acude a la consulta al servicio de emergencias del hospital general, luego de haber sufrido un ataque de ansiedad, en la valoración se observa que presenta los siguientes síntomas; disnea, debilidad, mareo y confusión, además, el grado de recorrido de sus respiraciones se encuentra aumentado, a la exploración de los signos vitales se objetiva T 37 °C, R 30 rpm, P 98 lpm y presión arterial 140/80 mm/hg, sin otros hallazgos de interés. ¿Cuál de las alteraciones de la respiración presenta el paciente?

- ☒ Hiperventilación.  Respuesta correcta: En la hiperventilación la frecuencia y la profundidad de las respiraciones aumentan, además; la ansiedad aguda puede producir hiperventilación y un exceso de eliminación del anhídrido carbónico.
- ☐ Bradipnea.
- ☐ Taquipnea.
- ☐ Hipoventilación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hiperventilación.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una medida de control administrativo que se recomienda aplicar para la prevención de tuberculosis en el primer nivel de atención.

- ☐ Ventilación adecuada, que permita el flujo natural de aire a través de ventanas abiertas.
- ☒ En el momento de ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.  En el primer nivel de atención se recomienda realizar la búsqueda permanente de sintomáticos respiratorios en todas las áreas y servicios de los establecimientos de salud. Se recomienda que las salas de espera en la consulta externa sean abiertas y bien ventiladas; además se debe evitar la presencia conjunta de afectados con TB bacteriológicamente positiva. Se recomienda en el momento de ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos. Se recomienda la elaboración de un plan de control de infecciones en el establecimiento de salud. Se recomienda que el talento humano en salud con algún tipo de inmunodepresión no sea asignado a áreas de alto riesgo de contagio de TB bacteriológicamente positiva sensible y/o resistente.
- ☐ La recolección de la muestra de esputo debe realizarse en ambientes con luz y ventilación natural.
- ☐ Se recomienda el uso de respiradores N95 durante la atención a afectados en habitaciones de aislamiento para TB.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En el momento de ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Varón de 65 años atendido en emergencia, con diagnóstico de deshidratación. Le prescriben Solución salina al 0.9%, 83 ml/hora. ¿A qué goteo le administra esta solución?

- ☐ 42 gotas por minuto.
- ☐ 20 gotas por minuto.
- ☐ 35 gotas por minuto.

- ☒ 28 gotas por minuto.  Aplicando la fórmula:  
Goteo = cantidad de solución en ml / (número de horas \* constante 3).  
Goteo = 83 / (1\*3)  
Goteo= 27. 6  
Aproximando la respuesta es 28

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 28 gotas por minuto.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique la saturación de oxígeno esperable en el recién nacido durante la reanimación postparto a los 3 minutos según lo descrito en el Normograma de Dawson:

- ☒ 70 -75%  La opción de respuesta es correcta. De acuerdo a la Sat O2 esperable en el recién nacido durante la reanimación post parto descrita en el Normograma de Dawson, a los 3 minutos se espera una Sat O2 de 70 a 75%.
- ☐ 80 - 85%
- ☐ 75 - 80%
- ☐ 85 - 95%

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 70 -75%

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de aislamiento requiere un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar?

- ☐ Aislamiento por contacto.
- ☐ Aislamiento por gotas.
- ☐ Aislamiento por cohorte.
- ☒ Aislamiento por aire. Los microorganismos transmitidos de esta manera incluyen *Mycobacterium tuberculosis* y los virus de la rubéola, sarampión y varicela, influenza. Enfermedades de forma oportunista tanto el coronavirus, asociado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS) como el virus de influenza.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aislamiento por aire.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando valora a un paciente con un trastorno neurológico, usted comprueba que presenta signo de Kernig positivo. Este hallazgo se relaciona con:

- ☒ Irritación menínea. Los síntomas y signos derivados de la irritación de las meninges sin otra evidencia de inflamación o de presencia de lesiones no inflamatorias en las meninges.  
Signo de Kernig: colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar los miembros inferiores del paciente a 90° desde la cadera y luego intentar extenderlos en la rodilla. El signo es positivo si la contracción refleja de los músculos imposibilita la extensión de la rodilla causando resistencia y dolor. El signo de Kernig es bilateral (en contraste con el signo de Lasègue en la ciática).
- ☐ Infarto cerebral.
- ☐ Crisis convulsiva.
- ☐ Diplopía.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Irritación menínea.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Complete el siguiente enunciado:

Las infecciones asociadas con la atención de salud (IAAS) se definen como \_\_\_\_\_localizados o \_\_\_\_\_ que se producen como\_\_\_\_\_ de la permanencia o \_\_\_\_\_de un paciente en una institución de salud que no estaba presente a su \_\_\_\_\_.

- ☐ Procesos, generalizados, consecuencia, ingreso, concurrencia.
- ☐ Procesos, consecuencia, generalizados, concurrencia, ingreso.
- ☐ Procesos, generalizados, concurrencia, consecuencia, ingreso.
- ☒ Procesos, generalizados, consecuencia, concurrencia, ingreso. ✔ Las IAAS se definen como procesos localizados o generalizados que se producen como consecuencia de la permanencia o concurrencia de un paciente en una institución de salud, y que no estaba presente a su ingreso. Se estima que en promedio afectan a un 5% de los pacientes internados en los hospitales de pacientes agudos.  
Las IAAS se consideran como uno de los mejores indicadores de la calidad de atención en salud debido a que en su mayoría están asociadas con la atención directa de pacientes, particularmente al uso de procedimientos invasivos, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos. Su ocurrencia se relaciona con conocimientos y prácticas de atención del equipo de salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Procesos, generalizados, consecuencia, concurrencia, ingreso.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el plan de egreso que entrega el profesional de enfermería a la púérpera, explica sobre la importancia que tiene el mantener al recién nacido con un gorrito en la cabeza para evitar la pérdida de calor. ¿Qué mecanismo de termorregulación está indicando para prevenir el enfriamiento?

- ☐ Radiación.
- ☐ Conducción.
- ☒ Evaporación. ✔ Evaporación se produce cuando las superficies húmedas se exponen al aire, la pérdida de calor asume la forma de vapor de agua, por tal razón es importante mantenerlo siempre con un gorrito al recién nacido.
- ☐ Convección.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evaporación.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente con antecedentes de diabetes, acude al hospital por presentar niveles de glicemia elevados, además indica vómito y dolor abdominal; durante el examen físico se identifica hipotensión, bradicardia, respiraciones profundas, regulares y aumentadas. ¿Cuál es la alteración del patrón respiratorio que presenta el paciente?

- ☐ Respiración atáxica.
- ☐ Respiración de Biot.
- ☐ Respiración de Cheyne-Stokes.
- ☒ Respiración de Kussmaul. ✓ La respuesta es correcta porque la respiración de Kussmaul es anormalmente profunda, regular y con frecuencia aumentada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Respiración de Kussmaul.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el área de Pediatría, usted educa a los padres que es recomendable e ideal que los niños tengan de 12 a 15 horas de sueño. ¿A qué grupo de edad se refieren las horas recomendadas de sueño?

- ☐ 3 - 5 años.
- ☐ 0 - 3 meses.
- ☒ 4 - 11 meses. ✓ La opción de respuesta es correcta. Se recomienda que idealmente, los niños de 4 - 11 meses, tengan de 12 a 15 horas de sueño.
- ☐ 1 - 2 años.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 4 - 11 meses.

#### Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al experimentar con dos antipsicóticos nuevos en pacientes diagnosticados de esquizofrenia, con la finalidad de identificar el más eficaz y seguro, se trabaja con tres grupos de individuos de instituciones diferentes. Los individuos del primer grupo experimental (antipsicóticos 1), se encuentran internados en un hospital psiquiátrico; los del segundo grupo experimental (antipsicóticos 2), son tratados en otro hospital; y, los del grupo de control son pacientes de una tercera institución. ¿Qué tipo de estudio se está utilizando para este caso?

- ☐ Estudios pre experimentales.
- ☐ Estudios experimentales de campo.
- ☐ Estudios experimentales de laboratorio.
- ☒ Estudios cuasiexperimentales.  Esta opción de respuesta es la correcta porque en estos se manipulan deliberadamente al menos una variable independiente, para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Estudios cuasiexperimentales.

#### Pregunta 41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted, como enfermero líder, ha detectado un problema que afecta la atención a un paciente en su servicio por fallas o deficiencias en el logro de objetivos. Para controlarlo, debe aplicar la herramienta de supervisión a través de un informe de enfermería especial. ¿A qué informe se refiere?

- ☐ Cuantitativo.
- ☐ Cualitativo.
- ☒ Provocado.  Esta respuesta es correcta porque los informes provocados son aquellos que se realizan cuando existen desviaciones en el logro de objetivos o metas. Las fallas o deficiencias requieren ser examinadas y por lo mismo, se precisa de información especial.
- ☐ De control.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Provocado.

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Florence Nightingale, indica que, dentro de los principios bioéticos, los profesionales de enfermería deben “abstenerse de todo lo que sea perjudicial o maligno y de tomar o administrar drogas sabiendo que puedan ser nocivas a la salud”. ¿A qué principio bioético se refiere?

- ☐ Principio de autonomía.
- ☐ Principio de beneficencia.
- ☐ Principio de justicia.
- ☒ Principio de No maleficencia.  Es correcto por se le reconoce como el principio hipocrático, y por ello el más antiguo: lo primero es no dañar, evitar el daño a los pacientes, abstenerse de realizar intencionalmente acciones que puedan producir daño, además de entender la obligación de extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos. Y en un párrafo del juramento de Florence Nightingale se encuentra esta referencia: “Me abstendré de todo lo que sea perjudicial o maligno y de tomar o administrar a sabiendas drogas que puedan ser nocivas a la salud”.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Principio de No maleficencia.

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A las mujeres que se realizan una cesárea bajo anestesia regional, requieren de una sonda vesical. ¿Cuál de las siguientes razones fundamenta esta intervención de enfermería?

- ☐ Facilitar la toma de muestra para cultivo de orina.
- ☒ Evitar el exceso de distensión de la vejiga.  El bloqueo anestésico interfiere con la función normal de la vejiga. La vejiga distendida daría lugar a un accidente quirúrgico.
- ☐ Favorecer la contractilidad uterina.
- ☐ Medir diuresis cada una hora.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evitar el exceso de distensión de la vejiga.

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 24 años, ingresa a centro obstétrico del hospital, da a luz a su primogénito, recién nacido a término, vigoroso, con llanto fuerte y con un buen tono muscular (APGAR 10/10). Usted como profesional en enfermería. ¿Qué cuidados debe recibir este niño?

- ☒ Cuidado esencial inmediato.  Un recién nacido a término vigoroso es aquel que está llorando y con buen tono muscular. Este niño debe recibir cuidado esencial inmediato.
- ☐ Aplicarle el test de Apgar.
- ☐ Realizarle un examen rápido.
- ☐ Contacto piel a piel con la madre.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuidado esencial inmediato.

Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la preparación del paciente para un Electroencefalograma (EEG), usted como profesional de enfermería debe realizar las siguientes intervenciones, EXCEPTO:

- ☒ Interrumpir la medicación anticonvulsivante.  Los agentes anticonvulsivos, tranquilizantes, estimulantes y depresores deben interrumpirse 24 a 48 horas antes de un EEG debido a que estos medicamentos pueden alterar los patrones de ondas del EEG u ocultar los patrones de onda anormales de los trastornos convulsivos.
- ☐ Suspender bebidas estimulantes previo al examen.
- ☐ Privar al paciente del sueño la noche anterior.
- ☐ Mantener el cabello limpio y seco.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Interrumpir la medicación anticonvulsivante.

Pregunta 46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale los hallazgos de gravedad o afectación de órgano blanco en una embarazada que presenta preeclampsia:

1. Trombocitopenia.
2. Septicemia.
3. Enzimas hepáticas elevadas.
4. Hemólisis.
5. Implantación baja de placenta.

- ☒ 1, 3, 4
- Segun la guía clínica Trastornos hipertensivos de la embarazada los Criterios de gravedad y/o afectación de órgano blanco en preeclampsia:
- 4 Recuento de plaquetas Trombocitopenia ( $< 100\,000 / \mu\text{L}$ )
- Función hepática: Elevación anormal de enzimas hepáticas (el doble de lo normal) y/o dolor severo en el cuadrante superior derecho del abdomen o a nivel epigástrico que no cede a la medicación y que no se explica con otro diagnóstico
- Función renal Insuficiencia renal progresiva: concentraciones séricas de creatinina mayor ( $>$ ) a 1.1 mg/dL o el doble de las concentraciones séricas de creatinina basales en ausencia de enfermedad renal.
- Hemólisis: anemia hemolítica.
- Integridad neurológica: Afectación visual (visión borrosa, escotomas, diplopía, fotofobia, etc.) y/o neurológica (hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, agitación psicomotriz, alteraciones sensoriales, confusión, etc.) de novo.
- ☐ 1, 3, 5
- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 2, 4, 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 4

Pregunta 47

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente de 80 años fallece durante su turno, como profesional de enfermería debe proporcionar cuidados postmortem. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es la más adecuada al realizar este procedimiento?

- ☐ Mantener las sondas y catéteres que se encuentren en el cadáver.
- ☒ Colocar el cuerpo Para proporcionar los cuidados postmortem, se coloca al cadáver en decúbito supino, con los brazos a lo largo del cuerpo. Esta posición facilita el proceso de preparación del cadáver, incluyendo el cierre de los orificios.
- ☐ Colocar el cuerpo en decúbito prono.
- ☐ Preguntar a los familiares su deseo de realizar autopsia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Colocar el cuerpo en decúbito supino.

Pregunta 48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, seleccione las especificaciones técnicas del brazalete que se recomienda:

1. Fabricados en polipropileno, antialérgicos e inocuos para el paciente.
2. Rígido, con bordes bien acentuados.
3. Cierre de fácil manipulación.
4. Rotulado con cualquier tipo de tinta.
5. Resistente a la tensión y ruptura en cualquier dirección.
6. Imposibilidad de reutilización tras la rotura del cierre de seguridad.

- ☒ 1, 5, 6 Entre las especificaciones técnicas recomendadas para los brazaletes de identificación se encuentran: Fabricados en polipropileno, antialérgico (libre de látex) e inocuos para el paciente. Resistente a la tensión y ruptura en cualquier dirección. Imposibilidad de reutilización tras la rotura del cierre de seguridad.
- ☐ 2, 4, 6
- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 1, 3, 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 5, 6

Pregunta 49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como profesional de enfermería en el área de urgencias, atiende a un paciente con problemas respiratorios, la prescripción indica administrar oxígeno por cánula nasal 2 litros por minuto. ¿Qué concentración de FIO<sub>2</sub> está administrando con el volumen y dispositivo del caso?

- ☐ 40%
- ☒ 28% La concentración de FIO<sub>2</sub> del 28% se consigue administrando 2 litros de oxígeno por minuto por cánula nasal.
- ☐ 24%
- ☐ 32%

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 28%

### Pregunta 50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Primigesta con inicio de labor de parto a término, ingresa a emergencia; luego de una valoración minuciosa, monitoreo fetal y tacto vaginal en donde el cérvix tiene un 40% de borramiento y 2 cm de dilatación, se decide retorno a su domicilio, con una próxima valoración. ¿Cuál de los siguientes criterios se toma en cuenta para el retorno de la paciente al domicilio?

- ☒ Menos de 3 cm de dilatación, sin dinámica uterina, borramiento de menos del 50%. ✔ Es lo correcto porque se debe ofrecer apoyo individualizado a las embarazadas, que estén en edad gestacional completa y que no están en fase activa de parto; sin poseer algún antecedente importante; se da la probabilidad de retornar al domicilio y regresar a revaloración, conjuntamente con su familiar o acompañante.
- ☐ Que tenga una patología de base materna.
- ☐ Que acuda desde el área rural, con difícil acceso al servicio de atención.
- ☐ Que tenga historial de multiparidad y/o partos rápidos.

#### Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Menos de 3 cm de dilatación, sin dinámica uterina, borramiento de menos del 50%.

### Pregunta 51

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo?

- ☐ Marco referencial, marco conceptual, marco legal, marco ético.
- ☐ Diseño, métodos, instrumentos, población.
- ☒ Objetivos, preguntas directrices, justificación y viabilidad. ✔ Esta opción de respuesta es la correcta porque el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo, consta de cinco elementos: 1) objetivos de investigación, 2) preguntas de investigación, 3) justificación de la investigación, 4) viabilidad de la investigación, y 5) evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema.
- ☐ Discusión, análisis, conclusiones, recomendaciones.

#### Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Objetivos, preguntas directrices, justificación y viabilidad.

Pregunta 52

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Ordene la secuencia fisiopatológica en el choque hipovolémico:

1. Disminución de la perfusión tisular.
2. Disminución del gasto cardíaco.
3. Disminución del volumen sanguíneo.
4. Reducción del retorno venoso.
5. Disminución del volumen latido.

- ☐ 4, 3, 2, 1, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5, 2, 1
- ☒ 2, **×** La secuencia fisiopatológica de acontecimientos en el estado de choque hipovolémico se inicia con la disminución del volumen sanguíneo que produce la reducción de sangre venosa que regresa al corazón y provoca disminución del llenado ventricular. Al disminuir el llenado ventricular se genera una reducción del volumen latido y por tanto la disminución del gasto cardíaco. Cuando el gasto cardíaco disminuye, los tejidos no pueden perfundirse de manera adecuada.
- 1

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 3, 4, 5, 2, 1

Pregunta 53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué grupo corresponde el método anticonceptivo conocido como Billings?

- ☒ Naturales. **✓** El método anticonceptivo de Billings también llamado método del moco cervical, es un método en el que la mujer conoce su ciclo menstrual y sus períodos fértil e infértil. Este método corresponde al grupo de métodos naturales.
- ☐ Mecánicos.
- ☐ Hormonales.
- ☐ Quirúrgicos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Naturales.

Pregunta 54

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al valorar el pulso a un paciente, usted percibe que el mismo es irregular y a cada pulsación fuerte le sigue una débil. ¿Qué alteración del pulso presenta este paciente?

- ☐ Pulso alternante.
- ☐ Pulso bigeminado.
- ☒ Pulso intermitente. ✖ El pulso intermitente se caracteriza por un ritmo normal y períodos irregulares.
- ☐ Pulso paradójico.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Pulso alternante.

Pregunta 55

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante su práctica habitual debe iniciar el proceso enfermero para el cuidado de un paciente, establecer prioridades, elaborar objetivos y determinar los cuidados de enfermería. ¿Cuál es la etapa del proceso de atención de enfermería que hace referencia el enunciado?

- ☐ Diagnóstico.
- ☐ Valoración.
- ☒ Planeación. ✔ Esta opción de respuesta es correcta porque el paso de planeación es considerado la tercera etapa del proceso de enfermería y es la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar, evitar, reducir o corregir las respuestas de la persona. Consiste en: establecer prioridades, elaborar objetivos, determinar los cuidados de enfermería y documentar el plan de cuidados.
- ☐ Ejecución.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Planeación.

Pregunta 56

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Complete el enunciado:

Cuando las manos estén visiblemente sucias, la técnica de lavado tiene una duración mínima de \_\_\_\_ a \_\_\_\_ segundos y sigue \_\_\_\_ pasos estandarizados.

- ☐ 20 - 30 - 8
- ☒ 40 - 60 - 11 ✓ El lavado de manos con agua y jabón debe durar entre 40 a 60 segundos, y tiene 11 pasos estandarizados.
- ☐ 40 - 60 - 8
- ☐ 20 - 30 - 11

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 40 - 60 - 11

Pregunta 57

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la respuesta correcta con relación a las actividades que NO se debe realizar en la primera etapa del parto:

- ☒ Rasure rutinariamente el área genital. ✓ La respuesta es correcta porque según lo que indica el componente materno en su página 158 no se debe rasurar solo cortar el vello púbico porque puede aumentar la transmisión del VIH y la Hepatitis B; además, el crecimiento del vello provoca molestias.
- ☐ Permita la ingesta de líquidos azucarados.
- ☐ Permita la libertad de movimientos.
- ☐ Brinde tranquilidad y apoyo emocional continuo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Rasure rutinariamente el área genital.

Pregunta 58

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Ordene en forma secuencial los cuidados de enfermería a un recién nacido que está recibiendo nutrición enteral por sonda nasogástrica.

1. Posición del recién nacido.
2. Lavado de manos.
3. Prevención de exclusión de la sonda.
4. Higiene Oral.
5. Manejo de la fórmula enteral en caso de no contar con leche materna.

- ☐ 2, 1, 4, 5, 3
- ☒ 2, 4, 1, 5, 3 ✗ La secuencia de los cuidados de enfermería a un recién nacido que está recibiendo nutrición enteral por sonda nasogástrica.
- ☐ 1, 3, 4, 2, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 2, 1, 4, 5, 3

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los parámetros que evalúa el Test de Apgar son:

- ☐ Forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, forma del pezón, textura de la piel y pliegues plantares.
- ☒ Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, color de la piel e irritabilidad refleja. ✓ El test de Apgar sirve para realizar una primera valoración física sistemática del recién nacido, de modo metódico, rápido y simple. La prueba evalúa 5 parámetros que se puntúan de 0 a 2 y después se suman. La puntuación máxima es de 10 y la mínima de 0.
- ☐ Comportamiento, prominencia de cejas, saturación de oxígeno mínimo y frecuencia cardíaca máxima.
- ☐ Aleteo nasal, quejido espiratorio, tiraje intercostal, retracción esternal y disociación toraco- abdominal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, color de la piel e irritabilidad refleja.

Pregunta 60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente femenino de 38 años acude al centro de salud para control de peso y talla. Se determina un IMC de 32 kg/m<sup>2</sup>. ¿Cómo clasifica su estado nutricional de acuerdo con la tabla de la Organización Mundial de la Salud?

- ☐ Normal.
- ☒ Obesidad I. Según la tabla de la OMS del índice de masa corporal la paciente manifiesta obesidad grado I ya que se encuentra dentro del rango respectivo 30 a 34.9 kg/m<sup>2</sup>.
- ☐ Sobrepeso.
- ☐ Obesidad II.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Obesidad I.

Pregunta 61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los componentes del Modelo de Atención Integral y Comunitario e Intercultural MAIS - FCI?

- ☐ Atención individual, familiar, a la comunidad y al ambiente.
- ☒ Provisión de servicios, organización, gestión y financiamiento. ✓ Los componentes del MAIS-FCI hacen viable la operación y desarrollo del mismo y son los siguientes:
  - Componente de Provisión de Servicios.
  - Componente de Organización.
  - Componente de Gestión.
  - Componente Financiamiento.La coherencia entre estos componentes y una actuación coordinada y sinérgica de los actores que forman el SNS, en torno a las necesidades de salud de las personas, sus familias y la comunidad permite el logro de los objetivos del Modelo de Atención en Salud Familiar, Comunitario e Intercultural.
- ☐ Niñez, adolescencia, adultos/as y adulto mayor.
- ☐ La universalidad, integralidad, equidad y continuidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Provisión de servicios, organización, gestión y financiamiento.

Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ingresa al servicio de quemados un paciente con lesiones térmicas producida por el derrame de líquido caliente según refiere. En la valoración, se identifica una quemadura de tercer grado en tórax anterior y posterior con una superficie corporal quemada del 36%. ¿Cuál es la principal intervención de enfermería en este caso?

- ☒ Vigilar la reanimación de líquidos y control de gasto urinario.  Vigilar la reanimación de líquidos y control de gasto urinario: Se deben administrar líquidos para la reanimación de los quemados. La determinación de la presión arterial puede ser difícil de obtener y puede no ser fiable en pacientes con lesiones por quemaduras severas, pero, en ausencia de diuresis osmótica (por ejemplo, glucosuria), la medición horaria del gasto urinario es un parámetro confiable para evaluar el volumen sanguíneo circulante. Es por esto que se debe colocar una sonda vesical (Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2013).
- ☐ Valorar el nivel de conciencia y control de signos de alarma.
- ☐ Controlar la gasometría arterial y monitorización cardíaca.
- ☐ Establecer una vía aérea y la ventilación del paciente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Vigilar la reanimación de líquidos y control de gasto urinario.

Pregunta 63

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En la unidad de salud donde usted ha sido asignada/o, el reporte de consultas le indica alta incidencia de riesgo de desnutrición infantil. ¿Con qué criterio se debería realizar la planificación de visitas domiciliarias?

- ☐ Demográfico.
- ☐ Epidemiológico.
- ☐ Administrativo.
- ☒ Socioeconómico.  Criterio socioeconómico: se le confiere prioridad a los grupos familiares clasificados dentro de los estratos de mayor pobreza y pobreza extrema (quintiles 1 y 2).

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Epidemiológico.

Pregunta 64

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La verificación de seguridad quirúrgica es una de las funciones del enfermero circulante. ¿En qué momentos debe realizarse esta verificación?

- ☐ Cuando el enfermero circulante disponga de tiempo para poder realizar la verificación.
- ☐ Antes de que el paciente entre al quirófano, antes de iniciar la preparación del campo quirúrgico y antes de que el paciente se recupere de la anestesia.
- ☐ Antes de realizar la incisión cutánea, antes de que el paciente se recupere de la anestesia y antes de que el paciente se traslade a recuperación.
- ☒ Antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano. ✓ Existen tres momentos o tiempos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el chequeo de la Lista de Verificación de la Seguridad Quirúrgica. Estos son: antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano.

Pregunta 65

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Usted debe preparar una charla educativa a una población de adolescentes sobre Salud Sexual, orientándolos a tomar decisiones adecuadas y responsables. ¿Cuál es el enfoque, según el Plan de Salud Sexual y Salud Reproductiva del MSP, que se pone de manifiesto en este caso?

- ☐ Enfoque inter-generacional.
- ☐ Enfoque de interculturalidad.
- ☐ Enfoque de inclusión social.
- ☒ Enfoque de género. ✗ El enfoque de género es reconocido en el marco constitucional de derechos y obligaciones del país y se entiende como el conjunto de mecanismos y herramientas que inciden en los planes y programas, en las leyes, acciones públicas, en los bienes y servicios tendientes a eliminar las inequidades entre los géneros. El enfoque de género en el PNSSSR, permite tener una mejor comprensión de la realidad y de las vivencias, necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, ubicando como un problema central a la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sus causas y efectos en la salud.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Enfoque inter-generacional.

Pregunta 66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente varón de 70 años ingresado en el hospital con diagnóstico de enfermedad cerebro vascular, al momento presenta disfagia severa. El equipo médico decide implementar alimentación enteral para asegurar la nutrición adecuada del paciente. ¿Qué sonda es la más adecuada para este caso?

- ☐ Sonda nasoyeyunal.
- ☒ Sonda por gastrostomía.  Este tipo de sonda evita la necesidad de pasar por el tracto gastrointestinal superior, que en este caso está comprometido debido a la disfagia severa. La gastrostomía es un procedimiento en el que se crea una abertura en el estómago, en este caso para colocar una sonda de alimentación. Esta sonda permite una administración eficaz y segura de la alimentación enteral a largo plazo.
- ☐ Sonda por yeyunostomía.
- ☐ Sonda nasogástrica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sonda por gastrostomía.

Pregunta 67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La muerte materna es uno de los problemas de salud más relevantes, el Plan Integral de Salud considera los siguientes factores más influyentes, identifique y señale:

- a. Es la muerte de una mujer embarazada.
- b. Aproximadamente 4 de cada 10 embarazos son planificados.
- c. Si existe peligro en la mujer puede ser evitado.
- d. Es un principal indicador de la condición de salud de la mujer.
- e. Se produce con mayor frecuencia en mujeres del sector rural.
- f. Cuando las vías de acceso son deficientes.

- ☐ b, c, e, f
- ☐ a, c, e, d
- ☒ a, d, e, f  Según el Plan Integral de Salud la morbi-mortalidad materna depende de algunos factores que disminuyen el acceder a un sitio y atención adecuada de Salud. (Página 23, 24).
- ☐ a, c, d, f

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: a, d, e, f

Pregunta 68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique los signos y síntomas del desprendimiento placentario.

- a. Dolor en areolas.
- b. Reaparición de las contracciones.
- c. Cambia la forma del útero disminuye su tamaño.
- d. Amenorrea.
- e. Salida de volumen moderado de sangre por genitales.
- f. El cordón protruye por fuera de los genitales.

☐ b, c, d, e

☐ a, d, e, f

☒ b, c, e, f Los signos y síntomas de desprendimiento placentario son evidentes al momento de realizar examen ginecológico reaparición de contracciones, cambio en la forma del útero, salida de volumen moderado de sangre por los genitales, hay protrusión del cordón por fuera de los genitales.

☐ a, b, c, d

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: b, c, e, f

Pregunta 69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la visita domiciliaria a un niño de 2 años 2 meses, el profesional de enfermería solicita a la madre la libreta integral de salud del niño, en la revisión del documento se verifica que el niño ha recibido las siguientes vacunas: a los 2 meses BCG, primeras dosis de rotavirus, pentavalente, neumococo y fipV; a los 4 meses las segundas dosis de rotavirus, pentavalente, neumococo, fipV y a los 6 meses terceras dosis de pentavalente, neumococo bOPV, también ha recibido a los 24 meses la dosis de vacuna SRP1. ¿Qué vacunas corresponde administrar al niño?

☐ Pentavalente, neumococo, BCG.

☒ Refuerzos de bOPV, DPT, SRP2, FA. Esta opción de respuesta SI corresponde: Según el Manual de Vacunas para enfermedades Inmunoprevenibles. MSP 2019, la administración al momento de los Refuerzos de bOPV, DPT, SRP2, FA., corresponden a la edad del niño según el esquema vigente y con a referencia en el carnet de vacunación.

☐ Terceras dosis de bOPV, DPT, SRP1.

☐ Pentavalente, SR, Rotavirus.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Refuerzos de bOPV, DPT, SRP2, FA.

### Pregunta 70

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una paciente de 70 años es atendida en emergencia por fractura de cadera. Se identifica que la paciente tiene deterioro de la movilidad, muestra signos de ansiedad y presenta dolor. Durante la valoración de enfermería. ¿Cuál es la prioridad de la valoración en este caso?

- ☒ Evaluar la movilidad y el dolor en la cadera.  En este caso, la fractura de cadera es la afección principal y una fuente significativa de dolor e inmovilidad para la paciente. Por lo tanto, la prioridad en la valoración de enfermería es evaluar la movilidad y el dolor en la cadera. Es esencial determinar el grado de limitación en la movilidad y la intensidad del dolor para establecer un plan de cuidados adecuado y proporcionar alivio del dolor. La evaluación del dolor incluye características del dolor, ubicación, intensidad, factores desencadenantes y medidas tomadas para aliviarlo.
- ☐ Evaluar el nivel de ansiedad de la paciente.
- ☐ Evaluar la función respiratoria de la paciente.
- ☐ Evaluar la temperatura corporal de la paciente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evaluar la movilidad y el dolor en la cadera.

### Pregunta 71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 15 años, de sexo femenino con discapacidad intelectual, es atendida en la sala de Emergencias por sospecha de violencia sexual. ¿Qué indicador de sospecha corresponde a las manifestaciones directas?

- ☐ Cuerpo extraño en vejiga, uretra, vagina o ano.
- ☒ Hemorragias o inflamación en áreas genital, anal y uretral.  Las manifestaciones directas, sugiere el análisis clínico más profundo: traumatismos, hematomas, heridas en área genital, anal, uretral, o en área perineal, desfloración, desgarramiento himeneal reciente o antiguo, reborde posterior himeneal, con desgarramientos y adherencias, fusión irregular de labios en traumatismos sexuales antiguos. Por lo tanto, esta opción de respuesta es correcta.
- ☐ Dificultad para caminar o sentarse, para la micción, defecación, disuria, dolor o prurito génito-anal.
- ☐ Con conducta pseudomadura o provocativa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hemorragias o inflamación en áreas genital, anal y uretral.

Pregunta 72

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El profesional enfermero del centro de salud debe identificar cuáles son las prestaciones de promoción de la salud, de acuerdo con ciclos de vida para el primer nivel de atención para adultos jóvenes de 20 a 64 años. ¿Cuáles son estas prestaciones de promoción de la salud?

- ☐ Educación y determinación de riesgos biológicos, socioeconómicos y ambientales.
- ☒ Atención de salud, planificación familiar, discapacidades, malnutrición y salud mental. ✗ Corresponden a algunas de las prestaciones de prevención.
- ☐ Atención a patologías más frecuentes y cuidados paliativos en etapa terminal.
- ☐ Psico rehabilitación basados en la comunidad, discapacidades y ayudas técnicas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Educación y determinación de riesgos biológicos, socioeconómicos y ambientales.

Pregunta 73

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente masculino de 60 años se encuentra hospitalizado. Durante el encuentro enfermera-paciente este refiere que no puede conciliar el sueño por las noches, con dificultad para volver a dormirse; sin embargo, en el día duerme siestas excesivas. ¿Cuál es el sistema que se encuentra alterado en este caso?

- ☐ Sistema urinario.
- ☐ Sistema gastrointestinal.
- ☐ Sistema musculoesquelético.
- ☒ Sistema neurológico. ✔ Esta respuesta es correcta, las alteraciones del ciclo sueño – vigilia corresponden al sistema neurológico. “Los ancianos frecuentemente informan de alteraciones en la calidad y cantidad del sueño, dificultad para quedarse dormidos, dificultad para volverse a dormir”.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sistema neurológico.

#### Pregunta 74

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, acude a la consulta de Medicina Interna por presentar: dificultad respiratoria, edema de miembros inferiores y oliguria. Para su diagnóstico, el médico le solicita exámenes de laboratorio donde se evidencia los siguientes datos: Na 135 mEq/L; K 3.5 mEq/L, Crea 1.8 mg/dL, Nitrógeno Ureico 10 mg/dl, Ca 9.0 mg/dl. ¿Cuál es el dato de laboratorio que se encuentra alterado en el paciente?

- ☐ Potasio.
- ☒ Creatinina.  La creatinina mide la eficacia de la función renal, la creatinina es el producto final del metabolismo energético de los músculos. En condiciones de funcionamiento normal, la concentración de creatinina es regulada y excretada por los riñones su valor normal es de 0,6-1,2 mg/dL.
- ☐ Nitrógeno Ureico.
- ☐ Sodio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Creatinina.

#### Pregunta 75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 57 años hospitalizada en el servicio de ginecología por metrorragia disfuncional. Durante el examen especular, se observa un sangrado vaginal moderado, sin identificarse lesiones cervicales visibles. ¿Cuál es la técnica correcta para el aseo perineal?

- ☐ Limpiar los labios mayores de abajo hacia arriba, desde el periné hacia el recto.
- ☐ Limpiar los labios mayores de arriba hacia abajo, desde el recto hacia el periné.
- ☐ Limpiar los labios mayores de abajo hacia arriba, desde el recto hacia el periné.
- ☒ Limpiar los labios mayores de arriba hacia abajo, desde el periné hacia el recto.  El cuidado perineal es fundamental para mantener una adecuada higiene de los genitales externos de la paciente y la piel profunda, los pliegues de la piel pueden acumular secreciones corporales que potencialmente albergan microorganismos; es importante realizar la limpieza de delante hacia atrás con el fin de reducir las posibilidades de transmitir microorganismos fecales al meato urinario. De esta manera, se promueve una higiene efectiva y se previene la propagación de posibles infecciones; el uso de las bolas de algodón utilizando una parte diferente en cada pasada evita la contaminación cruzada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Limpiar los labios mayores de arriba hacia abajo, desde el periné hacia el recto.

Pregunta 76

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes factores patológicos está relacionado con un pronóstico favorable en el cáncer mamario?

- ☒ Tumor no invasivo mayor de 1 cm. ✗ Para que se considere factor patológico con pronóstico favorable en el cáncer mamario, el tumor debe ser no invasivo o invasivo menor de 1 cm.
- ☐ Tumor bien diferenciado.
- ☐ Ganglios linfáticos axilares positivos.
- ☐ Invasión vascular o linfática.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tumor bien diferenciado.

Pregunta 77

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El ESAMyN es la Normativa Sanitaria para la Certificación de Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño, se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal a través de: la atención adecuada a la gestante, el parto humanizado, y el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna, consta de cuatro componentes y 24 pasos. ¿Cuál de los pasos corresponde al componente (B)?

- ☐ Capacitar y dar a conocer la norma en el establecimiento de salud.
- ☐ Permitir el acompañamiento por una persona de elección de la madre antes, durante y después del parto.
- ☐ Garantizar un ambiente acogedor y el respeto de práctica interculturales.
- ☒ Captar y controlar a madres embarazadas y asegurar el tratamiento de las mujeres en riesgo. ✔ Respuesta correcta: Forma parte de unos de los pasos del componente (B) que corresponde a la atención prenatal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Captar y controlar a madres embarazadas y asegurar el tratamiento de las mujeres en riesgo.

Pregunta 78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la guía de Atención del trabajo de parto, parto y posparto inmediato, el Ministerio de Salud Pública ha indicado que se debe restringir el número de tactos vaginales a:

- ☒ 1 cada 4 horas hasta el término de la labor. ✔ Según la guía de Atención del trabajo de parto, parto y posparto inmediato, el Ministerio de Salud Pública ha indicado que se debe restringir el número de tactos vaginales a 1 cada 4 horas, y este debe ser realizado por la persona de mayor experiencia que se encuentre en el servicio.
- ☐ Preferible no hacer más de 1 tacto durante la labor de parto.
- ☐ Cada 2 horas mientras está en fase de dilatación y luego a discreción del médico.
- ☐ 1 cada hora hasta que la dilatación sea 6cm de dilatación, luego 1 cada media hora hasta que se encuentre con 10 cm de dilatación y 100% de borramiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1 cada 4 horas hasta el término de la labor.

Pregunta 79

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El control es definido como la etapa final del proceso administrativo, en el cual se aprecia el resultado de la ejecución de los planes. Para realizar el control, es necesaria la aplicación de sistemas, métodos y técnicas de control. Una técnica de control son los informes, algunos se realizan cuando existen desviaciones en el logro de objetivos o metas. Las fallas o deficiencias requieren ser examinadas y se precisa de información especial. ¿Cuál es el tipo de informe descrito?

- ☐ Informes provocados.
- ☒ Informes de control. ✘ Los informes de control son aquellos que se realizan en forma rutinaria y previamente programada para medir los avances o para comparar el logro de metas en espacio y tiempo determinado.
- ☐ Informes cuantitativos.
- ☐ Informes cualitativos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Informes provocados.

Pregunta 80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer múltipara (3 hijos anteriores) de 36 años acudió al primer nivel de una comunidad rural, tras referir dolores con un parto eutócico espontáneo sin complicaciones madre y neonato fueron dados de alta al cumplir las 24 horas de nacido sin novedad. Transcurrido 36 horas los profesionales de la salud planifican el control en su domicilio. ¿A qué tiempo corresponde el primer control del binomio madre e hijo?

- ☒ Corresponde entre los dos y tres días de vida o 24 a 48 horas del alta. ✔ Los nacimientos ocurridos en la comunidad, en el primer nivel de atención o se haya dado de alta al recién nacido antes de las 48 horas de vida en cualquier nivel de salud de atención se considera de riesgo por lo que el control se realizará entre los dos y tres días de vida o 24 a 48 horas del alta de forma intramural o extramural.
- ☐ Corresponde controles mensuales los primeros ocho meses de vida.
- ☐ Corresponde del tercer al quinto día o 48 a 72 horas después del alta.
- ☐ Corresponde desde el cuarto día hasta los 28 días de nacimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Corresponde entre los dos y tres días de vida o 24 a 48 horas del alta.

Pregunta 81

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando el MAIS-FCI, orienta el accionar integrado de los actores del Sistema Nacional de Salud hacia la garantía de los derechos en salud y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, al mejorar las condiciones de vida y salud de la población ecuatoriana, bajo los principios de la Estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada. ¿A qué se está refiriendo?

- ☐ Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud.
- ☐ Objetivos estratégicos para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud.
- ☒ Propósito ✔ El propósito del MAIS-FCI es orientar el accionar integrado de los actores del Sistema Nacional de Salud hacia la garantía de los derechos en salud y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo al mejorar las condiciones de vida y salud de la población ecuatoriana a través de la implementación del Modelo Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) bajo los principios de la Estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada, y transformar el enfoque médico biológico, hacia un enfoque integral en salud centrado en el cuidado y recuperación de la salud individual, familiar, comunitaria como un derecho humano.
- ☐ Principios del Modelo de Atención Integral de Salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Propósito del Modelo de Atención Integral de Salud.

Pregunta 82

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el centro de salud donde usted trabaja, acude una señora con sus familiares, quienes indican que están preocupados porque en las últimas semanas han observado que a su madre le dificulta bañarse, vestirse y caminar. Para la valoración de Enfermería debe utilizar una escala que le permita evaluar la condición del paciente. ¿Cuál es la escala que mide esas acciones?

- ☐ Escala Yesavage.
- ☐ Escala Guijón.
- ☒ Escala Katz. La escala de Katz ha demostrado ser útil para describir el nivel funcional de pacientes y poblaciones, a seguir su evolución y valorar la respuesta al tratamiento. La escala de Katz es de utilidad para establecer el impacto de la alteración cognitiva sobre la vida cotidiana. Por lo tanto, la opción de respuesta es correcta.
- ☐ Escala Pfeiffer.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Escala Katz.

Pregunta 83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Madre lleva a su hijo de 2 meses al centro de salud, la madre refiere que hace 6 horas, el niño vomita todo lo que come y hace 4 horas no toma el seno. La madre informa haber observado movimientos anormales en todo el cuerpo del niño con una duración de menos de un minuto; Usted observa al niño, el niño no responde esta inconsciente. Ordene. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en este caso según el AIEPI clínico 2017?

1. Referir urgentemente al hospital aplicando medidas de estabilización.
  2. Completar de inmediato la evaluación y examen físico y administrar medicamentos indicados antes de referir.
  3. Si esta convulsionando administrar diazepam intrarectal.
- ☐ 3, 2, 1
  - ☒ 2, 3, 1 Según el AIEPI clínico 2017, el niño entre 2 meses a 5 años, debe recibir atención urgente si presenta signos de peligro en general como: no puede beber o tomar el seno, vomita todo lo que ingiere, presenta convulsiones y está letárgico o inconsciente. Esta condición se clasifica como enfermedad muy grave, se decide y trata de la siguiente manera: completar la evaluación y examen físico, si convulsiona administrar diazepam y referir urgentemente al hospital aplicando medidas de estabilización.
  - ☐ 1, 3, 2
  - ☐ 3, 1, 2

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2, 3, 1

Pregunta 84

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según prescripción médica le piden administrar Morfina 10 mg intravenoso. Ordene los cuidados de enfermería que se debe tomar en cuenta en la administración.

1. Diluir el medicamento antes de la administración.
2. Controlar el patrón respiratorio.
3. Valorar la acción analgésica del fármaco.
4. Controlar la velocidad en la administración del fármaco.
5. Controlar náuseas y vómitos por efectos adversos.

- ☒ 2,  Los efectos adversos en la administración de opioides son: depresión respiratoria y sedación es el efecto adverso más serio de los analgésicos opioides que se administran por vía intravenosa. En las precauciones y contraindicaciones de administrar analgésicos es necesario obtener antecedentes de hipersensibilidad al medicamento, cuando la administración del medicamento es por vía intravenosa es necesario diluir los medicamentos, pero es incorrecta por las opciones 3, 4, 5.
- ☐ 1, 2, 3, 5, 4
- ☐ 2, 1, 4, 5, 3
- ☐ 3, 4, 5, 1, 2

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 2, 1, 4, 5, 3

Pregunta 85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione las alteraciones de la frecuencia respiratoria con sus características.

| Alteraciones     | Características                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hiperpnea     | a. Aumento gradual seguido de una disminución gradual con periodo de apnea.                |
| 2. Cheyne-Stokes | b. Respiraciones de igual profundidad seguidas por un periodo de apnea.                    |
| 3. Biot          | c. Movimientos respiratorios rápidos y profundos. Se produce por alteraciones metabólicas. |

- ☒ 1c, 2a, 3b  Hiperpnea: Movimientos respiratorios rápidos y profundos con una frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Se produce por alteraciones metabólicas, ansiedad, ejercicio y alteraciones del SNC.  
Cheyne-Stokes: Aumento gradual seguido de una disminución gradual de la profundidad de las respiraciones y luego un periodo de apnea.  
Biot: Respiraciones de igual profundidad seguidas por un periodo de apnea.
- ☐ 1c, 2b, 3a
- ☐ 1a, 2b, 3c
- ☐ 1b, 2c, 3a

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1c, 2a, 3b

Pregunta 86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al centro de salud donde usted labora acude una madre con su hijo de 2 meses de edad para la vacunación. Al revisar la libreta integral del niño, se evidencia que se le han administrado las vacunas BCG y HB cero al momento del nacimiento. ¿Cuál esquema le corresponde administrar al niño?

- ☐ Rotavirus, SRP, Hexavalente.
- ☐ Fiebre Amarilla, Neumococo, Hexavalente.
- ☐ Varicela, Neumococo, Hexavalente.
- ☒ Rotavirus, Neumococo, Hexavalente. ✔ Esta respuesta es correcta porque este esquema incluye todas las vacunas recomendadas para un niño de 2 meses de edad según el esquema nacional de vacunación. La vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra el Neumococo y la vacuna Hexavalente deben administrarse a los 2 meses de edad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Rotavirus, Neumococo, Hexavalente.

Pregunta 87

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se integra la promoción de la salud en una estrategia de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles?

- ☒ Aumento de la publicidad del Ministerio de Salud Pública, como estrategia principal para modificar los comportamientos individuales que resultan en enfermedades crónicas. ✘ Esta estrategia desconoce las necesidades reales en el territorio y es una forma general de producir un comportamiento.
- ☐ Participación de los actores clave y la comunidad en la planificación, implementación y evaluación de programas e iniciativas.
- ☐ Fortalecimiento de los servicios de rehabilitación para discapacidades resultantes de las enfermedades crónicas no transmisibles.
- ☐ Ampliación de los horarios en centros especializados para atención a pacientes con patologías crónicas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Participación de los actores clave y la comunidad en la planificación, implementación y evaluación de programas e iniciativas.

Pregunta 88

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, seleccione las que corresponden a las necesidades básicas de salud descritas por Virginia Henderson, utilizadas en la valoración de enfermería:

1. Eliminación de desechos del organismo.
2. Sexualidad reproducción.
3. Participar en actividades recreativas.
4. Valores y creencias.
5. Tolerancia al estrés.
6. Evitar los peligros del entorno.

- ☒ 1, 3, 6 Las necesidades de salud descritas por Virginia Henderson, utilizadas en la valoración de enfermería son: Respirar normalmente; comer y beber en forma adecuada; eliminar los desechos del organismo; moverse y mantener una postura adecuada; dormir y descansar; elegir la ropa adecuada; mantener la temperatura corporal normal; mantener la higiene corporal y proteger el sistema tegumentario; evitar los peligros del entorno y evitar hacer daño a los demás; comunicarse con otras personas; practicar su religión y actuar con apego a la propia fe; trabajar para sentirse realizado; participar en actividades recreativas; aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conducen a un desarrollo normal de salud.
- ☐ 2, 4, 5
- ☐ 2, 5, 6
- ☐ 1, 3, 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 6

Pregunta 89

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes acciones a seguir en la identificación de un sintomático respiratorio. ¿Cuál de ellas NO corresponde?

- ☐ Detectar al sintomático respiratorio en forma permanente durante todo el horario de atención.
- ☐ Observar a través del envase la calidad y cantidad de la muestra obtenida.
- ☒ Conservar las muestras en una caja de cartón, protegidas de la luz solar o calor excesivo. ✓ El personal de salud debe conservar las muestras en una caja metálica, protegidas de la luz solar o calor excesivo hasta el momento del envío al laboratorio.
- ☐ Obtener dos muestras de esputo en 24 horas, siendo una de ellas matutina.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conservar las muestras en una caja de cartón, protegidas de la luz solar o calor excesivo.

Pregunta 90

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Paciente de 54 años ingresa al servicio de Emergencia por presencia de parches y manchas de color púrpura en la piel y en las membranas mucosas, incluso el revestimiento de la boca en el hemograma nos indica un recuento de neutrófilos menor de 1 300 microlitros, hemoglobina menor de 8 g/dL y plaquetas por debajo de 30 000 microlitros (pancitopenia). ¿Qué tipo de anemia presenta?

- ☒ Anemia megaloblástica. ✗ Debilidad, apatía, cansancio, confusión; con mayor frecuencia, tienen parestesias en los miembros (en especial, entumecimiento y hormigueos en pies y piernas). Presentan una lengua lisa, dolorida y roja, así como diarrea leve.
- ☐ Anemia aplásica.
- ☐ Anemia ferropénica.
- ☐ Poliglobulia o policitemia vera.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Anemia aplásica.

Pregunta 91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente acude al centro de salud en labor de parto, el profesional de enfermería le informa sus derechos sobre el parto en libre posición; la parturienta escoge dar a luz en posición vertical. Seleccione las ventajas del parto vertical que informará a la madre:

1. Las fuerzas de gravedad favorecen el encaje y descenso fetal.
2. Menor riesgo de pérdida de sangre intraparto y hemorragias post parto.
3. Ausencia de compresión de grandes vasos.
4. Favorece la revisión médica.
5. Mejor equilibrio ácido-base fetal tanto en el período dilatante como en el expulsivo.
6. Proporciona beneficios psicoafectivos y disminuye el dolor.

- ☐ 2, 3, 5, 6
- ☒ 1, 3, 5, 6 ✔ Las ventajas del parto en posición de sedestación (vertical) que informa a la madre en labor de parto son:  
Que las fuerzas de gravedad favorecen el encaje y descenso fetal.  
Hay ausencia de compresión de grandes vasos.  
Existe un mejor equilibrio ácido-base fetal tanto en el período dilatante como en el expulsivo y proporciona beneficios psicoafectivos y disminuye el dolor.
- ☐ 2, 4, 5, 6
- ☐ 1, 3, 4, 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 5, 6

Pregunta 92

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione las manifestaciones clínicas y cambios en el electrocardiograma del infarto agudo de miocardio.

1. Dolor torácico de inicio súbito.
2. Edema en extremidades inferiores.
3. Elevación del segmento ST.
4. Disnea paroxística nocturna.
5. Elevación de la onda T.
6. Piel húmeda, diaforética y pálida.

☐ 1, 3, 6

☐ 2, 5, 6

☐ 2, 4, 5

☒ 1, 3, 4 ✖ La disnea paroxística nocturna es una manifestación clínica de la insuficiencia cardiaca.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 3, 6

Pregunta 93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la ejecución de una técnica educativa grupal, debe aplicar el aprendizaje de tipo colaborativo y conjunto. Identifique las características de este aprendizaje:

1. Relación de interdependencia.
2. Destrezas son asumidas.
3. Responsabilidad compartida.
4. Trabajo con grupos homogéneos.
5. Fortalece el trabajo individual.
6. Trabajo de grupos heterogéneos.

☐ 2, 4, 5

☐ 2, 3, 5

☒ 1, 3, 6 El aprendizaje colaborativo es una estrategia educativa basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando los participantes desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas. El aprendizaje colaborativo se caracteriza por:

1. El aprendizaje en grupos cooperativos se basa en una fuerte relación de interdependencia entre los diferentes miembros que los conforman, de manera que el alcance final de las metas concierna a todos los miembros.
3. En el aprendizaje colaborativo, todo los miembros tienen su parte de responsabilidad en la ejecución de las acciones dentro del grupo.
6. La formación de grupos en el aprendizaje colaborativo, es heterogénea en cuanto a habilidad y características de los miembros.

☐ 1, 2, 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 6

Pregunta 94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 28 años, portadora de una sonda de alimentación gástrica, con diagnóstico de VIH hace 5 años, ha enfrentado dificultades para mantener una alimentación adecuada, lo cual ha resultado en pérdida de 5 kilos de peso en menos de un mes. ¿Cuál es el tipo de fórmula para la nutrición enteral adecuado en este caso?

- ☐ Fórmula modular.
- ☒ Fórmula especializada. ✔ La fórmula especializada es la más completa para administrar en este caso, porque está diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de enfermedades concretas, como la infección por VIH y enfermedades hepáticas o pulmonares, con el objetivo de proporcionar beneficios terapéuticos y nutricionales.
- ☐ Fórmula polimérica.
- ☐ Fórmula elemental.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fórmula especializada.

Pregunta 95

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación al sistema de conducción cardíaco (sistema eléctrico del corazón). Ordene la secuencia del impulso eléctrico:

1. Nódulo auriculoventricular (AV).
2. Nódulo sinoauricular (SA).
3. Fibras de Purkinje.
4. Haz de His.

- ☐ 4, 1, 2, 3
- ☒ 2, 1, 4, 3 ✔ El impulso se genera en el nódulo sinoauricular (SA), se conducen hasta el nódulo auriculoventricular (AV), el haz de His, hasta alcanzar las estructuras terminales del sistema de conducción que se denominan fibras de Purkinje.
- ☐ 3, 2, 1, 4
- ☐ 1, 2, 3, 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2, 1, 4, 3

Pregunta 96

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El líder de enfermería del servicio en que usted labora se destaca por su constante preocupación por el estado de salud de los pacientes del servicio; además, se puede observar que está pendiente del bienestar de todos los miembros del equipo de trabajo. ¿Qué valor esencial se pone de manifiesto en esta situación?

- ☐ Autonomía.
- ☐ Integridad.
- ☐ Justicia social.
- ☒ Altruismo. ✓ Esta respuesta es correcta porque en la práctica profesional de enfermería, el altruismo se refleja en la preocupación del profesional por el bienestar de los pacientes, otros profesionales y demás proveedores de cuidados de salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Altruismo.

Pregunta 97

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 45 años acude al centro de salud. Refiere al profesional de enfermería que ha perdido su trabajo recientemente, que su esposa le ha pedido el divorcio, que tiene dificultad para conciliar el sueño y cambios en el apetito. Sus antecedentes familiares revelan que su padre se suicidó a los 53 años. ¿Qué variables debe evaluar el profesional de enfermería?

- ☐ Espirituales.
- ☐ De percepción de funcionamiento.
- ☐ Socioeconómicas.
- ☒ Emocionales. ✓ Esta respuesta es correcta porque el grado de estrés del paciente, la depresión o el miedo pueden influir en las creencias y prácticas de salud. La manera en que una persona maneja el estrés a lo largo de cada fase de su vida influye en la manera en que reacciona a la enfermedad. Este paciente presenta síntomas de depresión como la dificultad para conciliar el sueño y cambios en el apetito.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Emocionales.

Pregunta 98

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 33 años acude al área de inyectología para aplicarse una dosis intramuscular de benzetacil 2.400.000 UI por prescripción médica y diagnóstico de faringoamigdalitis. El profesional de enfermería delega la función al interno de enfermería. ¿En qué sitio debe administrar el fármaco?

- ☐ Músculo glúteo mayor, que descansa sobre el glúteo menor.
- ☐ Músculo glúteo menor, que descansa sobre el glúteo mayor.
- ☐ Músculo glúteo menor, que descansa sobre el glúteo medio.
- ☒ Músculo glúteo mediano, que descansa sobre el glúteo menor. ✔ Se divide el glúteo en cuatro cuadrantes con líneas imaginarias y se procede a colocar en el cuadrante superior externo espacio anatómico denominado cuadrante de valquemi.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Músculo glúteo mediano, que descansa sobre el glúteo menor.

Pregunta 99

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al realizar la auscultación pulmonar escucha un ruido áspero, rechinante, superficial durante la inspiración y la espiración y que no desaparece con la tos. Seleccione el ruido respiratorio adventicio que indica el caso.

- ☐ Roce pleural.
- ☐ Roncus.
- ☐ Estertores crepitantes.
- ☒ Sibilancias. ✘ Respuesta incorrecta:  
Las sibilancias son ruidos musicales, continuos, agudos, crujientes. Se oyen mejor durante la espiración. No suelen modificarse con la tos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Roce pleural.

Pregunta 100

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para disminuir el riesgo de transmisión de la tuberculosis, se recomienda que todos los establecimientos de salud dispongan de medidas administrativas, ambientales y de protección personal. ¿Cuál es una medida de control administrativo?

- ☐ Minimizar el uso de procedimientos que induzcan la tos en los afectados de TB.
- ☒ Promover el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis.  Una de las medidas de control administrativo orientadas a disminuir la transmisión de TB es promover el tratamiento ambulatorio de la TB. Una de las formas más eficaces para disminuir el riesgo de transmisión intrahospitalaria es evitar en lo posible la hospitalización.
- ☐ Recoger la muestra de esputo en ambientes con luz y ventilación natural.
- ☐ Ventilación adecuada que permita el flujo natural de aire.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Promover el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis.