

Comenzado el jueves, 28 de mayo de 2026, 20:15

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 28 de mayo de 2026, 21:21

Tiempo empleado 1 hora 6 minutos

Calificación 76,00 de 100,00

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un paciente ingresa al servicio de emergencia con traumatismo múltiple. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería en orden de prioridad?

1. Controlar la ventilación y respiración.
2. Establecer vía aérea y control de columna cervical.
3. Valorar déficit neurológico.
4. Controlar circulación y hemorragia.
5. Exposición con control de temperatura.

☐ 2, 1, 4, 3, 5

☐ 5, 2, 3, 4, 1

☒ 4, **✗** Es incorrecto, antes de valorar las lesiones de cabeza y cuello se debe establecer el control de la vía aérea, controlar la hemorragia y prevenir el choque hipovolémico.

1, La permeabilidad de la vía aérea debe priorizarse, pues su obstrucción aguda es una urgencia médica que pone en peligro la vida, al provocar hipoxia progresiva, hipercapnia, paro respiratorio y cardiaco. Después de la permeabilidad de la vía

2, aérea debe controlarse la hemorragia externa mediante presión directa sobre el área hemorrágica, al realizar esta

3, maniobra estaremos evitando la aparición de choque hipovolémico por pérdida aguda de sangre. Al tener control de la vía aérea y el control de la hemorragia se realiza la valoración de posibles lesiones en la cabeza y cuello, se entablillan las fracturas y se realiza una valoración más completa del paciente.

☐ 3, 1, 2, 5, 4

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 2, 1, 4, 3, 5

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones elija aquellas que incluyen los indicadores donde se establecen las horas necesarias de atención de Enfermería:

1. Indicadores para calcular el personal de enfermería necesario según categorías de tratamiento.
2. Indicadores por servicios médicos.
3. Indicadores por preparación profesional y división médica.
4. Indicadores para suplencias.
5. Indicadores por turno de trabajo.
6. Indicadores por sistema de organización.

- ☒ 1, 2 Estos dos indicadores establecen las horas necesarias de atención de enfermería por paciente en las 24 horas; el uno toma en cuenta la complejidad del cuidado como son: cuidados mínimos, cuidados parciales, atención directa, cuidado intensivo intermedio, cuidado intensivo.
El otro toma en cuenta los servicios médicos: Cirugía (hospitalización), Medicina Interna, Gineco-obstetricia, pediatría, prematuros, terapia Intensiva, Urgencias, Unidad quirúrgica, Central de esterilización.
- ☐ 5, 6
- ☐ 3, 5
- ☐ 4, 6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 2

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El profesional de enfermería se encuentra brindando una charla sobre "Autocuidado", al finalizar hace una retroalimentación con todos los participantes. ¿A qué hace referencia esta parte de la comunicación?

- ☐ La información transmitida.
- ☐ La comunicación analógica.
- ☒ La interpretación continua de respuestas del emisor y del receptor. Esta respuesta es correcta porque el dar la respuesta en el momento permite que la información sea dada oportunamente, y luego de cada exposición hacer una referencia corta de lo mencionado, enfatizando los puntos más relevantes.
- ☐ El entorno en el que tiene lugar la comunicación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La interpretación continua de respuestas del emisor y del receptor.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El personal de enfermería que labora en un centro de salud de atención primaria, realiza visitas domiciliarias a María de 14 años, la cual se encuentra en estado de gestación, esto ha desencadenado conflictos familiares. El personal de enfermería ha analizado los objetivos de la visita y detectado dificultades que ponen en riesgo el bienestar de la adolescente. Por tanto, requieren replanificar los cuidados y modificar los objetivos. ¿Qué etapa de la visita domiciliaria describe este caso?

- ☐ Valoración.
- ☐ Preparación.
- ☒ Evaluación. ✓ Es correcta porque la evaluación, sirve para continuar o modificar la planificación de los cuidados, detectar las dificultades, revisar los objetivos y planificar otros nuevos.
- ☐ Presentación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evaluación.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Paciente varón de 50 años se encuentra en el período postoperatorio después de someterse a una cirugía abdominal para extirpar un tumor. Durante la evaluación postoperatoria, el paciente presenta sintomatología que sugiere atelectasia, además de dolor en el área quirúrgica. ¿Cuál es la intervención de enfermería más adecuada para la atención al paciente postoperatorio?

- ☒ Percusión ✗ Esta respuesta es incorrecta por que la percusión torácica ayuda a detectar la presencia de líquido o aire anormales en los pulmones. También determina la excursión diafragmática, y en el caso se aplicaría si fuera necesario pero no es la más adecuada como se indica en la pregunta.
- ☐ Drenaje postural.
- ☐ Espirometría incentivada.
- ☐ Aspiración.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Espirometría incentivada.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione los factores modificables de riesgo obstétrico, en el control prenatal:

1. Exposición a solventes y pesticidas.
2. Hemorragia del primer trimestre.
3. Inadecuado soporte familiar y de la pareja.
4. Gestante con Rh negativo.
5. Incompetencia cervical.
6. Historia de abuso sexual, físico y emocional.

- ☒ 1, 3, 6 La respuesta es correcta porque según la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud del Ecuador los factores modificables de riesgo obstétrico, en el control prenatal, entre otros, son: Exposición a solventes y pesticidas, inadecuado soporte familiar y de la pareja, historia de abuso sexual, físico y emocional.
- ☐ 2, 4, 5
- ☐ 2, 4, 6
- ☐ 1, 3, 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 6

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente femenina con signos de hipoperfusión para su manejo requiere la administración de hemoderivados. Previo al tratamiento de infusión, el personal de enfermería omite la verificación cruzada por la demanda de pacientes, provocando la muerte del paciente. ¿A qué artículo del Código Orgánico Integral Penal se encuentra directamente vinculado este caso?

- ☐ Art. 141.
- ☐ Art. 144.
- ☒ Art. 146. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
- ☐ Art. 145.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Art. 146.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 33 años quien se encuentra en UCI y recibe terapia hidroelectrolítica como parte de su tratamiento, al analizar el Electrocardiograma usted identifica: incremento de la altura de la onda T, prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS, onda P casi ausente y depresión del segmento ST; al analizar los resultados de electrolitos en sangre encuentra un potasio de 8.5 mEq/L, fosforo de 2.7 mg/dl, Na 140 mEq/dl. ¿Cuál de los siguientes desequilibrios electrolíticos considera que presenta el paciente?

- ☐ Hiponatremia.
- ☒ Hipercalemia.  Es correcta porque la hipercalemia (concentración sérica de potasio mayor de 5 mEq/L [5 mmol/L]) no suele identificarse en los pacientes con función renal normal. La complicación más importante de la hipercalemia es su efecto sobre el miocardio. Los efectos cardíacos de la elevación del potasio en suero no suelen ser relevantes cuando su valor es inferior a 7 mEq/L (7 mmol/L), pero casi siempre se presentan cuando las cifras alcanzan 8 mEq/L (8 mmol/L) o más. Conforme aumentan las concentraciones plasmáticas de potasio, se desarrollan alteraciones de la conducción cardíaca. Los cambios más tempranos, a menudo con concentraciones séricas de potasio mayores de 6 mEq/L (6 mmol/L), son la aparición de ondas T picudas y angostas, depresión del segmento ST y acortamiento del intervalo QT. Si la concentración sérica de potasio sigue aumentando, el intervalo PR se prolonga y le sigue la desaparición de las ondas P. Por último, hay descomposición y ensanchamiento del complejo QRS. Pueden presentarse arritmias ventriculares y paro cardíaco.
- ☐ Hipocalemia.
- ☐ Hipernatremia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hipercalemia.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué tipo de variables se trabaja en una investigación para clasificar el dolor en pacientes posquirúrgicos y establecer una constante de intensidad con ordenamiento jerárquico en subclases, con intervalos graduales o no; como leve, moderado y grave, se entiende que leve es menos intenso que moderado y que grave, sin que se pueda distinguir con claridad la distancia entre cada una de las intensidades del dolor?

- ☐ Variables numéricas continuas.
- ☐ Variables de razón.
- ☒ Variables ordinales.  Esta opción de respuesta es la correcta porque las variables ordinales tienen ordenamiento jerárquico en subclases, con intervalos graduales que pueden ser iguales o no (García García José A., Jiménez Ponce Fiacro, Arnaud Viñas, Ramírez Tapia, & Lino Pérez, 2011).
- ☐ Variables nominales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Variables ordinales.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 48 años que ingresa al servicio de emergencia tras sufrir una lesión encefálica traumática frontal luego de haber recibido un golpe en la cabeza con un bate de béisbol, provocándole una contusión cerebral en el sitio de impacto. ¿Qué mecanismo de lesión cefálica recibió el paciente?

- ☒ Lesión de aceleración.  Respuesta correcta:
La lesión de aceleración ocurre cuando un objeto en movimiento golpea a la cabeza estática.
- ☐ Lesión de desaceleración.
- ☐ Lesión de contragolpe.
- ☐ Lesión rotacional.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Lesión de aceleración.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes herramientas evalúa el funcionamiento de la familia?

- ☐ Mapeo de Actores.
- ☐ Ecomapa.
- ☒ Apgar familiar.  El Apgar familiar mide la funcionalidad de la familia, indica el grado de satisfacción respecto al cumplimiento de cinco parámetros: adaptación, participación, ganancia, afecto y recursos. Este instrumento debe ser contestado por los miembros de la familia, sin intervención del equipo de salud.
- ☐ Familiograma.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Apgar familiar.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted como líder de enfermería del servicio de consulta externa, debe efectuar el cálculo de personal de enfermería para la atención directa a pacientes de este servicio. Teniendo presente que la categoría de tratamiento es de cuidados mínimos. ¿Cuáles son las horas necesarias de atención de enfermería directa en 24 horas de acuerdo a los indicadores por categoría de tratamiento?

- ☐ 5 a 6 horas.
- ☐ 7 a 8 horas.
- ☐ 3 a 4 horas.
- ☒ 1 a 2 horas. ✔ 1 a 2 horas de atención directa de enfermería en 24 horas son necesarias en cuidados mínimos (convalecencia, consulta externa, atención domiciliaria y franca recuperación), de acuerdo con los indicadores por categoría de tratamiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1 a 2 horas.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione la opción de respuesta que complete el siguiente enunciado:

La producción de la hormona _____ se da en la glándula _____, la cual interviene en la eyección de la leche materna.

- ☐ Progesterona, hipófisis.
- ☐ Estrógeno, cuerpo lúteo.
- ☐ Oxitocina, neurohipófisis.
- ☒ Prolactina, ✘ La prolactina es la hormona que se encarga de la producción de la leche no de la eyección de la leche materna. Las glándulas mamarias no son las encargadas de producir oxitocina que es la hormona que eyecta la leche materna.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Oxitocina, neurohipófisis.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El profesional de enfermería del centro de salud al realizar trabajo comunitario ha podido analizar algunos riesgos de salud en los habitantes de la comunidad. Encontró: desnutrición, antecedentes de enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedad crónica en la madre o en el lactante, enfermedades diarreicas y respiratorias frecuentes en el lactante, dificultades o rechazo a la lactancia o alimentación. ¿A qué tipo riesgo de salud se refiere el enunciado?

- ☒ Riesgos Biológicos.  Riesgo Biológico se refiere a la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad en que nos desempeñamos. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Desnutrición, antecedentes de enfermedad prevalentes de la infancia, de enfermedad crónica en la madre o en el lactante, enfermedades diarreicas y respiratorias frecuentes en el lactante, dificultades o rechazo a la lactancia o alimentación.
- ☐ Riesgos en el ciclo de vida.
- ☐ Riesgos socioeconómicos.
- ☐ Riesgos de Prestaciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Riesgos Biológicos.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Paciente de 50 años, se encuentra en recuperación postanestésica luego de una laparotomía exploratoria, con hidratación parenteral, insiste en levantarse para ir al baño. De acuerdo con la escala de riesgo de caída de Morse. ¿Cuál es el riesgo de caída en este paciente?

- ☒ Alto.  Respuesta incorrecta:
Para tener un riesgo alto de caída, el puntaje de la escala debe ser mayor de 50.
- ☐ Medio.
- ☐ Bajo.
- ☐ No tiene riesgo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Medio.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la manifestación clínica tardía de la neumonía bacteriana?

- ☐ Disnea.
- ☐ Fiebre.
- ☒ Cianosis. ✓ En un signo de oxigenación escasa que aparece tardíamente. La cianosis aparece cuando existen al menos 5g/dl de hemoglobina no oxigenada.
- ☐ Tos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cianosis.

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El equipo de atención primaria de una comunidad, realiza un levantamiento del diagnóstico de salud de sus habitantes, en la recopilación de información se evidencian desigualdades socioeconómicas y culturales. Como estrategia se implementa un programa de educación para la salud a fin de desarrollar conciencia social, sociopolítica y económica que influyan positivamente en el proceso de salud-enfermedad. ¿Cuál es el modelo que corresponde en este caso?

- ☐ Modelo persuasivo.
- ☐ Modelo capacitación.
- ☒ Modelo informativo. ✗ El modelo informativo se trata de un estilo preceptivo y autoritario donde la relación profesional usuaria es asimétrica en la educación tradicional. Al considerar el comportamiento individual como factor etiológico de la enfermedad, actúa sobre él, sin considerar los factores socioculturales y ambientales, prioriza la prevención.
- ☐ Modelo radical.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Modelo radical.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 73 años con antecedentes de EPOC, acude a la emergencia por presentar alteraciones del estado de conciencia y dificultad respiratoria, para su manejo se realiza una gasometría arterial donde se reporta una PO₂ en 55mmHg. ¿Cuál es la alteración que presenta el paciente?

- ☐ Hipercapnia.
- ☒ Hipoxemia. ✓ La hipoxemia se define como una disminución de la presión de oxígeno arterial (PaO₂) a menos de 60 mmHg por lo que corresponde con el caso planteado.
- ☐ Hipoxia.
- ☐ Hipocapnia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hipoxemia.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Recién nacido pretérmino de 36SG, sexo masculino, pequeño para la edad gestacional, obtenido mediante parto eutócico, APGAR 8 al minuto, rosado, llanto fuerte. Se lo mantiene en observación con control térmico y luego de 5 horas de vida presenta temblores finos en miembros inferiores, acompañado de taquipnea, uno de los antecedentes maternos, es diabetes gestacional. ¿Qué patología metabólica se relaciona este caso clínico?

- ☒ Hipoglicemia ✓ Es correcta porque esta situación se puede dar por ejemplo en los hijos de madre diabética. - Sin hiperinsulinismo. Asfixia perinatal y policitemia, entre los signos y síntomas están los temblores, apatía, convulsiones, hipotonía, apneas, taquipnea, llanto débil o agudo, letargia, hipotensión y rechazo del alimento.
- ☐ Hipotiroidismo congénito.
- ☐ Hiperglicemia.
- ☐ Hipocalcemia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hipoglicemia.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente ingresa a emergencia producto de un accidente de tránsito, en la evaluación primaria se determina un Glasgow de 10/15, disnea, diaforesis, aleteo nasal, un patrón respiratorio anormal, para su manejo solicitan una gasometría arterial y los resultados encontrados son valores de PO₂ 40mmHg hipoxemia, PaCO₂ de 50 mmHg hipercapnia; por consiguiente, se identifica un deterioro en la ventilación perfusión. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería a la que hace referencia el enunciado?

- ☒ Deterioro del intercambio de gases. ✔ Esta opción es correcta porque el deterioro del intercambio de gases se determina por el exceso o déficit de la oxigenación y/o eliminación de dióxido de carbono en la membrana alvéolo-capilar, las principales características definitorias para esta etiqueta diagnóstica: aleteo nasal, confusión, diaforesis, disminución de dióxido de carbono, hipercapnia, hipoxemia, patrón respiratorio anormal, disnea, gasometría anormal. La condición asociada desequilibrio en la ventilación-perfusión.
- ☐ Patrón respiratorio ineficaz.
- ☐ Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.
- ☐ Deterioro de la ventilación espontánea.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Deterioro del intercambio de gases.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente femenina de 50 años se encuentra hospitalizada por laparotomía exploratoria, presenta herida quirúrgica cubierta con apósito manchado de líquido purulento y de mal olor. A la valoración la herida presenta eritema, rubor y calor local. El profesional enfermero procede a realizar la curación de la herida con técnica aséptica; una vez finalizado el procedimiento se clasifican los desechos. ¿Cuál es la clasificación correcta de los desechos generados?

- ☐ Desechos corto - punzantes.
- ☐ Desechos comunes.
- ☐ Desechos anatomopatológicos.
- ☒ Desecho biológico - infeccioso. ✔ Esta respuesta es correcta ya que todo el material utilizado en la curación de la herida está contaminado de fluido purulento y esta clasificación corresponde a "material de curación, vendas, vendajes, muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico y otros materiales contaminados con sangre o fluidos corporales".

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Desecho biológico - infeccioso.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente de 65 años está recibiendo una transfusión sanguínea debido a una anemia crónica. Durante la transfusión, el paciente presenta escalofríos, fiebre, taquicardia y dolor lumbar. ¿Cuál es la intervención prioritaria que debe realizar el profesional de enfermería?

- ☒ Detener inmediatamente la transfusión sanguínea.  Los signos y síntomas que el paciente presenta durante la transfusión sanguínea (escalofríos, fiebre, taquicardia y dolor lumbar) son indicativos de una reacción transfusional. Las reacciones transfusionales pueden ser graves y potencialmente mortales, por lo que el profesional de enfermería debe detener inmediatamente la transfusión sanguínea para garantizar la seguridad del paciente y prevenir una reacción más grave.
- ☐ Administrar oxígeno.
- ☐ Administrar medicamentos prescritos.
- ☐ Registrar la reacción transfusional en la historia clínica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Detener inmediatamente la transfusión sanguínea.

Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, el primer objetivo es el fin de la pobreza; seleccione las metas de este objetivo:

1. Formulación de políticas donde se creen entornos propicios para generar oportunidades de empleo.
 2. Promover una mejor salud para todos, especialmente para los más vulnerables.
 3. Que todas las personas pueden acceder a los servicios de salud de calidad.
 4. Poner en práctica a nivel nacional sistemas apropiados de protección social para todos.
 5. Elevar la productividad económica mediante la modernización tecnológica y la innovación.
 6. En el sector privado promover oportunidades económicas (microempresas).
- ☐ 2, 3, 5
- ☒ 1, 5, 6  La formulación de políticas puede ayudar a crear un entorno propicio para generar empleo productivo y oportunidades de empleo para los pobres y los marginados. Pueden formular estrategias y políticas fiscales que estimulen el crecimiento económico de los pobres y, por tanto, reducir la pobreza. si corresponde al objetivo 1.
Elevar la productividad económica mediante la modernización tecnológica y la innovación. corresponde al objetivo 8
Trabajo Decente y Crecimiento Económico.
Promover oportunidades económicas para los pobres centrándose en los segmentos de la economía donde trabaja la mayoría de estas personas, a saber, las microempresas y las pequeñas empresas, y las que operan en la economía informal. Si corresponde al objetivo 1.
- ☐ 1, 4, 6
- ☐ 2, 3, 6

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 4, 6

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El proceso físico de transferencia de calor entre un cuerpo sólido (el recién nacido) y un fluido (líquido o gaseoso). ¿A cuál de las siguientes opciones corresponde?

- ☒ Convección.  Para evitar cualquier situación de hipotermia durante el cuidado diario y poder mantener una estabilidad térmica en el recién nacido, es imprescindible conocer los cuatro procesos físicos de pérdida de calor: convección, radiación, evaporación y conducción. La convección es la transferencia de calor entre un cuerpo sólido (el recién nacido) y un fluido (líquido o gaseoso).
- ☐ Radiación.
- ☐ Evaporación.
- ☐ Conducción.

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Convección.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Observe la curva de peso para la edad e identifique el estado nutricional:



- ☒ Normal. ✓ En la interpretación de los puntos graficados en las curvas de peso/edad en niños y niñas menores a cinco años. La mediana desviación estándar cero o puntuaciones Z, está representada por una línea más gruesa. El área comprendida entre las líneas que representan +2 DE y -2 DE corresponde al rango normal.
- ☐ Peso bajo severo.
- ☐ Peso bajo.
- ☐ Peso alto.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Normal.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente con antecedentes de Artritis Reumatoidea diagnosticada hace 2 semanas, acude al centro de salud por presenta dolor a nivel de articulaciones, refiere además quemazón, hormigueo y sensibilidad al frío en sus extremidades inferiores. De acuerdo a la valoración de enfermería. ¿Cuál es el tipo de dolor que presenta el paciente?

- ☒ Dolor somático.  Esta opción de respuesta es correcta porque el dolor nociceptivo (fisiológico), persiste por la activación continua del sistema sensitivo que transmite la percepción de estímulos nocivos; implica la existencia de un daño a los tejidos somáticos o viscerales suficiente como para activar el sistema nociceptivo. Se clasifica en:
Dolor somático: Es el dolor que procede de los huesos, las articulaciones, los músculos, la piel o el tejido conectivo, por lo general es un dolor intenso o punzante y bien localizado
Dolor visceral: Surge de las vísceras, tales como el tracto gastrointestinal y el páncrea
- ☐ Dolor irruptivo.
- ☐ Dolor neuropático.
- ☐ Dolor continuo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dolor somático.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo?

- ☒ Objetivos, preguntas directrices, justificación y viabilidad.  Esta opción de repuesta es la correcta porque el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo, consta de cinco elementos: 1) objetivos de investigación, 2) preguntas de investigación, 3) justificación de la investigación, 4) viabilidad de la investigación, y 5) evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema.
- ☐ Discusión, análisis, conclusiones, recomendaciones.
- ☐ Diseño, métodos, instrumentos, población.
- ☐ Marco referencial, marco conceptual, marco legal, marco ético.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Objetivos, preguntas directrices, justificación y viabilidad.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al atender a un paciente con Síndrome de Compresión Medular secundario a metástasis ósea en la columna vertebral, se administra un opioide para el alivio del dolor, adicionalmente se emplea otro medicamento como analgésico adyuvante. ¿Qué tipo de medicamento puede utilizarse como analgésico adyuvante en este caso?

- ☐ Miorrelajantes.
- ☒ Corticoides.  Los analgésicos adyuvantes son fármacos cuya principal acción no es la analgésica, pero que funcionan como tales en algunos tipos de dolor. En Cuidados Paliativos se utilizan para potenciar el efecto de los analgésicos, habitualmente de los opioides, para disminuir la dosis de los mismos, o en cuadros de dolor complejos

Los corticoides (Dexametasona, metilprednisolona, otros) son ampliamente utilizados en Cuidados Paliativos por su acción antiinflamatoria y tienen como resultado un alivio de síntomas, entre ellos el dolor.

Los corticoides están indicados como analgésicos adyuvantes en: astenia, anorexia, Síndrome de Compresión Medular (SCS), metástasis óseas, aumento de presión intracraneal, obstrucción intestinal.
- ☐ Anticonvulsivantes.
- ☐ Antidepresivos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Corticoides.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente ingresa al hospital por presentar hormigueo en dedos de las manos, pies y región peribucal; el médico solicita exámenes de laboratorio donde se evidencian los siguientes datos: Sodio 140mEq/l; Calcio 6,0mg/dl, Potasio 4,5mEq/L; Magnesio 2,0mg/ dl, Fósforo 4,0mg/d ¿Cuál es el electrolito que se encuentra alterado en este caso?

- ☐ Magnesio.
- ☒ Calcio.  Esta opción de respuesta es correcta porque los valores del Calcio se encuentra en los siguientes rangos: 8,5 – 10,5 mg/dL; de acuerdo al caso, el paciente presente valores inferiores al rango establecido (6,0mg/dL).
- ☐ Sodio.
- ☐ Potasio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Calcio.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la alternativa correcta respecto a la mecánica corporal:

- ☐ Se prefiere levantar los objetos alejándolos de nuestro centro de gravedad.
- ☐ Se recomienda utilizar los músculos pequeños antes que los grandes.
- ☒ Es preferible deslizar un objeto antes que levantarlo. ✔ Cuando levantamos los objetos, los músculos pequeños se agotan, hay mayor riesgo de lesión a nivel de la columna vertebral.
- ☐ Los cambios de posición favorecen la fatiga muscular.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es preferible deslizar un objeto antes que levantarlo.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como profesional de enfermería, es necesario que usted conozca los tipos de prácticas seguras en la atención del paciente - usuario. Las prácticas establecidas son: prácticas seguras administrativas, prácticas seguras asistenciales y prácticas seguras administrativas-asistenciales. ¿Cuál de los siguientes procedimientos pertenecen a las prácticas seguras asistenciales?

- ☒ Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo. ✔ El manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo es una práctica segura asistencial. Todos los medicamentos tienen potencial riesgo de causar algún evento adverso, sin embargo, se pone énfasis en los medicamentos de alto riesgo porque son aquellos que por sus características propias como por ejemplo un margen terapéutico estrecho, pueden causar daño, incluso la muerte, cuando se produce un error en el curso de su administración.
- ☐ Identificación correcta del paciente.
- ☐ Manejo correcto de bombas de infusión.
- ☐ Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ordene las fases de la gestión interna de los desechos sanitarios:

1. Tratamiento interno.
2. Almacenamiento interno o temporal.
3. Almacenamiento final.
4. Generación, almacenamiento primario.
5. Recolección y transporte interno.

☐ 4, 1, 2, 3, 5

☐ 2, 5, 1, 4, 3

☐ 5, 3, 4, 1, 2

☒ 4, 2, 5, 1, 3 ✓ Respuesta correcta:

Las fases de la gestión interna de los desechos sanitarios tienen la siguiente secuencia:

Generación, almacenamiento primario.

Almacenamiento interno o temporal.

Recolección y transporte interno.

Tratamiento interno.

Almacenamiento final.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 4, 2, 5, 1, 3

Pregunta 33

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda:

1. Daño endotelial.
2. Destrucción valvular.
3. Obstrucción venosa.
4. Estasis venosa.
5. Coagulación alterada.
6. Oclusión venosa crónica.

☐ 2, 3, 6

☐ 1, 4, 5

☒ 1, 3, 4 ✗ La obstrucción venosa es una complicación de la trombosis venosa, entre otras.

☐ 2, 5, 6

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 4, 5

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Adolescente masculino de 13 años, acude a cita de control en consulta externa. A la exploración física genital (maduración sexual), presenta vello bien oscuro, grueso, rizado y se extiende sobre el pubis, el escroto con pigmentación oscura, testículo con volumen de 8 a 10 ml con un diámetro de 3.3 a 4 cm, pene con crecimiento en longitud. ¿Cuál de los siguientes es el estadio de Tanner que corresponde?

- ☐ Estadio I
- ☒ Estadio III  En el estadio III durante la evaluación de la maduración sexual con base a los estadios de Tanner el vello es más oscuro, grueso y rizado y se extiende sobre el pubis, escroto con crecimiento y pigmentación oscura, testículos con un volumen de 8 a 10 ml y un diámetro de 3,3 a 4 cm, pene crecimiento en longitud.
- ☐ Estadio IV
- ☐ Estadio II

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Estadio III

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al educar a los padres con respecto al cuidado del Recién Nacido, de evitar colocar la cuna cerca de una ventana abierta, un ventilador o aire acondicionado. ¿A qué mecanismo de prevención de pérdida de calor se está refiriendo?

- ☐ Evaporación.
- ☒ Convección.  Convección: Es la pérdida de calor de las superficies húmedas que se exponen al aire, la pérdida de calor asume la forma de vapor de agua.
- ☐ Conducción.
- ☐ Radiación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Convección.

Pregunta 36

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con relación al infarto agudo del miocardio, señale el enunciado correcto:

- ☐ Un examen específico para su diagnóstico es el ecocardiograma.
- ☐ En la fase temprana suele haber estertores en ambas bases pulmonares.
- ☐ En el electrocardiograma se aprecian ondas Q anormales.

☒ Las manifestaciones clínicas incluyen disnea paroxística nocturna y ortopnea.



Respuesta incorrecta:

La disnea paroxística nocturna y ortopnea, son manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardiaca congestiva.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En el electrocardiograma se aprecian ondas Q anormales.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la ubicación del foco aórtico en la auscultación cardíaca?

- ☐ Cuarto espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo.
- ☐ Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular.
- ☐ Segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo.

☒ Segundo espacio intercostal derecho, borde esternal derecho.



El foco aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal derecho, borde esternal derecho.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Segundo espacio intercostal derecho, borde esternal derecho.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En visita domiciliaria a familia extendida integrada por 15 personas, todas las generaciones han padecido de cáncer, y algunos han muerto por diabetes, viven en condiciones sanitarias inadecuadas y no asisten al centro de salud para el control médico regular. Señale el criterio de selección aplicado en la visita domiciliaria descrita:

- ☐ Demográfico.
- ☐ Administrativo.
- ☐ Socioeconómico.
- ☒ Epidemiológico. ✓ Se clasifica a la familia con base a los riesgos de salud, considerando aspectos del ciclo de vida familiar, factores endémicos y epidémicos de las enfermedades infectocontagiosas, factores de discapacidad e invalidez, enfermedades ocupacionales, necesidades de atención del enfermo terminal y seguimiento en el hogar de pacientes que no requieren hospitalización.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Epidemiológico.

Pregunta 39

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a una investigación con función de temporalidad retrospectiva?

- ☐ El inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados.
- ☐ Se asigna un factor de estudio, el cual es controlado para la realización de la investigación.
- ☐ Cuando el investigador se limita a observar sin intervenir en el suceso.
- ☒ Los datos se obtienen al inicio de la investigación, cuando aún no han aparecido los efectos. ✗ Se trata de un estudio prospectivo cuando los datos se obtienen al inicio de la investigación, aún sin haber aparecido los efectos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione los principios básicos de bioseguridad:

- ☒ Universalidad, uso de barreras, medios de eliminación de material contaminado.  Los principios básicos de Bioseguridad son 3:
Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología.
Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos.
Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo.
- ☐ Uso de barreras, prácticas adecuadas en el trabajo, universalidad.
- ☐ Equipo de seguridad, uso de barreras, medios de eliminación de material contaminado.
- ☐ Prácticas adecuadas en el trabajo, universalidad, eliminación de desechos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Universalidad, uso de barreras, medios de eliminación de material contaminado.

Pregunta 41

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La Organización Mundial de la Salud, ponderó los riesgos y los beneficios para la salud respecto a la prescripción y uso de los métodos anticonceptivos, por lo tanto estableció criterios de elección. ¿A que categoría corresponde una condición en la que, en general, los riesgos teóricos o comprobados superan las ventajas de usar el método?

- ☐ Categoría 1.
- ☒ Categoría 2.  Condición en la que, en general, las ventajas de usar el método superan los riesgos teóricos o comprobados.
- ☐ Categoría 3.
- ☐ Categoría 4.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Categoría 3.

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una paciente de 24 años, acude a consulta externa refiere una semana de retraso del período menstrual, lleva una vida sexual activa y desea descartar la posibilidad de embarazo. ¿Cuál es el examen que usted recomienda realizar a la paciente?

- ☒ Hormona gonadotropina coriónica HCG subunidad B (sangre). ✔ La determinación de HCG en plasma y en orina se utiliza como base para el diagnóstico de embarazo, entre el 96 y 98% de pruebas realizadas con 9 días de amenorrea son útiles respecto a otros métodos.
- ☐ Hormona gonadotropina coriónica HCG subunidad B (orina).
- ☐ Hemograma básico.
- ☐ Ecografía obstétrica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hormona gonadotropina coriónica HCG subunidad B (sangre).

Pregunta 43

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la dosis en la administración de mantenimiento del sulfato de magnesio en la preeclampsia para prevención de eclampsia?

- ☐ 70 ml/h
- ☐ 50 ml/h
- ☐ 90 ml/h
- ☒ 80 ml/h ✘ Riesgo de depresión respiratoria. La cantidad de dilución no es la correcta y el tiempo, volumen que se utiliza en la impregnación del sulfato de magnesio, dilución de 2 ampollas diluido en 100 cc que no corresponde a dosis de mantenimiento.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 50 ml/h

Pregunta 44

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el periodo de ayuno preoperatorio al que debe someterse un niño de 4 meses que recibe lactancia materna?

- ☐ 6 horas.
- ☐ 1 hora.
- ☐ 4 horas.
- ☒ 2 horas. ✖ Es incorrecto, el vaciamiento gástrico de la leche materna en neonatos a término y lactantes no es completo tras un intervalo de 2 h. La leche materna puede ser ingerida hasta 4 h antes de los procedimientos electivos que requieren anestesia general, anestesia regional o sedoanalgesia.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 4 horas.

Pregunta 45

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Paciente de 54 años, acude al servicio de emergencia por presentar tiraje intercostal, fatiga, tos esporádica, malestar general y saturación de O₂ de 80%. ¿Qué etiqueta diagnóstica enfermero se debe priorizar en el caso propuesto?

- ☐ Deterioro de la ventilación espontánea.
- ☒ Patrón respiratorio ✖ Inspiración y/o espiración que no proporciona una ventilación adecuada, esta definición no está acorde a la sintomatología del caso.
- ☐ Disminución del gasto cardíaco.
- ☐ Intolerancia a la actividad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Deterioro de la ventilación espontánea.

Pregunta 46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique el trastorno hemorrágico que se caracteriza por la expulsión de sangre por la boca, precedido de tos y procedente del aparato respiratorio subglótico, pulmones y bronquios principalmente.

- ☐ Melena.
- ☐ Hematemesis.
- ☐ Epistaxis.
- ☒ Hemoptisis.  Definimos la hemoptisis como la expulsión de sangre por la boca mediante la tos, que implica un origen traqueobronquial independientemente de su volumen. Las causas más frecuentes son las infecciosas o inflamatorias, entre las que predominan las asociadas a las bronquitis, la tuberculosis o bronquiectasias. El carcinoma broncogénico también la causa, siendo más frecuente en pacientes mayores de 45 años y fumadores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hemoptisis.

Pregunta 47

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al valorar un paciente con trauma craneoencefálico, usted observa apertura ocular al dolor, al preguntar la fecha le responde de manera confusa y al evaluar la respuesta motora localiza el dolor. De acuerdo a la Escala del Coma de Glasgow, señale la puntuación correspondiente en este caso:

- ☒ 10  Respuesta incorrecta:
Aplicando la Escala del Coma de Glasgow, el paciente en este caso tiene: Respuesta de apertura ocular al dolor (2), respuesta verbal de manera confusa (4) y respuesta motora localizando el dolor (5). Estas puntuaciones suman un total de 11.
- ☐ 11
- ☐ 12
- ☐ 9

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 11

Pregunta 48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el desarrollo histórico de la práctica de la enfermería, la religión ha jugado un papel fundamental. Seleccione la orden religiosa que se ocupó del cuidado de las personas con lepra, sífilis y trastornos crónicos de la piel.

- ☐ Los Caballeros Hospitalarios.
- ☐ Las Diaconisas de Kaiserswerth.

☒ Los Caballeros de San Lázaro. ✔ Respuesta correcta:

Caballeros
de San
Lázaro.

Las cruzadas impulsaron la institución de varias órdenes de caballeros, entre ellos los Caballeros de San Lázaro, quienes se dedicaron al cuidado de las personas con lepra, sífilis y trastornos crónicos de la piel. Lo antes mencionado se convirtió en el objetivo de esta institución caritativa, puesto que los leprosos habían sido excluidos de la sociedad en instituciones conocidas como lazaretos o leprosarios.

- ☐ Los Hermanos Alexianos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los Caballeros de San Lázaro.

Pregunta 49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique dos de los principios bioéticos que forman parte del consentimiento informado:

- ☐ Beneficencia e integralidad.
- ☐ No maleficencia y prioridad.

☒ Autonomía y beneficencia. ✔

El Consentimiento Informado apoya en cumplir con todos los principios: el profesional aporta sus conocimientos científico-técnicos y su experiencia para establecer la indicación adecuada; el paciente autónomo aportará sus valores, sus preferencias y sus creencias. Se respeta la autonomía, se actúa por beneficencia del paciente, evitando prácticas maleficentes y asignando criterios de justicia para la práctica clínica que se propone. Lo que "debe hacerse", resulta de ponderar el respeto a la autonomía, a la beneficencia, en un marco preestablecido por la no-maleficencia y la justicia.

Según el consentimiento informado específicamente la autonomía reconoce la libertad para pensar y actuar siempre que no se vulnere la libertad de otros seres humanos. Indica que se debe poder decidir de acuerdo con los propios valores y preferencias. Por otro lado, la Beneficencia obliga al personal de salud a buscar el mayor bien del enfermo. Pero como ese bien puede ser entendido de diversas formas, sólo debe ser considerado beneficiante lo que el propio enfermo determine como tal.

- ☐ Autonomía y equidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Autonomía y beneficencia.

Pregunta 50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer de 47 años acude a la consulta de ginecología cumpliendo 30 semanas de gestación, refiere cansancio extremo, presenta facies pálidas y se decide realizar una biometría hemática. El profesional en enfermería procede a sacar la muestra sanguínea, al terminar no se percató que el tubo no está tapado correctamente y se derrama sangre en la superficie del piso. ¿Qué acciones se debe tomar para descontaminar el área?

- ☐ Los elementos de aseo utilizados se deben dejar en jabón durante 30 minutos y posterior hay que lavar.
- ☒ Limpiar utilizando papel u otro material absorbente como sustancias gelificantes o solidificantes. ✔ La respuesta es correcta porque para descontaminar derrames de sangre una recomendación de la guía del MSP es "Limpiar utilizando papel u otro material absorbente como sustancias gelificantes o solidificantes el cual será dispuesto luego de su utilización como residuos peligrosos".
- ☐ Colocarse guantes para desinfectar el área afectada, no es necesario utilizar mascarilla o bata.
- ☐ Realizar la limpieza con jabón o detergente en la superficie a ser desinfectada, con el auxilio del paño.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Limpiar utilizando papel u otro material absorbente como sustancias gelificantes o solidificantes.

Pregunta 51

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La preeclampsia incrementa la mortalidad materna y perinatal con un mayor riesgo de eventos potencialmente mortales. Por esta razón se hace necesario la identificación oportuna de los factores de riesgos. ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a factores de riesgo alto para desarrollar preeclampsia?

- ☐ Mujer obesa de 40 años de edad.
- ☐ Mujer con intervalo intergenésico mayor a 10 años e infección de las vías urinarias.
- ☒ Mujer con enfermedad renal crónica y Diabetes Mellitus. ✔ La enfermedad renal crónica y la Diabetes Mellitus constituyen altos factores de riesgo de preeclampsia por el daño vascular que acarrearán estas afecciones, desencadenando isquemia uteroplacentaria. Constituyen además entidades que afectan a los órganos blancos o dianas.
- ☐ Mujer adolescente y primigesta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mujer con enfermedad renal crónica y Diabetes Mellitus.

Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes contraindicaciones para la administración de la vacuna BCG. ¿Cuál de ellas NO corresponde?

- ☒ Recién nacido por cesárea. La aplicación de la BCG no está contraindicada en el recién nacido que ha nacido por cesárea, siempre que esté dentro de los parámetros normales de medidas antropométricas y de salud.
- ☐ Recién nacido con enfermedad infecciosa aguda grave.
- ☐ Recién nacido que tienen inmunidad comprometida por VIH.
- ☐ Recién nacido o prematuros con peso menor 2 500 gr.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Recién nacido por cesárea.

Pregunta 53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con relación a la educación que el profesional de enfermería proporciona al paciente diabético. Señale el enunciado correcto:

- ☐ Tras la administración de insulina de acción rápida el paciente debe de esperar de 30 a 45 minutos para ingerir alimentos.
- ☒ Observar los pies todos los días en busca de cortes, ampollas, manchas rojas y edema. Los cuidados preventivos de los pies se inician con la valoración diaria cuidadosa que debe incluir inspección de eritemas, ampollas, fisuras, ulceraciones, cambios de temperatura y aparición de deformidades.
- ☐ Un mayor consumo de fibras incrementa las cifras de glucosa y hace necesario incrementar la dosis de insulina.
- ☐ Indicarle al paciente insulino dependiente que no debe ingerir alimentos antes de realizar ejercicios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Observar los pies todos los días en busca de cortes, ampollas, manchas rojas y edema.

Pregunta 54

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El trabajo de parto es un proceso mediante el cual, el personal de salud debe tener en consideración aspectos a valorar, la monitorización materno fetal es una de ellas, la monitorización fetal electrónica es un proceso que se realizará en casos específicos. ¿Cuál de las siguientes situaciones se debería realizar?

- a. Presencia de líquido amniótico teñido de meconio.
- b. Madre con diabetes gestacional.
- c. Alteración del latido cardíaco fetal por auscultación.
- d. Fiebre materna.
- e. Madre adolescente.
- f. Uso de oxitocina.

- ☐ b, c, d, f
- ☐ a, c, d, e
- ☒ a, c, d, f El personal profesional de salud debe valorar la monitorización de las pacientes para identificar las complicaciones y así evitar complicaciones en el parto y consiga disminuir la mortalidad materna y fetal. (Página 19).
- ☐ b, d, e, f

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: a, c, d, f

Pregunta 55

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Primigesta de 27 años, en el primer control de embarazo se registra IMC de 24, TA=120/80 mmHg, FC= 72 X', FR=19 X', T°=36.5° C. Acude a control subsecuente con 23 semanas de gestación; en la valoración actual: IMC de 26, TA=150/90 mm Hg, FC= 78 X', FR=18 X', T°= 37°C, proteinuria con tira reactiva ++. ¿Qué trastorno hipertensivo presenta la paciente?

- ☐ Hipertensión gestacional.
- ☐ Preeclampsia grave.
- ☒ Preeclampsia leve. Se considera como preeclampsia leve cuando la TA Sistólica es mayor o igual a 140 mm Hg y menor a 160 mmHg y/o TA Diastólica mayor o igual a 90 mmHg y menor 110 mmHg, más proteinuria y sin criterios de gravedad ni afectación de órgano blanco.
- ☐ Hipertensión crónica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Preeclampsia leve.

Pregunta 56

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un Centro de Salud se va a realizar una encuesta con relación a la atención de Enfermería dirigida a los pacientes para evaluar el grado de satisfacción empleando la escala: Muy satisfecho - Satisfecho - Regular. ¿Qué tipo de variable estamos analizando?

- ☐ Cuantitativa continua.
- ☒ Cualitativa  Esta opción de respuesta es la correcta porque la variable cualitativa ordinal es aquella variable que mantiene un orden de mayor a menor, las categorías indican jerarquía.
- ☐ Cuantitativa discreta.
- ☐ Cualitativa nominal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cualitativa ordinal.

Pregunta 57

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Relacione las intervenciones de enfermería con sus actividades:

Intervenciones	Actividades
1. Dependiente.	a. Valoración de la integridad de la piel.
2. Independiente.	b. Consulta a servicio de asistencia social.
3. Interdependiente.	c. Inicio del tratamiento intravenoso.

- ☐ 1b, 2c, 3a
- ☒ 1b,  La respuesta es incorrecta porque la relación es:
2a, Dependiente: Son aquellas actividades o acciones relacionadas con la puesta en práctica de las intervenciones médicas, son responsabilidad directa del médico. Requiere de una orden o prescripción médica previa para su realización. La responsabilidad del enfermero es administrar el tratamiento prescrito. Ejemplo: la administración de un medicamento.
3c Independiente: Son aquellas actividades o acciones propias de enfermería -autónomas que están legalmente autorizadas, gracias a su formación, capacidad y experiencia práctica.
Interdependiente: Son aquellas actividades o acciones que el enfermero lleva a cabo conjuntamente con otros miembros del equipo de salud.
- ☐ 1a, 2b, 3c
- ☐ 1c, 2a, 3b

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1c, 2a, 3b

Pregunta 58

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La vida moral es una constante elección entre cursos de acción diferentes. En toda elección pueden existir conflictos y los conflictos pueden ser vistos como dilemas o problemas, en donde los dilemas son:

- ☒ La existencia de dos proposiciones alternativas establecidas previamente, que obliga a elegir sólo una de ellas. ✔ Dilema es la existencia de dos proposiciones alternativas establecidas previamente, que obliga a elegir sólo una de ellas.
- ☐ Formulación de teorías morales.
- ☐ Una situación que empuja a dar una respuesta no totalmente conocida previamente.
- ☐ Suele ser el modelo de resolver conflictos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La existencia de dos proposiciones alternativas establecidas previamente, que obliga a elegir sólo una de ellas.

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La atención primaria de salud renovada (APS-R), es una estrategia que orienta el desarrollo de los sistemas de salud. Como profesional de enfermería del primer nivel de atención debe conocer los objetivos establecidos en la APS-R para dar cumplimiento a las políticas de salud del país. ¿Cuál es uno de estos objetivos?

- ☐ Implementar el sistema único de información para fortalecer los procesos de atención.
- ☒ Fortalecer los recursos humanos en materia de salud. ✔ Los objetivos de la APS-R son: Fortalecer los recursos humanos en materia de salud, Facilitar la inclusión social y la equidad en salud, Promover los sistemas de salud basados en APS, Potenciar la promoción de la salud y promover la atención integral e integrada, Fomentar el trabajo intersectorial y sobre los determinantes, Orientar hacia la calidad de atención y seguridad del paciente.
- ☐ Generar condiciones para el desarrollo de una vida saludable.
- ☐ Implementar procesos de rendición de cuentas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fortalecer los recursos humanos en materia de salud.

Pregunta 60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En cuál de las situaciones que se presentan se debe evitar de manera absoluta el uso de tocolíticos para prolongar el embarazo?

- ☐ Restricción de crecimiento fetal, sin alteración de la vitalidad.
- ☒ Hemorragia severa materna. ✔ En toda hemorragia obstétrica severa sea cual fuera la causa se debe interrumpir el embarazo, por lo que el uso de tocolíticos para prolongarlo se evita de manera absoluta.
- ☐ Estado hipertensivo del embarazo no complicado.
- ☐ Rotura prematura de membranas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hemorragia severa materna.

Pregunta 61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Madre acude a la unidad de salud con niño de 2 meses, refiere que hace 2 días presenta un cuadro gripal y un escucha ruidos tipo silbido. En la valoración, se observa tiraje subcostal, respiración rápida y se clasifica como bronquiolitis grave. ¿Cuál es el cuidado en enfermería prioritario para este paciente?

- ☐ Administrar broncodilatador por prescripción.
- ☐ Administrar corticoide por prescripción.
- ☒ Administrar oxigenoterapia. ✔ La bronquiolitis grave está dentro de la clasificación donde el niño necesita una medida de soporte como el oxígeno y referir urgente al hospital según las normas de estabilización y transporte "REFIERA, se encuentra en la clasificación de color rojo.
- ☐ Realizar limpieza nasal con suero fisiológico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Administrar oxigenoterapia.

Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hombre viudo, de 68 años, jubilado hace 3 años, vive solo a pesar de que tiene 3 hijos, todos casados al momento, actualmente se dedica a labores domésticas y asiste al grupo de la pastoral social en la iglesia cercana a su domicilio. ¿En qué etapa del ciclo vital familiar se encuentra?

- ☐ Etapa de formación.
- ☒ Etapa de disolución. ✔ Esta etapa inicia cuando uno de los miembros de la pareja se jubila o muere y termina con la muerte de ambos miembros de la pareja.
- ☐ Etapa de consolidación y apertura.
- ☐ Familia en expansión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Etapa de disolución.

Pregunta 63

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las medidas terapéuticas que realiza el profesional de enfermería están la aplicación de calor y frío. ¿Cuál es un objetivo de la aplicación de frío?

- ☐ Aumentar el metabolismo basal.
- ☐ Aumentar el intercambio de O₂.
- ☐ Aumentar el aporte sanguíneo en la región tratada.
- ☒ Reducir el edema e inflamación. ✔ Al aplicar frío, por vasoconstricción se reduce el flujo sanguíneo a la parte del cuerpo lesionada, impidiendo la formación de edema, reduce la inflamación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Reducir el edema e inflamación.

Pregunta 64

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En visita domiciliaria se valora a niño de 23 meses por presentar palidez generalizada, padres refieren que toma leche de fórmula y que hace 3 meses ha perdido el apetito, se cansa al caminar o correr, no quiere jugar. Al examen físico presenta irritabilidad y taquicardia. Se realiza hemograma completo, obteniendo resultado de hemoglobina de 7 g/dl por lo que es diagnosticado con anemia ferropénica. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones se debe dar a los padres para favorecer la absorción del hierro?

- ☒ Añadir zumo de naranja a la dieta.  El potenciador mejor conocido es la vitamina C (ácido ascórbico), puesto que facilita la absorción de hierro a nivel gastrointestinal y permite una mayor movilización de este mineral desde los depósitos. La naranja es rica en vitamina C.
- ☐ Incrementar el aporte de líquidos.
- ☐ Aumentar los períodos de exposición solar.
- ☐ Cambiar la fórmula de leche empleada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Añadir zumo de naranja a la dieta.

Pregunta 65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el modelo de causalidad, a las acciones u omisiones, incluyendo errores y violaciones, que tienen consecuencias adversas inmediatas, se les denomina:

- ☒ Fallas activas.  Las fallas activas son acciones u omisiones, incluyendo errores y violaciones, que tienen consecuencias adversas inmediatas. Son actos inseguros (errores, manipulación, sabotaje).
- ☐ Fallas inactivas.
- ☐ Fallas recurrentes.
- ☐ Fallas latentes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fallas activas.

Pregunta 66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes técnicas de muestreo, seleccione aquella que se utiliza cuando la población es muy grande y dispersa:

- ☐ Estratificado.
- ☐ Aleatorio sistemático.
- ☒ Conglomerado.  De conglomerados es una técnica de muestreo que se selecciona de manera aleatoria para conseguir que la muestra esté formada por todos los individuos de los conglomerados seleccionados, esta técnica se utiliza cuando la población es muy grande y dispersa.
- ☐ Aleatorio simple.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conglomerado.

Pregunta 67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción correcta con relación a la anemia moderada en el embarazo:

- ☒ Hemoglobina con valores entre 7 - 10 g/dl, Hcto < 21 -  La anemia moderada en la gestante se considera la hemoglobina de 7-10 g/dl y Hcto de 21 a 30%.
- ☐ Hemoglobina con valores menores a 12 g/dl, Hcto < 33% en el embarazo.
- ☐ Hemoglobina con valores 12 g/dl y Hcto 33% en el embarazo.
- ☐ Hemoglobina con valores menores a 7 g/dl, Hcto < 21% en el embarazo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hemoglobina con valores entre 7 - 10 g/dl, Hcto < 21 - 30 % en el embarazo.

Pregunta 68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer de 25 años acude al centro de salud acompañada por su esposo para recibir asesoramiento acerca de la seguridad y efectividad de los métodos anticonceptivos, para optar uno de ellos, necesitan entender cómo funciona el método, cuán efectivo es, cuáles son sus efectos secundarios más probables y qué hacer si se producen tales efectos secundarios; con este conocimiento y comprensión, los usuarios son más capaces de ejercer su derecho a tomar una decisión verdaderamente fundamentada. ¿Cuál grupo de métodos anticonceptivos profundizaría en la consejería?

- ☐ Preservativo masculino, diafragma, espermicidas.
- ☐ Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad.
- ☐ Inyectables, MELA, píldoras, parche, anillo vaginal.
- ☒ Implantes, DIU, esterilización femenina, vasectomía. Los métodos que requieren poca o ninguna acción por parte de los usuarios son los más efectivos. Para comenzar a usar estos 4 métodos se necesita la ayuda de un profesional de la salud, pero luego necesitan poca o ninguna acción por parte de la usuaria o del usuario. Estos métodos son muy efectivos en todas las personas que los utilizan. Menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres en 1 año de uso. Por otro lado, los implantes y los DIU son sumamente efectivos durante 4-5 años o más, mientras que la esterilización femenina y la vasectomía son permanentes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Implantes, DIU, esterilización femenina, vasectomía.

Pregunta 69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador para disminuir la mortalidad materna, ha establecido la estrategia del Score MAMÁ, que es aplicado en todas las unidades públicas para evaluar el riesgo obstétrico. ¿De los siguientes criterios para evaluar el riesgo obstétrico, cuál NO corresponde?

- ☐ Proteinuria.
- ☐ Estado de consciencia.
- ☒ Sangrado. Esta respuesta es correcta porque el sangrado vaginal durante el embarazo ocurre por varios motivos, algunos son graves. Este sangrado puede ocurrir en la primera o a las últimas etapas del embarazo. El sangrado leve es un flujo de sangre más ligero que el del periodo menstrual habitual, el sangrado intenso es un flujo de sangre con la misma o mayor intensidad de flujo de sangre más intenso de un periodo habitual. Este no es un criterio para evaluar el riesgo obstétrico, ni forman parte del Score mamá.
- ☐ Signos vitales completos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sangrado.

Pregunta 70

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Como parte de las medidas de confort en un paciente que se mantiene deambulando. ¿Qué tipo de tendido de cama se debe realizar?

- ☐ Cama cerrada.
- ☐ Cama abierta.
- ☒ Cama ocupada. ✖ Es incorrecto, la cama ocupada se prepara cuando el estado del paciente no le permite pararse de la cama. El tendido de cama se realiza con el paciente acostado.
- ☐ Cama post quirúrgica.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Cama abierta.

Pregunta 71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique el tipo de variable en la cual solo pueden existir dos valores posibles:

- ☐ Intervalo.
- ☐ Ordinal.
- ☐ Razón.
- ☒ Nominal. ✔ La variable nominal, es una variable cualitativa en la que sus opciones de respuesta no tienen un orden de importancia definido ni representan un gradiente; es decir, ninguna posible respuesta es más relevante, buena o mala que otra, aún si se expresan en números. En esta variable solo pueden existir dos valores posibles.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Nominal.

Pregunta 72

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el método de esterilización que utiliza una autoclave?

- ☒ Calor húmedo. ✔ Esta respuesta es correcta porque para esterilizar con calor húmedo (como en el autoclave) se usa vapor a presión porque consigue temperaturas superiores al punto de ebullición.
- ☐ Gas.
- ☐ Óxido de etileno.
- ☐ Radiación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Calor húmedo.

Pregunta 73

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Complete el enunciado:

La _____, se define como un volumen urinario menor de _____. Entre las posibles etiologías de este problema se encuentran: Insuficiencia renal aguda o crónica, _____.

- ☐ Anuria - 500 ml/día - obstrucción completa.
- ☐ Oliguria - 500 ml/día - ingestión inadecuada de líquidos.
- ☒ Anuria - 50 ml/día - infección. ✘ La anuria es la ausencia de producción de orina o producir diuresis en una cantidad inferior a 50 ml/día. La infección no es considerada causa de anuria. La anuria puede ser causada por una insuficiencia o disfunción renal aguda o crónica, una disminución en la presión arterial por debajo de la necesaria para mantener la presión de filtración en el riñón, o una obstrucción completa en los conductos urinarios.
- ☐ Oliguria - 50 ml/día - lesión obstétrica.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Oliguria - 500 ml/día - ingestión inadecuada de líquidos.

Pregunta 74

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 40 años, vive en el sector rural, viaja todos los días al trabajo y decide ir al Hospital General por presentar náusea, vómito, dolor del lado derecho. En la valoración física McBurney positivo, exámenes de laboratorio presenta leucocitosis, ecografía con aumento del diámetro del apéndice. Bajo las normas de admisión es preparado para una apendicectomía. ¿Cuál es el procedimiento de ingreso al sistema de salud?

- ☐ Referencia justificada.
- ☒ Referencia ✖ Es una respuesta incorrecta porque el usuario asistió al servicio de admisión, consulta externa o de emergencia del establecimiento de salud de la misma entidad al que fue referido y es registrado en un sistema informático o manual. En el caso el personal de salud no realiza el ingreso de salud.
- ☐ Referencia no cumplida.
- ☐ Referencia inversa.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Referencia inversa.

Pregunta 75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar la evaluación del adulto mayor, se identifica un deterioro de la memoria a corto y largo plazo, presenta gran esfuerzo para encontrar respuestas a preguntas referentes a su familia y de manera reiterada solicita retroalimentación sobre su trabajo. Señale con qué patología está asociada para gestionar los cuidados enfermeros:

- ☐ Demencia vascular.
- ☒ Demencia. ✔ La demencia senil, es un síndrome mental orgánico que se caracteriza por un deterioro de la memoria a corto y largo plazo, asociado a trastornos del pensamiento abstracto, juicio, funciones corticales superiores y modificaciones de la personalidad.
- ☐ Delirio.
- ☐ Parkinson.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Demencia.

Pregunta 76

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un pequeño porcentaje de las personas a las que se les administra medicación puede tener una respuesta anormal determinada genéticamente. ¿Cómo se denomina a esta respuesta anormal?

- ☐ Efectos colaterales.
- ☐ Reacción alérgica.
- ☐ Reacción tóxica.
- ☒ Idiosincrasia. ✓ Se trata de la respuesta anormal que tiene lugar en un pequeño porcentaje de pacientes expuestos a un fármaco. Las reacciones idiosincrásicas no están relacionadas con los efectos conocidos del fármaco ni tienen naturaleza alérgica. Estas reacciones están determinadas desde el punto de vista genético.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Idiosincrasia.

Pregunta 77

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente de 20 años, acude al centro de salud y es diagnosticado con amigdalitis aguda sin antecedentes personales, el médico prescribe penicilina 1200000 UI. Usted como personal de enfermería realiza la prueba de sensibilidad al medicamento. ¿Qué vía de administración utiliza para realizar esta prueba?

- ☐ Intramuscular.
- ☒ Intradérmica. ✓ Al administrar penicilina por vía intradérmica, se expone directamente a las células del sistema inmunológico en la piel, lo que permite una detección temprana, rápida y controlada de posibles reacciones alérgicas. Una reacción positiva a la prueba provoca una protuberancia roja elevada con picazón, esto indica una alta probabilidad de alergia a la penicilina.
- ☐ Subcutánea.
- ☐ Intravenosa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Intradérmica.

Pregunta 78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las modalidades de atención de los equipos integrales de salud. ¿Cómo se clasifica a la atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados fuera del hospital?

- ☐ Atención intramural o en un establecimiento de salud.
- ☐ Atención extramural o comunitaria.
- ☐ Atención en establecimientos móviles de salud.
- ☒ Atención prehospitalaria. ✔ La atención prehospitalaria se define como un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes y que comprende todos los servicios de salvamento, atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados fuera del hospital.
La atención prehospitalaria debe constituirse en un sistema integrado de servicios médicos de urgencias y no entenderse como un simple servicio de traslado de pacientes en ambulancias, atendidos con preparación mínima.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Atención prehospitalaria.

Pregunta 79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione los cuidados que el paciente necesita para la preparación de la resonancia magnética.

1. Informar al paciente que no debe consumir alimentos durante al menos 1 hora antes del estudio.
2. Después del examen tiene que ingerir abundantes líquidos para eliminar los agentes de contraste.
3. Antes de que ingrese al examen se le indicará que debe retirarse todos los objetos metálicos.
4. Informar al paciente que suspenda los medicamentos con complementos de hierro.
5. Obtener información del paciente sobre antecedentes alérgicos o si tiene insuficiencia renal.

- ☐ 1, 3, 5
- ☐ 2, 4, 5
- ☒ 1, 3, 4 ✔ Respuesta correcta:
Los objetos de metal deben ser retirados del paciente ya que pueden causar quemaduras. Los antecedentes del paciente se obtienen para determinar la presencia de grapas de aneurisma, materiales ortopédicos, marcapasos, válvulas cardíacas artificiales, tales objetos pueden calentarse, funcionar de manera deficiente o absorber energía. Los implantes cocleares se inactivan con la resonancia magnética. Los complementos de hierro pueden interferir con la imagen. Antes de la resonancia magnética, se informa al paciente que no consuma alimentos durante al menos 1 hora antes del estudio.
- ☐ 2, 3, 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 3, 4

Pregunta 80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación al uso de MgSO₄ en el manejo de las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, entre los cuidados de enfermería destacan:

- ☒ Valoración de los niveles séricos de magnesio, neurológica y diuresis. ✔ Por encima de los niveles terapéuticos de sulfato de magnesio (4.8 – 8.4 mg/dL) pueden aparecer signos y síntomas de toxicidad tales como pérdida de los reflejos tendinosos (9 – 12 mg/dL), depresión respiratoria (15 – 20 mg/dL) y colapso cardiovascular (>25 mg/dL).
- ☐ Valoración de las pruebas de laboratorio, DHL, presión arterial y niveles séricos de magnesio.
- ☐ Valoración de los niveles séricos de magnesio, AST, ALT, y microalbuminuria.
- ☐ Valoración de los niveles séricos de magnesio, reflejo patelar y esquistocitosis.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Valoración de los niveles séricos de magnesio, neurológica y diuresis.

Pregunta 81

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante su práctica habitual debe iniciar el proceso enfermero para el cuidado de un paciente, establecer prioridades, elaborar objetivos y determinar los cuidados de enfermería. ¿Cuál es la etapa del proceso de atención de enfermería que hace referencia el enunciado?

- ☒ Planeación. ✔ Esta opción de respuesta es correcta porque el paso de planeación es considerado la tercera etapa del proceso de enfermería y es la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar, evitar, reducir o corregir las respuestas de la persona. Consiste en: establecer prioridades, elaborar objetivos, determinar los cuidados de enfermería y documentar el plan de cuidados.
- ☐ Valoración.
- ☐ Diagnóstico.
- ☐ Ejecución.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Planeación.

Pregunta 82

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo con sus conocimientos. ¿Cuál es la dosis de impregnación del sulfato de magnesio que indica el médico para la prevención de convulsiones en preeclampsia?

- ☐ Sulfato de magnesio 6 gramos intravenoso en 20 minutos.
- ☒ Sulfato de magnesio 4 gramos intravenoso en 20 minutos. ✔ El sulfato de magnesio, catión principalmente intracelular disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular, interviene en numerosas reacciones enzimáticas; es un neuroprotector fetal, produce vasodilatación cerebral disminuyendo la isquemia cerebral. Bloquea el impulso del nervio motor al músculo periférico, tiene acción depresora central y periférica.
- ☐ Sulfato de magnesio 6 gramos en 10 minutos.
- ☐ Sulfato de magnesio 8 gramos intravenoso en 20 minutos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sulfato de magnesio 4 gramos intravenoso en 20 minutos.

Pregunta 83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente que durante su turno presenta deterioro neurológico, al preguntarle su nombre responde con palabras inapropiadas, sus extremidades se mantienen en extensión y a la apertura ocular solo al llamado. De acuerdo a la escala de Glasgow, usted debe reportar al paciente con esta alteración en su estado de conciencia. ¿Cuál es la puntuación que alcanza el paciente?

- ☐ Glasgow 9/15
- ☐ Glasgow 10/15
- ☒ Glasgow 8/15  A la respuesta ocular alcanza una puntuación 3, verbal palabras inapropiadas 3, y se mantiene en extensión 2, lo que alcanza un valor en la escala de Glasgow de 8/15. Por lo tanto, la opción de respuesta es correcta.

Respuesta ocular	4
Espontánea	3
A la voz	2
Al dolor	1
Ausencia de respuesta	
Respuesta verbal	
Orientado	5
Confusa	4
Palabras inapropiadas	3
Sonido Incomprensible	2
Nula	1
Mejor respuesta motora	
Obedece órdenes	6
Localiza el dolor	5
Se retira al dolor	4
Flexión	3
Extensión	2
Nula	1

- ☐ Glasgow 7/15

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Glasgow 8/15

Pregunta 84

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una paciente de 70 años es atendida en emergencia por fractura de cadera. Se identifica que la paciente tiene deterioro de la movilidad, muestra signos de ansiedad y presenta dolor. Durante la valoración de enfermería. ¿Cuál es la prioridad de la valoración en este caso?

- ☐ Evaluar el nivel de ansiedad de la paciente.
- ☐ Evaluar la temperatura corporal de la paciente.
- ☐ Evaluar la función respiratoria de la paciente.
- ☒ Evaluar la movilidad y el dolor en la cadera. ✔ En este caso, la fractura de cadera es la afección principal y una fuente significativa de dolor e inmovilidad para la paciente. Por lo tanto, la prioridad en la valoración de enfermería es evaluar la movilidad y el dolor en la cadera. Es esencial determinar el grado de limitación en la movilidad y la intensidad del dolor para establecer un plan de cuidados adecuado y proporcionar alivio del dolor. La evaluación del dolor incluye características del dolor, ubicación, intensidad, factores desencadenantes y medidas tomadas para aliviarlo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evaluar la movilidad y el dolor en la cadera.

Pregunta 85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente femenina de 48 años con diagnóstico de cáncer de mama, se le está administrando morfina por vía intravenosa. Señale el cuidado de enfermería en este caso.

- ☒ Valorar signos de depresión respiratoria. ✔ La depresión respiratoria se relaciona con los efectos indeseables de los opiáceos. El profesional de enfermería debe valorar los cambios en la respiración tales como respiración superficial y disminución de la frecuencia respiratoria.
- ☐ Observar signos de hipertensión arterial.
- ☐ Valorar la aparición de incontinencia urinaria.
- ☐ Observar la presencia de diarrea.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Valorar signos de depresión respiratoria.

Pregunta 86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La ficha familiar como instrumento esencial del MAIS-FCI, tiene dos objetivos fundamentales. Seleccione la opción que corresponde a uno de estos objetivos:

- ☐ Elaborar el mapa de riesgo.
- ☐ Clasificar las familias según el riesgo.
- ☐ Conocer el perfil epidemiológico.
- ☒ Medir las condiciones de vida. ✓ Los dos objetivos fundamentales de la ficha familiar son:
 - Medir las condiciones de vida.
 - Medir los determinantes sociales de salud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Medir las condiciones de vida.

Pregunta 87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente masculino de 40 años con diagnóstico de cáncer de próstata. Al momento acude a su sexta sesión de quimioterapia ambulatoria y manifiesta que en los últimos días ha presentado fatiga que limita su capacidad para participar en actividades. ¿Qué ámbito del bienestar está afectado?

- ☐ Social.
- ☐ Psicológico.
- ☒ Físico. ✓ Esta respuesta es correcta porque el bienestar físico valora la capacidad funcional fuerza, fatiga sueño y descanso, náusea apetito y estreñimiento. En el caso el paciente refiere fatiga.
- ☐ Espiritual.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Físico.

Pregunta 88

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Paciente de 1 mes, acude con su madre al control de niño sano para valorar su crecimiento y desarrollo. Durante el examen físico se mantiene alerta, activo y sin alteraciones. Como parte de la valoración es necesario tomar signos vitales. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca en esta edad del paciente?

- ☐ 100-190
- ☒ 80-120 ✗ Frecuencia cardiaca en vigilia: edad 3-5 años (80-120 por minuto).
- ☐ 60-100
- ☐ 98-140

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100-190

Pregunta 89

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Paciente de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, acude al hospital por presentar cefalea de moderada intensidad y presión arterial de 170/110mmHg, como causa aparente conflictos familiares. Además, indica dificultad para seguir con el tratamiento prescrito por el médico. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica que priorizaría en el paciente?

- ☐ Gestión ineficaz de la salud.
- ☐ Síndrome de fragilidad del anciano.
- ☒ Mantenimiento ineficaz de la salud. ✗ La etiqueta diagnóstica de mantenimiento ineficaz de la salud se define como la incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener el bienestar. La etiqueta diagnóstica corresponde: Mantenimiento ineficaz de la salud R/C toma de decisiones deteriorada M/P apoyo social insuficiente, ausencia de conductas de adaptación. Por lo tanto, la opción de respuesta es incorrecta.
- ☐ Protección ineficaz.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Gestión ineficaz de la salud.

Pregunta 90

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las definiciones y conceptos básicos de la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal, se aplican diferentes técnicas para el logro de la preparación integral, teórica, física y psico-afectiva con enfoque familiar, comunitario e intercultural. ¿Cómo se define al conjunto de procedimientos organizados para la estimulación de los sensorios fetales que permiten potencializar los sentidos intraútero?

- ☐ Técnicas de relajación.
- ☐ Técnicas de respiración.
- ☒ Técnicas de estimulación prenatal. Las técnicas de estimulación prenatal, se describen como el conjunto de procedimientos organizados para la estimulación de los sensorios fetales que permiten potencializar los sentidos intraútero, optimizando el desarrollo mental y sensorial del futuro bebe; éstas dependerán de la etapa de maduración en la cual se encuentre el feto. Se describen en técnicas táctiles, auditivas, motoras y visuales.
- ☐ Técnicas de vinculación prenatal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Técnicas de estimulación prenatal.

Pregunta 91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la sala de cuidados neonatal a los 5 minutos de nacimiento se le aplica el test de APGAR a un neonato masculino de nacimiento eutócico simple con antecedente perinatal de líquido en las vías respiratorias. A la valoración no se observó acrocianosis ni palidez, con FC mayor a 100 latidos/min, respuesta débil a la estimulación, en semiflexión y con esfuerzo respiratorio irregular. Indique las condiciones de vitalidad del neonato:

- ☐ 3 Puntos: dificultad marcada.
- ☐ 5 Puntos: dificultad moderada.
- ☐ 6 Puntos: dificultad moderada.
- ☒ 7 Puntos: ausencia de dificultades. El test APGAR es una prueba que mide 5 variables, la coloración, frecuencia cardíaca, respiración, reflejos y tonicidad muscular con puntuaciones de 0, 1 y 2 puntos dependiendo del resultado. A la valoración del caso referido en la pregunta se mostró de color normal (2), con FC mayor a 100 latidos/min (2), respuesta débil a la estimulación (1), sin movimiento activo (1) y sin respiración fuerte (1), lo que lo sitúa en la categoría "ausencia de dificultades", el antecedente de líquido en la vía respiratoria juega un papel de dispersión en el planteamiento del caso, puesto que el resultado indica una vitalidad promedio a los 5 minutos de evaluación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 7 Puntos: ausencia de dificultades.

Pregunta 92

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Usted asiste a un parto en compañía del médico, se obtiene un producto vivo de sexo masculino de 30 semanas de gestación, presencia de líquido claro; mientras se espera la transferencia se observa: taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y quejido audible. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos corresponde a esta sintomatología?

- ☐ Neumonía neonatal.
- ☐ Enfermedad de membrana hialina.
- ☐ Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial.
- ☒ Hipertensión pulmonar persistente. ✗ La Hipertensión pulmonar persistente se caracteriza por hipoxemia persistente y cianosis generalizada, debido a la existencia de un cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval y/o del conducto arterioso. El cuadro clínico que se presenta no tiene manifestaciones de cianosis e hipoxemia.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Enfermedad de membrana hialina.

Pregunta 93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la orientación correcta que se debe brindar a la mujer antes y durante el embarazo con el objetivo de prevenir la aparición de casos con Hipotiroidismo Congénito (HC)?

- ☒ Garantizar el consumo promedio de 250 microgramos de yodo al día durante el embarazo. ✓ La prevalencia de HC en una comunidad es un indicador sensible del estado nutricional de yodo materno y neonatal. La mejor forma de prevenir el HC es asegurando un consumo adecuado de yodo a nivel poblacional. Es recomendable que las mujeres en edad reproductiva consuman en promedio 150 microgramos de yodo al día. Antes del embarazo, durante el mismo y durante la lactancia, las mujeres deberían incrementar su consumo a un promedio de 250 microgramos de yodo al día.
- ☐ Tomar suplementos de hierro junto con la levotiroxina para potenciar su efecto.
- ☐ Garantizar el consumo promedio de 80 microgramos de yodo al día durante la lactancia.
- ☐ Recomendar el empleo de vitaminas prenatales de administración diaria, que no contengan yodo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Garantizar el consumo promedio de 250 microgramos de yodo al día durante el embarazo.

Pregunta 94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El consentimiento de la persona adulta mayor, después de haber recibido la información, será registrada en un documento en el cual se reconozca que recibió la misma en forma previa, completa y que ésta fue comprendida en todas sus dimensiones, manifestando su decisión ante la autoridad competente. ¿A qué artículo de la ley orgánica de las personas adultas mayores, corresponde este enunciado?

- ☐ Artículo 36.
- ☐ Artículo 35.
- ☒ Artículo 37. Es correcta porque el Artículo 37 dice: "El consentimiento de la persona adulta mayor, después de haber recibido la información, será registrada en un documento en el cual se reconozca que recibió la misma en forma previa, completa y que ésta fue comprendida en todas sus dimensiones, manifestando su decisión ante la autoridad competente".
- ☐ Artículo 16.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Artículo 37.

Pregunta 95

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes enunciados se acerca más a la definición de la Carta de Ottawa sobre Promoción de la Salud?

- ☒ Proporcionar condiciones para generar un cambio del entorno físico y socio-económico de la población. ✗ Para promocionar la salud es necesaria una acción coordinada de los gobiernos, sectores sanitarios, sectores sociales y económicos y la participación del individuo, familia y comunidad y no solamente del cambio de condiciones físico-socio-económicas de una población.
- ☐ Proporcionar educación sanitaria para prevenir enfermedades crónicas.
- ☐ Proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma.
- ☐ Promocionar solamente un cambio de comportamiento individual.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma.

Pregunta 96

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo con el Art. 146 del COIP que se refiere al homicidio culposo por mala práctica profesional. ¿Cuántos años es la pena privativa de la libertad?

- ☐ 5 a 8 años.
- ☐ 1 a 2 años.
- ☐ 3 a 5 años.
- ☒ 1 a 3 años.  Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1 a 3 años.

Pregunta 97

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El MSP del Ecuador clasifica la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacuna. Identifique las enfermedades prevenibles por vacuna en el orden de erradicación y eliminación.

1. Poliomiелitis, Sarampión.
2. Parotiditis, Fiebre Amarilla.
3. Rubéola, Síndrome de rubéola congénita.
4. Tétanos neonatal - Hepatitis B.
5. Varicela, Rotavirus.
6. Neumonía, Influenza.

- ☐ 2, 5, 6
- ☐ 3, 2, 1
- ☒ 1, 4, 5  Esta respuesta es incorrecta porque:
Enfermedades de Erradicación y Eliminación:
Poliomiелitis - Sarampión,
Rubeóla, Síndrome de rubéola congénita.
Tétanos neonatal - Hepatitis B.
Enfermedades de Control:
Difteria - Tétanos general.
Parotiditis infecciosa.
Fiebre Amarilla.
Varicela - Meningitis.
- ☐ 1, 3, 4

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1, 3, 4

Pregunta 98

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando usted valora al paciente NN de 50 años y le pregunta sobre la limitación del movimiento independiente para cambiar de postura en la cama. ¿Según los datos subjetivos a que Dominio corresponde?

- ☐ Dominio Seguridad/protección.
- ☐ Dominio Actividad/Reposo.
- ☒ Dominio Confort. ✗ El Dominio Confort recoge información sobre la sensación de bienestar o comodidad física, mental o social
- ☐ Dominio Principios vitales.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Dominio Actividad/Reposo.

Pregunta 99

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente ingresa al servicio de Medicina Interna con diagnóstico de sangrado digestivo, el médico de turno le pide que administre una Solución Salina de 1 000 cc en 8 horas. ¿Cuál es el número de gotas que va a administrar por minuto con equipo de venoclisis?

- ☒ 42 gotas por minuto. ✔ Resolución:
Número de Gotas x minuto = Volumen Total / (Tiempo x 3)
Número de Gotas x minuto = 1 000 / (8 x 3)
Número de Gotas x minuto = 42
- ☐ 27 gotas por minuto.
- ☐ 45 gotas por minuto.
- ☐ 14 gotas por minuto.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 42 gotas por minuto.

Pregunta 100

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la profesión de enfermería existe un modelo de pensamiento útil para describir el dominio de la disciplina, denominado paradigma. Los siguientes son elementos fundamentales del paradigma enfermero, EXCEPTO:

- ☐ Entorno.
- ☐ Enfermería.
- ☐ Persona.
- ☒ Enfermedad.  La enfermedad no es un elemento del paradigma de la enfermería. Es un estado que tiene la persona, definido por la OMS como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medio ambientales y sociales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Enfermedad.